

Lygodium?

*Spicatum* L. foliis lanceolatis ellipticis ramis hirsutis et terminalibus  
elongatis

*Barleria hirsuta* Jacq. obs. 2. v. 32

Habitat in India orientali

Rami teretes superne hirsuti dichotome divisi. Folia oppo-  
sita petiolata 3 pollicina integerrima, oblique nervosa  
avena, vultu minutis adpresso subtus pallidiora attenuata.  
Stipula utraque interfolia lanceolata attenuata. Racemi  
axillares ex apice et dichotomia semipedalis flores aggregati  
parvi hirsuti. Capsula calyce coronata didyma

*Lygodium spicatum* L. Mart. hirsutum, foliis ovatis oblon-  
gis acuminatis, racemo spicato terminali, corollis hirsu-  
tis L. Mart. pag. 286.

an speciei *Pondeletia*



Calyx perianthium monophyllum, saepe in laciniis subulatis acutis.  
Corolla monopetalala hypocrateriformis. Tubus calycis longior pentagoni sensim am-  
plior. Faux marginem parum late vato. Laciniae quinque partibus lateribus  
obovatis supra <sup>in</sup> convexis subtus concavis a margine reflexo  
Stamena quinque in inferiore parte tubi anthera linearis longitudine fere  
tubi  
germen inferum globosum. Stylus 1. fileiformis longitudine tubi, apice parum  
crassior stigma obtusum simplex utraque striatum ut supra

*Hydrocotyle hirtellifera* Boiss