

Lysimachia

+ pedunculis multifloris

1. vulgaris L. foliis ternatis lanceolatis, racemis terminalibus
2. ephemerum L. foliis ~~linearibus~~ ^{synopis} lanceolatis alternis, ^{resplebis} petalis obovatis patulis, racemis terminalibus
3. cubica L. foliis lanceolatis petiolatis racemis terminalibus, bracteis longitudine pedicellorum petalis obovatis convergentibus. ^{bracteis} racem
4. stricta L. foliis lanceolatis ^{bracteis} sessilibus, pedicellis patentissimis ^{bracteis} longioribus, racemis terminalibus, petalis lanceolatis patulis
5. angustifolia L. foliis linear-lanceolatis ^{bracteis} sessilibus racemis terminalibus, petalis ovatis patentissimis
6. atropurpurea L. foliis lanceolatis petiolatis, specieis terminalibus, pedicellis linearibus staminibus corolla longioribus
7. hypoleuca L. foliis oppositis lanceolatis, racemis axillaribus compactis

44 pedunculis unifloris
ovatis glabris acutis punctatis fersilibus

D. quadrifolia L. foliis quaternis ^{ovatis glabris acutis} pedunculatis, pedunculis quaternis unifloris
ciliatis punctatis L. foliis subquaternis fersilibus ovatis, pedunculis ^{subtus villosis} verticillatis
causfoliis
10. *Linum stellatum* L. foliis lanceolatis oppositis, pedunculis oppositis, calycibus
mauritanica

11. *nemorum* L. corollam superantibus
foliis cordatis acutis glabris pedunculisque oppositis foliis
brevioribus longioribus, caule repente

12. *japonica* L. foliis subcordatis obtusis villosis, pedunculis subgeminis
foliis brevioribus caule decumbente

13. *pumilana* L. foliis subcordatis glabris obtusis, pedunculis oppositis
caule procumbente.

Lippmacha e monte video / Deid. Thom
et insula Bourbon
duo Lippmachi ex America in herb. Prof. vid. at nulla Centauri.

mauritiana L. foliis basi spatulatis punctatis caule erecto, pedunculato
unifloro axillaribus La Mart. Encyclo
Habitat in Insula Mauri.
Capsula 5que valvi

non vidi

mauriana *Lymachia*

Habitat herb. Ausf.

Caulis herbaei, simpliciter, ascendens, semipedalis, uti planta tota, glabri, superne
ramo uno, alterove. Folia frequentia, sparsa, sessilia, cuneata, tenera, avenia, ener-
vii, obtusissima. Pedunculi axillares, solitarii, angustulares. Palyis laciniis ob-
longis, marginibus membranaceis.

angustifolia Lythraea foliis linearibus lanceolatis basi ciliatis, pedun-
culis filiformibus, unifloris, corollis dentatis.

Willden. in act. soc. h. n. amic. berol.
habitat. Pensylvan.

erffm. Fluck. f. 420. f. 3.

angustifolia Lycopodium

heterophylla Muhlous det La Martre

Cuneolata Hippuridia

Habitat in Carolina herb. usq.

Caulis erectus, Tetragonus, glaber, ramisq. ² ¹
folia superiora et terminalia septua quaterna, bipollicaria et ultra, inter
gemina, nervos venosa, glabra, impunctata. Pedunculati 4. folio longior
uniflori. Calycis glabri; foliola lanceolata, acuta
ex eadem un. Walther

~~Original of the first part of the first volume~~

Centunculoides lysimachia

Habitat in monte video Commeçon herb. frus. ③

Facies Pentunculi. Caulis erectus, simplex, proqui pollicari, glaber uti tota planta. Folia opposita oblonga, acuta, integerrima, magnitudine Pentunculi, avenae, enervia. Pedunculi axillares, solitarii, uni flori, folio brevior. Palyx squarrosus: lacinae filulato, persistentes. Capsula globosa, minuta, longitudine malita & sa aperens.

Lysimachia

Lysimachia Orientalis, lutea, canescens et villosa Tournef. herbe Cor. p. 7.

Habitat in Oriente, (ponto Eur.) Herb. Tournef

Tota villosa, Caulis herbaceus, erectus. Folia ternata, petiolata, semipollucaria
ovata, acuta, avenia, remote nervosa, integerrima, semipollucaria. Pinn
culi superne, axillares, uniflori, foliis breviores. Calycis lacinae lanceola
te

Asperula Lychnoidea

Habitat in America Septentrionali. herb. Pub.

Raulis erectus, herbaceus, striatus, simplex, villosus. Folia petiolata, 4^{na}, lan-
ceolata-oblonga, pollicaria, utraque punctata, margine villosa. Pediculi axil-
lares, solitarii, uniflori; folis breviores, 4-5.

Heterophyllum Lysimachia

Habitat in Georgia herb. Puch.

Caulis herbaceus, tetragonus, glaber. Folia opposita, inferiora petiolata, oblonga
vix semipollicaria, glabra, nervosa, obtusissima, petioli ciliati: superiora
sessilia, canaliculata, sesquipollicaria, omnia impunctata, suprema quater
no vix ciliolata. Pedunculi in alis supremis, solitarii, uniflori, folio parum
longiores.

Lysimachia

Habitat in monte video Comares herb. mus.

habes

vulgaris L. paniculata: racemis terminalibus Lin. L. V.

pl. Dan. t. 609

Lysimachia lutea major Bauh. pin. 245.

Habitat in Europa ad ripas et paludes &

Caulis teres striatus simplex, superne pubescens inferne glaber. Squamis ovatis, fuscis oppositis distantibus septatis. Folia sessilia, lanceolata attenuata bis. Tripollicana integerrima supra punctata, subtus villosa. Racemi terminales et axillares supremis in culta saepe tot, quot folia, foliis longiores, pubescentes pedicelli inferioris interdum. ~~tripartiti~~ bis. triflori, oppositi vel alterni, bractea tubulata ad basin singuli pedicelli. Calycii foliola lanceolata attenuata magne purpurea pertha glaberrima. Petala oblonga

vulgaris L. foliis ternatis lanceolatis, floribus racemosis

culta villositate exiit caulis sulcatus folia nervosa ovato lanceolata saepe quaternaria, ramosior.

2 ephemerum L. racemis simplicibus terminalibus, petalis obtusis, filamentis corollae brevioribus Lin. Spec. pl. p. 2097

Lysimachia orientalis minorifolia glauca Till. ref. 106. t. 40. fig. 2.

Lysimachia ephemerum caulebus subramosis, racemis simplicibus terminalibus, corollis patentibus Marr. in Comment. Got. 1702. p. D. 1. 2.

Lysimachia otani Desf.

Habitat in media Hispania

ephemum Hoffm: racemis terminalibus, petalis obovatis patulis, foliis linearibus lanceolatis sessilibus Hort. Kew. 1. p. 198.

Caulis erectus simplex, ubi tota planta, glaberrimus & linea a costa foliorum decurrente. Folia 4 pollicaria vel ultra alterna cum foliolo inferiora opposita nulli in axillis, integerrima avenia attenuata. Racemus terminalis superiora alterna ^{interdum aliam} ex axillo supremo semipedali. Pedunculus per glaucio ^{sub a. siccis} virens. Flores sparsi: bractea subulata parva ad basin pedicellorum. Laciniis calycis ^{ovata} lanceolata obtusa. corolla alba

S. V.

Thunb. ^{et Rar} Diversum videtur a Lin. sed. obj. no 871

S. V.

Tolia lanicolata: oblonga, ^{tr}polluciana, glabra, alterna, pubes punctata. Racemus
terminalis pedunculatus: pedicelli conferti in racemo polluciani spati, sed
unguiculae ser. Flores parvi herb. hagen.
aliud specimen racemo elongato bractea pubulata ad basin pro gubli; flore congruo.
Stamina corolla breviora

3 Dubia *Lys. racemis* terminalibus, petalis conniventibus, staminibus corolla bre-
vioribus, foliis lanceolatis petiolatis Hort. Kew. 1. p. 194

Lysimachia speciosa purpurea minor Barb. cent. 1. p. 8. 33.

Lysimachia ephemerum Mull. Dut.

Lysimachia atropurpurea Murr.

Habitat in oriente I

Tota glabra caulis erectus ramosus. Rami alterni vertice
nursupulaculis. Folia ~~etiam~~ acuta integerrima basi in petiolum
attenuata bipolliciana. Racemi ex apice caulis et ramo-
rum. Flores alterni: Pedicelli ~~et~~ ^{gemmiferi} pinnatifidi ~~et~~ ^{bracteae} ~~bracteae~~ subulatae stamina corolla breviora

Dubia *L. racemis* terminalibus, ^{bracteis} ~~petalis~~ pedicelli longitudine pedicellorum
petalis obovatis conniventibus, foliis lanceolatis petiolatis

L. orientalis Lamour.

Catropurpurea L. specis terminalibus, petalis lanceolatis, flammibus corolla longioribus
Linn. T. V.

Lysimachia orientalis angustifolia Com: var. 33. T. 33.

Lysimachia foliis lanceolato-linearibus, specis terminalibus Linn. hort
upf. 374.

Habitat in oriente O

Caulis teres, uti tota planta, glaberrima. Folia bipollicaria vel
ultra, rudimenta ramulorum in axillis, utrinque attenuata, inter
gemina, a venis ^{virescunt} glaucescentibus. Specis terminalis est ex apicibus ^{superioribus} ~~terminalibus~~
superiorum palmarum. Flores parvis sessile patentissimi. Calycis
foliola lanceolata. Bractea subulata calycis brevior. Genitalia
corolla longiora

Catropurp. specis terminalibus, petalis linearibus, foliis lanceolatis petiolatis
alteris oppositisque

Lysimachia orientalis angustifolia flore purpureo Tournes. Cor. p. 7. herb
Lusf.

4 *Standa* Luff. racemis terminalibus, petalis lanceolatis patulis, foliis lanceolatis
sessilibus Hort. Vew. 1. p. 1997

Habitat in America septentrionali 4.

Tota glabra. Caulis sulcatus angulatus. Rami oppositi. Folia

longe attenuata pollicaria et ultra arena e nervo

Pedunculi patentissimi filiformes, sparsi at semper 2. vel 3.

a singulis latera approximata hinc quasi verticillata, polli-

cari. bractea semunquicula si linearis ad basin singuli petiol

pedunculi foliola calycis ovata

racemi terminali ^{bracteis} sparsi

Standa ^{bracteis} pedunculis sparsi sub ^{bracteis} pedicellis ^{bracteis} subverticillatis patentissimis,
bracteis ^{bracteis} petalis lanceolatis lanceolatis patulis, foliis lanceolatis

Pluken Tab. 420. fig. 4

5 angustifolia L. racemi terminalibus, petalis ovatis patentibus, foliis
lineari lanceolatis subsessilibus oppositis pedicellis alternis

Habitat

Dr Torfeith
~~oppositis~~

Rami tetragoni, ut plures, frequentes oppositi glabri ubi
tota planta. folia opposita utraque attenuata profertim
basi angusta tri-⁴ tripollicari. ramulorum unguicularis
Racemus terminalis. pedicelli alterni distantes capillares
unguiculares, bractea lanceolata dimidio longior, patens
calycis foliola lanceolata. Stamina genitalia corolla breviora

Decurrens h. racemis simplicibus terminalibus, corolla segmentis oblongis
filamentis corolla longioribus Forst. Austr. 120 65.
Habitat in insula Tanna

non vidi

7 *Hyssiflora* L. racemis lateralibus pedunculatis Lin. l. V.

fl. Dan. V. 577

Lysimachia lutea Pluf. hist. 2. 53. p. 12.

Lysimachia bifolia, flore globoso luteo Bauh. pin. 242.

Habitat in Europa paludibus & inferne aphyllus

Caulis teris, striatus, articulat^{us}; glaber simplicis simus. Folia per fila
opposita lanceolata, glabra ^{arenata} subtus parum pallidiora obscure nervo
la ^{subtus} supra punctat minutis enerviis, bis. tripollicaria. Peduncu-
li axillares solitarii oppositi. flor. in racemo teris, compacto longitudi-
ne pedunculi. petala subulata flava

Hyssiflora L. racemis ax. alantibus pedunculatis compactis, foliis oppositi lanceo-
latis

quadrifolia L. foliis quaternis petiolo ciliatis, pedunculis quaternis unifloris Lin.

S. V. pag. 196*

Anagallis lutea, foliis et floribus ex eodem exorta quatuor ex aequalibus
fundulorum intervallo truncatim profertis Plukh. mant. 12. t. 333. fig. 1.

Habitat in Virginia

edicta B. *Lysimachia canadensis*, jalappa foliis Walth. bot. 32. t. 12.

Lysimachia petioli ciliatis, floribus cernuis Lin. Spec. pl. pag. 210*

Habitat in Canada, Virginia

Folia ^{glabra} in summis ramulis quaterna. pedunculi gemini uniflori,
sub calyce turbinati. Flores cernui petala serrata, mucronata Lin.

B. Caulis teres erectus glaber. Folia petiolata ovata opposita
integerrima acuta ^{acuminata glabra} bif. 4. in pollicaria. Petiolus basi parum dilata-
tus femina plexicaulis longitudinaliter utrinque ciliatus. Ramu-
li ex axillis superioribus folio breviores. Pedunculi oppositi soli-
tarii

B. Specie distinguitur a Dr. La Mart.

an folia glabra utrinque

calicata L. foliis subcordato ovatis acutis petiolatis impunctatis petiolis
tuberculatis pedunculis unifloris

varietas β . L. quadrifloris hinc referi cum descript et synonymis

punctata L. foliis subquaternis ^{sub} ~~septem~~ ^{ovatis}, pedunculis verticillatis unifloris L. V.

7
Faiqu. fl. austr. 4. t. 366.

Lysimachia lutea H. Clus. hist. 2. p. 52. fig. 2.

Lysimachia lutea minor, foliis 7 minoribus punctis notatis Bauh. pin. 245.

Blattano affinis minor, flore luteo, foliis 7 minoribus punctis notatis Monf.
hist. 2. p. 491. f. 5. t. 10. fig. 15.

Habitat in Hollandia inter amundenis

Caulis pubescens, teris, folia atq. attenuata, nervosa, arenia, integerrima, subtus irilosa tripolliciana sursum versus sensim minora superiora ternata. Pedunculi 6-8. pubescentes pollicares, uniflori. Calycis lobula lanceolata, unguiculata pubescentia. Carina limbi ovata, attenuata. corolla flava

Unifolia L. foliis linearibus basi ciliatis sessilibus, pedunculis unifloris
corollis calycis brevioribus La Martre enqyl.
Habitat in Carolina

non vid.

10
Linum stellatum L. calycibus corollam superantibus, caule erecto ramosissimo Linn. h. V.

pag

Linum minimum stellatum Bauh. prod. 107. Pin 214. Magnol. Monsp. 163. t. 1/2

Habitat in Europa australi et Barbaria collibus O

planta pubesca sive vix digitalis, simplicissimus vel paucum ramosus. Ramis alternis, tota glabra. ~~folia~~ folia opposita. Caulis filiformis. Folia opposita sessilia lanceolata, vix sericeo-muculosa, acuta. Stamina, anthera obscure nervosa. pedicelli foliis breviter instructi. Siliqua nitentes. Calycis foliola subulata.

Linum stellatum L. calycibus³ corollam superantibus, pedunculis⁴ oppositis⁵

culta ramosior evadit

11 nemorinum L. foliis ovatis acutis, floribus solitariis, caule prodebente lin. L. V

fl. Dan. t. 174

Anagallis Clus. hist. 2. p. 102.

Anagallis lutea nemorinum Bauh. pin. 252. Monf. hist. 2. p. 569. f. 5. t. 28

fig. 5.

Habitat in Germanis, Gallis, Anglia nemoribus glareosis vasis 4

Caules teretes glabri ~~suav.~~ folia opposita brevissime petiolati, basi
fissa, acuta, venis sube subtus ~~obsc.~~ vix nervosa, glaberrima
unquiculata, Pedunculi axillares oppositi, filiformes, foliis duplo
longioris. foliola calycis subulata. Petala oblonga.

nemorinum foliis cordatis acutis, ^{glabris} pedunculis oppositis, ^{foliis longioribus} caule repente

12 japonica L. foliis subcordatis, floribus axillaribus, pedunculis folia brevioribus Thunb
fl. Jap. pag 83 & L.V. p. 196.

Habitat in Japonia O

Caulis filiformis decumbens apice flexuosus erectus, villosus; simplex
palmani

Folia opposita, petiolata, subcordata, obtusa, integerrima villosa
inquire ulana. Flores axillares plerumque terni, pedunculi flori
feri fructiferi reflexi Thunb

japonica L. foliis subcordatis obtusi villosi, pedunculi subgemini folia
brevioribus caule decumbente

13 nummulana L. foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente Lin. S. V.

Jl. Dan. 7. 493.

Cinagallis mas Cam. epit. 394.

nummulana majori lutea Bauh. pin. 309.

Habitat in Europa juxta agros et sordes & gl.

Caulis glaber. Folia petiolata subrotunda, obtusa pollicaria
superne sensim minora. Pedunculi axillares Petala ovata

subrotunda

nummulana L. foliis subcordatis glabris obtusis, pedunculis oppositis
caule repente

an caulis potius procumbens