

Lythrum

1. foliolarum foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis decandris
2. virgatum l. foliis oppositis lanceolatis utraque acutis, panicula  
virgata, floribus <sup>subdecandris</sup>
3. fruticosum l. foliis oppositis <sup>subdecandris</sup> peltatis subtomentosis, floribus decandris  
involvis calycis eque genitalibus brevioribus
4. nemphoides l. fruticosum, foliis oppositis oblongis, pedunculatis  
axillaribus, capsula circumscissa uniloculari.
5. ~~virgatum~~ petiolatum foliis oppositis linearibus petiolatis, floribus dode-  
candris
6. lineare l. foliis oppositis linearibus, floribus oppositis  
hexandris
7. porphyra l. foliis oppositis ovalibus, floribus alternis hexandris  
caule diffusis
8. viscosum l. caule foliis oppositis lanceolatis, pedunculatis acutis  
caulis unifloris caule fruticuloso villos-viscoso
9. melaninum l. foliis oppositis ovatis, floribus alternis subdecan-  
dri, caule prostrato

10. triflorum L. glaberrimum, foliis oppositis sessilibus lanceolatis, pedunculis axillaribus oppositis, capitulo trifloro
11. cordifolium V. foliis oppositis subsessilibus cordatis acutis scabris, racemis terminalibus axillaribusque, floribus decandris
12. calycinum V. foliis lanceolatis obtusis, laciniis calycinis foliiformibus longitudine involta, caule procurrente
13. ciliatum L. foliis oppositis petiolatis ovatis glabris margine ciliatis, racemis terminalibus, floribus subsessilibus decandris
14. racemosum L. diffusum, foliis oppositis petiolatis ovatis, racemis terminalibus, floribus oppositis
15. dipetalum L. hirsuta viscosa, foliis ternis oppositisque sessilibus ovatis, floribus axillaribus mutatis biphyllis dipetalis
16. verticillatum L. foliis alternis subtus pubescentibus, pedunculis axillaribus <sup>oppositis</sup> subgeminis quadrifloris
17. thymifolium L. foliis alternis linearibus, floribus tetrapetalis
18. hyssopifolium L. foliis alternis linearibus, floribus hexandris

ordo adhuc emendandus

Fruticosum Lytham

Habitat in India orientali.

Rami teretes, glabri. Folia sessilia, ovato-lanceolata, opposita, 2-  
3, pollicaria, acuta, supra vix venosa, glabra, subtus incana, nigro punct-  
ata. Pedunculis axillares brevissimi, subtriflori. Calyx tubu-  
losus, monophyllus. Petala calycis inserta, parva. Stamina 12. Calycis  
longiora.

herb. bot.

1.  
Solecania minima leptanica nummulanifolia E. B.

Habitat in Leptania herb. Tournef.

Caules plures digitales, interdem basi summi

habes

Lineare Lichnum

Habitat. herb. Fus.

Caulis acute tetragonus, uti tota planta glaber. Folia sessilia, linearibus lanceo-  
lata, integerrima, pollicari cana. Spica lateralis et terminalis. Flores  
aeterni, breviter pedicellati, folio florali breviori, striati

involucrum lychni foliis linearibus, pedunculis axillaribus unifloris, bracteis  
cordatis attenuatis

Habitat ad Senegal herb. Guss.

Caulis herbaceus feliiformis, glaber. Folia breviter petiolata, vix pollicaria, opposita,  
integerrima, glabra. Pedunculi solitarii, foliis breviores. Involucrum patentissi-  
ma, basi colorata.

1 Salicaria L. foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodiceandris  
Lin. S. V. Pl. Dan. tab. 67.

Lysimachia purpurea communis major Olf. hist. 2. p. 51.

Lysimachia spicata purpurea Bauh. pin. 246.

β Blattaria rubra spicata major, folio subrotundo Monj. hist. 2. p. 490. f. 5.  
f. 10. fig. 11

γ Lysimachia trifolia spicata purpurea Boiss. mus. 167.

δ Lysimachia quadrifolia purpurea, mollioribus et longioribus foliis  
Boiss. mus. 167.

Habitat in Europa ad ripas aquarum &

Caule tetragono striato. Folia semicomplexicaulia tripollicaria  
subtus int. erium villosa albenerata integerrima. Flores  
in spica densa terminali. Flori alterni plures in axillis

foliorum floralium. <sup>caulis et folia subtus villosula</sup>

Folia superiora in R. alterna an videtur spica d. frugum

in folio

folia floralium  
cordata

2 virgatam L. foliis oppositis lanceolatis, panicula virgata, floribus dodecandris  
ternis L. S. Gaertr. fl. austr. 1. t. 7.

*Lysimachia purpurea* 2. f. minor Claf. hist. 2. p. 51.

*Lysimachia rubra* non filiquosa Benth. pin. 246.

Habita in Austria et Siberia 2

Caulis erectus bipedalis glaber tetragonus <sup>rami superiores elongati vel longissimi</sup> superne ramulosi.

Folia sessilia attenuata integerrima, basi acuta, glabra  
avenia, tri vel quadripollicaria, superne minora.

Flores in axillis foliorum ramulorum, brevissime pedun-  
culati folitarii gemini vel quatuor, corymbi  
quiescentes, purpurei calycis 5 strati.

Similis L. sulciana at folia angustiora utraque alata  
flores distantes



7 fruticosum L. foliis oppositis subhis <sup>sub</sup> tomentosis, floribus deicandris, corollae calyci aequi-  
genitalibus brevioribus. Lin. spec. pl. pag. 641. +

Habitat in China.

Stem cortex lacero. Folia sessilia lanceolata, integerrima  
len.

non vidi

9 Pemphis L. fruticosum hirsutum, foliis oppositis oblongis hirtis integris, floribus  
axillaribus pedunculatis, capsula circumscissa uniloculari den. Suppl  
p. 249. \* S. V. p. 447.

Pemphis acedula Borf. n. gen. 34. t. 34

Habitat ad littora maris Zeylona

Frutex ramosis <sup>seno</sup> rami oppositi inferis tetragoni <sup>u. striati</sup> villosi cinere  
s. enteri. Folia opposita sessilia approximata, in ramulis  
pollicaria, obtusa, basi acutiora, crassiuscula juniora  
subtus villosa subserena. Pedunculi axillares solita  
rie uniflori. Calyx 12 dentatus. Petala 6 calycis inserta  
stamina 12. Capsula tubinata, uniloculari, circumscissa

— villosum

<sup>pedunculati autellantibus foliatis</sup>  
CARTHAGINENSE L. folus lanceolatis petiolatis fibrinosis Targem h. v. An. 140

Habitat

non vidi

6<sup>s</sup> petiolatum L. foliis oppositis lanceolatis petiolatis, floribus dodecandris

Len. P. N.

Leythnum foliis petiolatis Gron. Verz.

Habitat in Virginia

non vid.

6 lineare l. foliis oppositis linearibus; floribus oppositis hexandris Len. Spec. pl. p. 107

641. 4

Lythrum foliis linearibus; floribus hexandris solitariis Gron. Voy. 162.

Habitat in Virginia

non vidi

7. *Parsonia* L. foliis oppositis ovalibus, floribus alternis hexandris sessilibus, caule  
diffuso Lin. Spec. pl. pag. 641. 4 Sw. obs. pag. 193 4  
*Parsonia* herbacea, foliis ovatis oppositis, floribus singularibus foliis ad ax-  
illum ciliatis interpositis Brown. Jam. 199. t. 21. fig. 2.

Habitat in Jamaica 4

Caulis herbaceus prostratus L. repens ramosus, teres, ramis sim-  
plicibus alternis, filiformibus, patulis, subflexuosis  
teretibus pubescentibus. Folia petiolata, opposita  
parva oblonga acuta integerrima, utrinque glabra  
seriosa, petioli brevissimi. Stipulae nullae. Flores axil-  
lares, prostrati terminales, solitarii, subsessiles parvi  
pallide rubri. Calyx cylindricus basi ventricoso  
5-10 dentato Sw

9 viscopum L. caulis fruticulosus villosus viscosus, foliis lanceolatis  
oppositis floribus axillaribus unifloris  
alternis

Habitat in Brasilia &

Caules filiformes decumbentes demum ascendentes  
teretes villosi viscosi in primis superne, rarius  
sumi alterni. Folia subsessilia, inquirulana, glaberrima

suprema subvillosa, subtus nervosa acuta. pedunculi  
libres. Campanulati ex axilla oppositi Calyces basi  
gibbosi apice longitudo ~~dehiscentes~~ <sup>dehiscentes</sup> Calyces  
persistentes capsula longioribus ~~sed foliis caulis~~  
foliis ~~similiter~~ tenuis

an eadem cum Parsonia

10  
Triflorum L. glaberrimum, foliis oppositis subsessilibus lanceolatis integris,  
pedunculis axillaribus oppositis, capitulo trifloro Lin Suppl. p 249.  
N. pag 447

Habitat in America meridionali, ~~periti, suberato~~ ~~longo~~ ~~lanice~~  
Caules decumbentes glabri. ~~folia~~ ~~acuta~~ ~~avenia~~ ~~ovato~~  
lanceolata, angusta, pollicari. Pedunculi axilla  
res oppositi folio longiores <sup>cauli</sup> ~~apice~~ pedicelli tribus brevi  
bus, unifloris. Bractea opposita linear lanceolata  
longitudine floris. Calycis fructiferi subglobosi

mes ex Insula Francia ded. Thoma enno late



<sup>11</sup>  
12 *Cordifolium Lyth.* foliis oppositis subsessilibus, cordatis acutis scabris, racis  
mit terminalibus axillaribusque, floribus secundis Sw. prodr. pag.

76.

Habitat in Hispaniola 5

non vidi

12 13 Calycinum L. caule prostrato, foliis lanceolatis obtusis, calice  
calycis foliiformibus longitudine corollae  
Habitat in monte video

Caulis herbaceus teres ramosus, rami alterni distanter  
ramulosi superne vellosi-pubrescentes uti folia  
superiora. Folia opposita pollicaria, basi acuta  
sa, obtusa, cuspiscula, a venia cum nervulo  
pedunculo opposito. Pedunculi axillares foliorum  
et ramorum solitarii uniflori breves. Calyx  
quinquefidus laciniis oblongis obtusis sequa folio  
folii similibus, persistentibus cum foris et  
pediculis patentibus. Capsula oblonga calyce  
dimidio brevior longitudinaliter in duas partes  
nunc perispermicam et loculam stamina 5. 6. stylus  
12us

Capsula longior

13  
14 Ciliatum L. foliis oppositis petiolatis ovatis glabris margine ciliatis; racemis  
terminalibus; floribus subsessilibus deciduis Sw. prodr. pag. 76.  
Habitat in Jamaica 5

non vidi

12 racemosum L. diffusum, foliis oppositis petiolatis ovatis, racemi terminalibus  
floribus oppositis Lin. Suppl. p. 250 & S. V. p. 447.

Habitat in America meridionali

Planta suffruticosa, diffusa. Folia ovata, integerrima, venosa  
Racemi ad dichotomia terminaliter, longe. Flores remoti, perianthia  
opposita, longi pedicellati, erecti bracteati. Bractea  
ovata. apices ramulorum, calyces et pedicelli prostrati  
visidi Lin

non vidi

<sup>15</sup>  
\* *dipetalum* L. *hispido viscosum*, foliis ternis s. oppositis sessilibus ovatis, floribus  
axillaribus nutantibus *dipetalum* Lin. Suppl. p. 250. \* L.V. p. 447

Habitat in Amena t.

*Knautia hispida viscosa*, fuscus. Rami alterni. Folia ovato  
oblonga, integerrima, hispida late patentissima, supra plerum  
dentata. inferiora verticillata ternis quaternis. ramulorum  
opposita. Pteris axillares pedicellati. Calyx lineari  
*hispida viscosa*. floribus speciosa et distincta planta  
Lin

non vidi

18  
4 verticillatam L. foliis oppositis subtus tomentosis subpetiolatis, floribus verticil-  
latis lateralibus Lin. P. V.

Lythrum foliis petiolatis Gron. Virg. 52.

Habitat in Virginia

Caulis angulatus villosus. Folia breviter petiolata utraque  
acuta attenuata, subtus pallidiora pubescentia supra  
glabra nervosa subtus pollicaria. Pedunculi axillares  
solitarii vel gemini, quadri flori. Pestila corolla duplo  
longiora

---

Folia alternas subtus pubescentibus, pedunculi  
axillaribus sub geminis quadri floris

17 Thymi folium l. foliis alternis linearibus, floribus tetrapetalis Lin. S.V. p. 447  
Spec. pl. pag. 642. +  
Hysopifolia minor s. potius Thymifolia maritima Bauh. h. 3.

p. 772.  
Polygonum aquaticum minus Bauh. c. 773. fig. 2.

Pentaglossum linearifolium Torrk

Habitat in Italia, G. narbonnefi, Barbaris et orienti uliginosis O

Caules ramosi et laevi de carentibus tetragonis, rami inferio-  
res oppositi, superiores alterni. Folia simplicia caulina oblonga  
opposita <sup>obtusata</sup> ramea alterna linearia acuta frequentia  
conjugiulana omnia glabra integerrima. Flores  
axillares, solitarii, calycis angusti angulati <sup>4</sup>lobi  
subulosi glabri. Stamina quatuor

Folia inferioribus opposita oblongis superioribus

10 *Hyssopifolium thymifolium* L. foliis alternis linearibus, floribus hexandris  
Len. 1. 11 Mart. 344 Gay fl. Austr. 2. t. 133

*Hyssopifolia* Bauh. pin. 210

*Calceana hyssopi folio latiore* Hall. pin. 147. t. 6. fig. 3

13. *Cyrtanthera linifolia* purpureo corulea Bauh. pin. 246.

Habitat in germania, Helvetia, anglia, Gallia inundati

an modo varietas *hyssopifolia*