

Mabea

Monoc. Stam. P. 12

acuminata

Purici Mabea foliis lanceolatis ellipticis acuminatis ~~Aubl.~~  
Mabea purici foliis acuminatis Aubl. fl. Gu. pag. 867. tab. 334. fig. 1.  
Habitat in Guiana

~~non ede~~

Mabea

Mabea Taguani, foliis ovali-oblongis subserratis

Mabea Taguani folio ovato, obtuso, subtus venis rubris notato. Aubl.  
fl. Guian. pag. 870. Tab. 334. fig. 2.

In Cayenna legit von Rohr &

Rami teretes, cortice fusco cinereo punctato, inferne glabri, superne  
e villis ferrugineis ~~tomentosi~~ : ramuli dichotomi.

Folia petiolata, alterna, bi- sive tripollicaria, ovali-oblonga, plerumque  
que basi apiceque rotundata, saepe emarginata, interdum  
acuminata, obsolete serrata, utrinque venosa; supra gla-  
berrima, nitida; subtus glauca, nervis venisque elevatis,  
purpurascens, villosa.

Petiolus vix semiunguicularis, tomentoso-ferrugineus. Stipula  
Stipula utrinque, subulata, reflexa.

Racemi terminales, bipollicares, pedunculati, multiflori. Pedice  
Pedice unguiculares, filiformes, gemini, basi connati, incurvi

Bractea linear-lanceolata, ad basin pedicellorum, apice reflexa, basi marginibus  
conniventibus: squama, ad singulum latus bractei, subatrosa, ovata  
glabra, decidua.

Flores masculi superne, magnitudine vix seminis Sinapi  
Calyx monophyllus, hemisphericus, quinque dentatus: dentibus oratis  
Corolla nulla

Stamina. Filamenta fere nulla. Anthere circiter duodecim

Flores foeminei inferne, tres vel quatuor.  
Calyx quinquefidus: laciniis oratis.

Pistillum. germen ovatum, longitudine calycis, incanum. Stylus unicus  
filiformis, semiangularis. Stigmata tria, revoluta.

(Semto calyce gymnanther. Swartzii species fere esset

Charact. essentialis  
Malva

nini Mabea

Habitat in Guana herb. Desfont.

Rami teretes, glabri, fusci. Folia oblonga, acuminata, acuta, cartilaginea,  
minime nitida. Stipula lateralis, reflexa, lineari. Peduncululi, elonga-  
ti, angulati, glabri.