

Mahernia

Heterophyllum Makernii

Habitat herb. Guss.

Cauli pendulo-scaber, superne villosus. Folia linearia, unicum semipollicem
longa, remote inciso-ferruginea, apice transverso inciso, omnia ope lenticulae
remota. Bractea cordata, complicata, ad pedicellonem basin.

~~verticillata~~
1 ~~pinnata~~ *Makernia foliis verticillatis linearibus* Lin. Mant. 597 P.V. p. 300 Cesari
11. 324. pag 176. f. 1.
Habitat in Cap. bono p. 5.

~~Caulis fruticosus, diffusus, ramis filiformibus alternis scaberrimis. Folia
verticillata, saepe 8. 10 v. a. ovata aut pennatifida in ramis ternis, pater
cum v. v. mentis foliaceis ramulorum, glabra unguiculata. Racemus
terminalis. Pedicelli saepe gemini solitarii vel triflori, secundarii ex axillis
foliorum foliorum, ped. foliis longior. Calyx campanulati laciniis
subulatis~~

4 *Pedunculis elongatis*

verticillata 4. *foliis verticillatis linearibus integris inflexisque ulatis caule
decumbente* Thunb. Desf. n. 6.

Caulis flexuosus elongatus unguiculatus aphyllus scaber perquam
siccus. Rami filiformes digitales scabri. Verticilli foliorum
approximati. Folia extorsum parum dilatata subtus canina
scabida subulata, ramis inflexis unguiculata
Racemi superne. Calyx scaber ciliatus

n. h. ignota

heterophylla M. ^{aspera} fruticoso, subhispida, foliis verticillatis polymorpha
pedunculis quadrifloris Cavan. des. 6. p. 324. Tab. 170. fig.

Habitat in Cap. spec. 5

heterophylla H. foliis cuneiformi oblongis apice incisofratis subtus
fiabris, venis cernuis Thunb. Des. no 20
basi decumben. Ramuli villosi scabri. Stipulae breviter petro
latae apice subtruncatae et incisofratis serratis 2-5-7.
Supra glabriscula subtus punctata fiabra unguiculata
stipula lanceolata foliis dimidio brevior. Pedunculis et
calyce pilosi

mea tota villosa folia apice tantum denta foliola cuneata

~~nam~~

incisa Mahernii foliis pennatifidis incisè hirs., pedunculis subbifloris,
caule erecto scabro Wild. spec. pl. pag. 1560.

Mahernia incisa foliis pennatifidis incisè, pedunculis subbifloris
caule scabro Jacq. bot. Schomb. 1. p. 20. tab. 54.

Habitat in Cap. b. spec. 5

non vidi

pulchella 4. foliis lanceolatis pennatifidis: pinnis integris indivisib.,
caule erecto lavi Len. Suppl. p. 302. S.V. pag. 611

Habitat ad Cap. Spei

pulchella 4. foliis pennatifidis glabris pinnis rotundatis, caule
erecto Thunb. no 23.

Makerua pulchella Cavan. Desf. p. 32 s. tab. 187. fig.

³
Terniis brevifloris vel digitalis. ^{aggregati uti.} Rami et ramuli villosi.
erecti digitales. Solia petiolata unguis ciliata glabra
ferebatur ante brevem. floris racemosis cernuis. Calyx 7 lam.
panulatus venis pme villosis

2 pennata *Makernia* foliis tripartito pennatifidis Lin. L. V. pag. 300
betonia africana vesicaria, una e ripo foliis Com. rar. t. 7.
Cistoides frutex otheopiceus; parvis coronopifoliis ad nodos caulem radi-
 dem amantibus Pluk. mont. 50. t. 344. fig. 3.
Hermannia foliis tripartitis. media pennatifida Lin. spec. pl. p. 942
 Habitat in Cap. b. p. et y

~~Ramis teretes purpurascentes scabrisculi. Folio verticillato semi
 foliis bipennatifidis sesqui pollicares terminales pilosculi biflori. Pedicelli solitarii
 pedunculis capiteis radice semicordata dentato uno alterove flores cernui. Calyx
 rubri elongato
 biflori ^{Carson. det.} _{176. fig. 2.} lacina oblonga acuta raris pilos.
 176. 325. 5. 106. 176.~~

pennata *A* foliis bipennatifidis glabris, caule decumbente, stipulis lanceola-
 tis integris serratisque Thurb. des. p. 26.
 Caulis glaber, ut rami, ~~flexuosi~~ rami flexuosi ubi gaulis
 habet folia petiolata, plerumque bipennatifida raris pen-
 tatifida utraque glabra interdum pollicana. Stipula va-
 nus integro. Flores racemi terminales cernui. Calyx
 vix manifeste scabridus stamena monadelph.

^{Mafernia}
verticillata *Hermannia* foliis verticillatis linearibus Lin. Mant. 59 * L. V. p. 308

Habitat ad. Cap. b. p. 5.

Caulis fruticosis, diffusus ramis filiformibus. Folia verticillata saepe 8-10 linea
na vitae divisa aut pennatifida. Modus fructificandi Hermannia, Verm
nalis, pedunculis saepe bifloris flores lutei.

Si nectaria demas demas petalis, eaque addas staminibus habebis Herman
niam Lin. Mant. l. c.

glabrata H folus lanceolatis acutis inciso-feratis glabris, floribus
cernuis Lin. Suppl. p. 301. L. V. p. 611.

Habitat ad Cap. b. p. nei
makheria glabrata Cavend. Desf. p. 326. tab. 200. fig. 1

glabrata H folus oblongis inciso-feratis glabris, capsulis tomentosis
Thunb. Desf. no. 10.

Inter humilis rigidus glaber palmari. Rami aggregati pium
o. tereti pithamari. Folia inferne in ramis pitholata
subpin natifida feratens obtusi nervos unguiculana
Stipula ovata integra brevissima. Flores in ramis apthylli
racemosi cernuis Pedunculis uni flori Thunb

biferrata H. foliis ovatis lanceolatis inaequalibus serratis glabris floribus
cernuis Lin. Suppl. pag. 302. S.V. pag. 610

Habitat ad Cap. b. frei

H. biferrata foliis ovatis acutis inaequaliter serratis subtus scabri
floribus racemosis reflexis Thuab. Desf. no 21.

Index vix pedalis. Ramis tenetibus flexuosis scabris. Folio petiolata
oblonga f. ovato-lanceolata incisive serrata supra glabra
alio in ramulis lanceolata angustiora. Stipula canicola
fo. integra. Calyx villosus

males nea biferrata. caule & vert. scabriusculo foliis lanceolatis
inaequaliter serratis, pedunculis bifloris Charan. Desf. p.
326. tab 200 fig. 2.

ovata lanceolata

non vidi

Mah. betulina