

Malachra

receptaculum capsulae nept. linnous adesp asperantur a Medico famel-malv
pag. 33.

bracteata Malacina

Habitat herb. Ausf.

Caulis fectis stellatis, inferne ^{aut, acuti} rarioribus, superne in pedunculis copiosissimis.
Foliorum lobi obtuse serrati. tota palmaria. petiolo fere breviora

Capitata M. capitulis pedunculatis triphyllis septemfloris L. V
Malva frutescens hirsuta, floribus luteis in capitulum con-
gestis Plum. spec. 2. v. 169. fig. 1.

Species capitata capitulis pedunculatis triphyllis septemfloris
Lin in act. Ups. 1743. p. 137. & 2. Spec. pl. pag. 965

Habitat in Canbis locis paludosis & s. pedalis
Caulis erectus, simplex teres mucronatus & punctis sparsis
quibus insident pili gemini divaricati, rigidi. Folia petio-
lata, alterna, ovata seu ^{ovata} serrata inaequaliter serrata basi
versus integerrima extrosius utraque angulo sublobata
quinque nervia, glabra. Ca. bipolliciana, petioli hirsuti
stipulae setae etc. Pedunculi axillares gemini, petiolo
brevioris. involucri ^{marginis et costae hirsuti} cordata attenuata serrata basi pallida
nervis et nervis obscurioribus. Calycis albi laciniis lineis
tubus purpureis puncto

Mal. capitata caule erecto fabrici, foliis cordatis fabricundo-angula-
tis denticulatis rigidis, calyce triphylo septemfloro Cavan.
Diss. pag. 97. Tab. 33. fig. 1

alicofolia Malachra

malachra alicofolia Jacq. coll. 2. pag. 350

Habitat ad Mont. Caraccias. ☉

Caulis terrens, 6 pedalis erectus basi pollicem crassus. Tenax pilis albis
rigidi subpungentibus muciantibusque sparsim hispideris ut petioli
pedunculi et rami. rami axillares. Folia basi cordata subrotunda
venosa, patentissima, obtuse serrato crenata, glabra ad nervos
pilis raris ad spem superam profundius secta. Stipula subu-
lata erecta acuta subpollicares 3. 4. Pedunculi axillares solitarii
cum ramo vel gemelli binarii. Flores capitati. Cal. communis
5 phyllis foliolis inaequalibus, acuminatis nervosis basi albis
ciliatis extremis fimbriatis flori sessilibus ad basin singuli folioli
4 in centro pedicellati. calycis prope latius canaliculata cilia-
ta. Anelli 5que. Semina solitaria Jacq.

radiata M. capitulis pedunculatis pentaphyllis multifloris
foliis palmatis L. V.

Alcea hispida spina frutescens Plum. spec. 2. 8. 19.

Sida radiata spec. pl. pag. 965.

Habitat in America

maiori hispida quam capitata, nervi foliorum et vena quoque
hispida. Sepala capillares fere saepe pollicares. folia 5 lobata

^{alchem}
~~Melochia~~ radiata caule urente hispida spina, foliis palmatis
caulibus communi 5-6phyllis multifloris flentibus bracteatis.
Cavan. du 1. p. 90. tab 33. fig. 3

aliam ex eadem occidentali involucri pentaphyllis foliis
angulatis nec palmatis pedunculis longitudinalibus foliorum.
an modo varietas? forte varietas capitata quod revera est

destr
bracteata Malachra

Malachra bracteata caule usente, folus palmatis capitulis multifloris
floribus minimis bracteatis. Caran. desj. p. 99. g. d. Tab 34. fig. 2.

Malva villosa frondifolia, flore parvo ex albido Bancr. fr. Oqui 73

Habitat in amenia

Tota planta pilis rufis usentibus hispida. folia longe petiolata cordata
subrotunda ^{profunde} septemloba. stipulis capillares. Flores 14 in pedunculis
axillaribus. foliis longioribus, pedicellatis pedicel. bractea foliosa
subrotunda ad singulum florem. Calyx communis 6 vel pluribus,
folioli brevis inaequaliter obtusis. exterior setis undecim villosis
interiore longiore interior spidus. Cor. calyce ut major. Stylus
obtusus Car.

michi ignota