

Malope

glabrata Malou

Habitat in Regno Tangitano Schouboe

Caulis ca. herbaceus erectus semipedalis teres glabris ramis ut folia
petiolata ca. pollicaria ^{inferior} ovata subrotunda obtusa ^{obtus} lobata superiorum
loba basi ^{omnia} cuneata ^{omnia} ~~pauciter~~ ^{pauciter} crenata acuta omnia usque
later crenata crenis seta terminata, basi integerrima glabra supra
subviresca subtus viresca pallidiora. Petioli inferiorum folios longis
ter. Stipulae semiovatae patentis prois ciliatae. Calycis exteriori
foliola cordata ciliata interiori breviora: laciniis interiori ovato
marginis cordatae ciliatae. Corolla micantata duli colorationi
bus petata marginis subrepanda Peduncululi axillares folios
longiores

~~Herbarium folios ovatis acutis rugosis basi folios pubescentibus supra ovata
ms. spec. arch. p. c. Bonn. 1. pag. 322. tab. 55. fig. 6
Habitat in Regno Tangitano Schouboe~~

1
Piper unguiculatum foliis subcordatis quinque nervatis acumine unguiculato
basi utrinque revolutis, specis. exilis Jacq. Penw. 1. pag. 34. Tab. 57. fig. 6.

Habitat in umbrosis Peruvia 4.

Caulis fruticosus, teretis, erectus, inferne densus, superne ramosus, v. induratus
Covitas striatus. Rami superne densi, articulationibus approximatis.

Folia patentia, breviter petiolata, oblique deflexa, cinnata, basi acumina-
ta brevi, tenax, unguicula formi ad apicem dorsum, basi inaequalia, utridum
septem nervia, utrinque glabra, coria, supra nitida: nervi laterales obsolete
pauca caduca. Spica solitaria cylindrica in flore erecta, fructibus patentibus
foliis longior. Squama subtensa, pliculis inferiori remotis hexagonis. Ranis
5. 6. frequentius quatuor, gemma singularem ambienta. Germen 3-5gonum frequen-
tius tetragonum. Stigmata foliorum. Inpa tri-5gonis, stigmatibus coronata

malacoides M.

Malva betonicifolia Boerh. fr. 15. t. P. fig. 2. Monif. hist.
2. p. 522. f. 5. t. 17. fig. 11.

Alcea betonica folio, flore purpureo violaceo Barr. c.

1189.

Habitat in Helveta pratis et Mauritania O

Caule teretes, glabri. Folia petiolata, alterna, ovata, ses oblonga
pelticaria et ultra inaequaliter crenata, glabra, fere non
sublaevicolata. Stipulae parvae lanceolatae. pedunculati ter
minalis, uniflorus. Calyx exterior ovatus, uti interiori pili
bifurcati ad marginem. Petala cuneata, subpromissa

foliis ovato oblongis subvatis omnibus subintegris, floribus solita
nis

malope malacoides foliis cordatis ovatis crenatis, floribus
solitariis magnis longissime pedunculatis Cavan. Desf.
reg. Pl. tab. 32. fig. 1.

multiflora M

Malope multiflora foliis subrotundis crenatis villosis floribus 3-4
axillaribus. Cavan. disp. pag 05.

Habitat prope Hyspolim O

Caulis vix semipedalis paucis ramis. Flores parvi. Calycis villosi.
corolla alba Cavan.

non vid.

Trifida M. foliis ^{crenatis} inferioribus ovato-oblongis superioribus trifidis. ~~floribus solitariis~~
malope *Trifida* foliis crassis ternariis trifidis dentatis floribus solitariis
axillaribus longis sive pedunculatis Cavan. *desf.* 2. p. 85. t. 27. fig. 2.
Habitat in Hispania et Babana cultis O

Caules plures, struthamoi simplicissimi tetragoni, punctis quibus raris
pili exasperati. Folia petiolata, bipollicaria remota
crenata, nervosa nervi ^{superiorum} profundum nervi supra sublineata, nervo
in subtus nervi petioli subnervosa. ^{obtusata} ~~pet~~ inferola ovato-oblonga
superiora trifida laciniis intermediis longioribus. Petioli inferiores
longi folio longioribus superioribus brevioribus. Stipula lanceolata oblon-
ga. Pedunculi terminales cum ramulis bipollicariis pilosis.
uniflori solitarii ramis foliola calycis ciliata, pilis solitariis
exterioribus ovatis laciniis interioribus lanceolato-obovatis
nitidius C. Thunberg.

^{Hispanica}
Cavan: glabra an eadem
nonne varietas M. malacoidis