

# Malpighia

†† pedunculis subunifloris

1. <sup>glabra</sup> lucida M. foliis ovatis integerrimis glabris pedunculis umbellatis umbellis axil-  
laribus pedunculatis
2. pumiliofolia M. foliis ovatis glabris pedunculis unifloris
3. urens M. foliis oblongo-ovatis setis subtus decumbentibus rigidis, pedunculis  
unifloris aggregatis
4. angustifolia M. foliis linearibus lanceolatis <sup>integerrimis</sup> setis utraque decumbentibus rigidis  
pedunculis umbellatis
5. aquifolium M. foliis lanceolatis dentato-spinosis subtus hirsutis, peduncu-  
lis aggregatis unifloris
6. incana M. foliis lanceolatis attenuatis subtus setis ad proxi umbellis axil-  
laribus simplicibus
7. saginea M. foliis oblongis integris subtus spicosis-nudis, pedunculis tripartitis  
umbellatis
8. cordigera M. foliis ovato-oblongis glabris dentato-spinosis integerrimis que

floribus racemosis

9. nitida M. foliis lanceolatis glabris, racemis axillaribus  
non  
10. <sup>non</sup> diphylla M. foliis oblongis glabris, racemis terminalibus, ramulis diphyllis
11. lucida M. foliis obovatis cuneiformibus integerrimis enerviis nitidis, pedunculatis  
terminalibus multifloris
12. difcolor M. foliis oblongis obtusis inferne subangustatis ramisque glabris, racemis  
terminalibus
13. conacea M. foliis lanceolato-oblongis acutis utraque glabris, racemis termi-  
nalibus
14. crassifolia M. foliis ovatis subtus tomentosis, racemis terminalibus
15. ovata M. foliis elliptico-lanceolatis acuminatis supra obtuse glabris, ra-  
cibus terminalibus
16. verbascifolia M. foliis cuneatis tomentosis supra rugosis, racemis terminalibus
17. canescens M. foliis oblongis obtusis pubescentibus, racemis axillaribus compo-  
sitis.

Arbor brasiliensis <sup>2</sup> racemosa foliis oppositi Breyn. Cent. tab. 3. est species  
malpighii foliis oblongis subtus femineas tomentosi herb. Musc.

~~Arbor racemosa brasiliensis foliis~~  
~~arbor racemosa foliis oblongis subtus toment~~

Ab hoc genere Richard separat stylo 1. stigmatibus 2. laminatis, bacis dispermis  
uti nitida faiqui si Coffospha dictum. Semina altero latere plana altero  
convexa. Sed quoque se parando M. lucida Sw. verbascofolia, buxifolia  
mea cupit fuerit maduro pallida vixit ad dispersum, munda Aube. erosi  
folia et altissima faiqui. que specie differat ab Aube. Has omnes comprehendit  
sub nomine Myrsinoma, ex inde quod conis profert. Nux <sup>globosa</sup> unica, <sup>sub</sup> trilobata  
Stylis ~~truncata~~ basi areola plana quasi truncata, superficie <sup>sub</sup> inequali fissa  
osser. Loculo monospermo. Semina inequaliter globosa. Stylis 3.  
Malpighii proprio gaudet nomine tabus Richard

elliptica Malpighia foliis ellipticis utraque glabris, racemis axillaribus foliis  
vario floribus monogyinis.

Habitat in Montserrat ad Bryan 3.

Rami oppositi, inferne teretes, superne compressi, cortice cinereo,  
glabri

Folia petiolata, opposita, 5-7 pollicaria, <sup>pollicaria tres fere lata</sup> elliptica, interdum parum  
acuminata, saepe obtusa, basi acuta, integerrima, utraque glabra  
venosa, plana, pallide viridia.

Petioles pollicares

Racemi axillares, solitarii, quadripollicares. Pedunculi compressi  
anapetici, glabri: pedicelli oppositi, vix unguiculares, uniflori,  
cinerascens. Bractea minuta ad basin singuli pedicelli

Calycis fere glabri

(an à Malp: glabra satis diversa vel modo varietas?)

monogyna Malpighia foliis ellipticis ovatis acuminatis acutis integerrimis subtus vil-  
losis, racemis axillaribus

Habitat in Mendocino Dr. Ryan &

Rami glabri, apice villosifusculi, compressi.

Folia petiolata, opposita, tri vel quadripollicaria, elliptico-ovata, acumi-  
nata, acuta, integerrima, venis, simpliciter tenuissime venosis, palli-  
de viridibus; adaltera supra nudifuscula, subtus villosa subcanescentia.

Petiolus vix unguicularis

Pedunculi axillares, oppositi, solitarii, tri vel quadripollicares, cinera-  
scentes, alternatim compressi. pedicelli albescens vel oppositi, solitarii,  
semunguiculares, unisive biflori, canescentes, sub flore crispiores.

Bractea minuta ad basin et in medio pedicellorum

Stylus unicivus Glandula calyci

Calycis glandula distincta

Stylus unicivus

(Malp. odorata Jacquinii proxima, diversis foliis acutis nec emargi-  
natis, subtus villosis nec utriusque tomentosis)

Genus Malpighia foliis oblongo lanceolatis <sup>acuminatis</sup> glaberrimis pubescentibus, racemis  
terminalibus

Habitat in America meridionali v. Bot. no 15 5  
Rami teretes glabri cortice cinereo striati. Folia in  
ramulis 4-6. opposita remota tenera vix vestita inter  
rima tripollicaria. Petioli unguiculares. Racemi duo  
in apice squiflori folia dimidia brevior. Flores videntur ex  
affinis M. diphyllo et forte non divers

ad nuda an accidit an eadem

Coniacea Malpighia foliis lanceolato-ellipticis <sup>integerrimis</sup> supra nitidis subtus costa pube  
scentibus; racemis terminalibus.

Ulex affinis laurifolia Sloan & 163 fig. 1.

Malpighia Coniacea foliis ovatis acutis integris utraque glabris; racemis

terminalibus fructu Sw. prod. pag. 74

Habitat in Montserrat Dr Ryan

Rami teretes glabri, cortice cinereo, apice ferrugineo tomentosi nitidi: ramuli  
subtetragoni, & villi minutissimi adpressi cinerei.

Folia opposita, petiolata, 3-5 pollicaria, elliptico-lanceolata, acumi  
nata, basi apiceque acuta, integerrima, glabra simpliciter venosa,  
supra nitida, subtus ferruginea, ~~gl. fere glabra nisi ad glabram costam~~  
pubescentia, costam fere glabra.

Petioles unguiculares, cinerei.

Racemus terminalis saepe cum ramulo alterius exispiant, erectus,  
palmaris. Pedunculus teres, canescens, superne angulatus:  
pedicelli plerumque oppositi, solitarii, frequentes, unguiculares,  
uniflori, vellosissimi.

Bacca magnitudinis ppisi, Stylis tres

aleam in Montserrat lecta Dr Ryan via fructu diversam

Malpighia

Tapijracoyana Marogr. hist. pag. 134

Malpighia buxifolia

foliis cuneiformibus glabris floribus racemosis

West Puerto Rico

antheris <sup>cat. p.</sup> intus villosa nives membrane

Arbustula. Rami teretes glabri cortice cinereo. Ramuli <sup>antheris anno velosi</sup> sparsim  
conferti subarticulati inferne aphylli superne foliosi

folia subsessilia opposita versus apicem conferta. semipetiolica  
contingente  
na integerrima sup. facies fere buxi. basin versus attenuat.

hymna axillaria subtus pallidiora <sup>venis fere venosa</sup>  
pedunculis filiformis villo raris aureis <sup>notis adpres</sup> <sup>6-8 flori</sup>  
pedicellis racemi axillares folio vix longioribus paucifloris bracteis minui  
pedunculo <sup>to grato acuto</sup>  
demidis breviora Petala rosea

conferatur cum lucida Guigo Swartz

Chrysophylla Malpighia foliis ellipticis membranaceis acuminatis subtus villosi,  
racemis terminalibus; pedicellis aggregatis  
Malpighia altissima foliis ovato-oblongis, subtus tomentosi; floribus al-  
bis fissatis Clubl. fl. gu. pag. 455. tab. 101. Certe quam maxime simi-

Habita Cay in insula Trinitatis ab v. Roko &

Rami teretes, superiores ferrugineo-tomentosi

Folia petiolata, opposita, basi tripolliaria, integerrima, basi plerumque  
obtusiora quam in crassifolia, acuminata, obtusa: juniora utrinque  
e villis brevibus copiosis ferrugineo-tomentosa, atate supra glabra, nitida,  
subtus parum pallidiora, ferrugineo-villosa, utrinque venosa.

Petioles semitergiculares. Stipulae ut in Mal. crassifolia.

Racemi terminaliter, solitarii. Pedunculi 5-6 polliarii ferrugineo-tomen-  
tosi uti pedicelli, a basi fere florigeri. Pedicelli aggregati, 3-4.  
alberrimi, in summo pedunculo brevi, communia insidentes.

Styli tres.

In multis similibus Mal. crassifolia, ut facile exis varietatem esse esse  
desem: specie vero distinguit oculatissimus indagator, invarians, scilicet  
certe in nonnullis, uti: villis magis ferrugineis, foliis <sup>acuminatis</sup> tenerioribus, utri-  
que venosi nec tantum supra, acuminatis, Racemo longiora, floribus copiosis  
nibus, retinaculis intra floris uti semipolliaribus

Crasifolia Malpighia foliis ellipticis obtusis subovatis, subtus villosa. Tomen-  
tosi, racemis terminalibus, pedicellis aggregati

Malpighia crasifolia: foliis ovatis integerrimis subtus tomentosis, racemis termina-  
libus. Lin. V. pl. 426. Aubl. fl. Gu. pag. 457. Tab. 102.

Habitat Cayenna in V. Rohr

Rami teretes, inferne glauci, glabriusculi, superne cinereo-nufescentes. Tomen-  
tosi

Folia petiolata, opposita, 4-5 pollicaria, elliptica, obtusissima, basi acuta,  
integerrima, venosa, adulescentia supra glabra, costa cinerea: juniora  
villosa-subtomentosa cinerea; subtus nervosa, subavenia, cinereo  
nufescentia e temento tenuissimo, State saepe nuda.

Petioles pollicares; tomentosi. Stipulae intrapetiolares, seminae unguiculares; ob-  
longae, obtusae.

Racemi terminaliter, solitarii. Pedunculus quadriflorus, teres,  
cinereo-laviter tomentosus: pedicelli plures, 2-4, aggregati, infimi  
oppositi, superiores alterni, unguiculares. Bractea minuta ad basin  
pedicellorum.

Stylis tres

inciano Malpighia

*Caricicola Malpighii*

Habitat Cayenne Ce Blond herb La Martini  
Ramis teretes, superne ferrugineo subtomentosi, uti pedunculis. Racemi pin-  
plicis

Ved. La Mart.

*Inflorea Malpighia*

Habitat in St. Domingo herb. La Revell. le Paux  
Caulis scandens, superne canescens. Folia petiolata, opposita, 2 pollicaria  
ovata, acuta, integerrima, membranacea, venis glabra. Pediculi axillares,  
serique pollicares, diphylli. Folia <sup>la</sup> cordata, v. est semipollicaria. Pedicelli gemini,  
1 flori, pollicares, canescentes. Petala unguiculata. Stili 3. Intra vel, baccis piceis,  
1 sperma, globosa, peso major, obsolete angulata, glabra.

Coryata Malpighia

*Malpighia altissima* Aubl.

Habitat Cajennae herb. la Manvui la Blond <sup>elliptica</sup>  
Rami teretes, glabri. Solia petiolata, 4n pollisana, glabra, supra nitida,  
obtus, basi acuta, subtus tenuissime venosa, costa villosa. Pedunculus  
terminalis femineus. Flosculi aggregati, mutantes in racemo  
simplici.

habes

*Catifolia Malpighia* foliis ovatis oblongis, racemis axillaribus

Habitat herb. Tuz.

Rami virides, superne compressi. Folia breviter petiolata, spithamea, glabra, venosa, membranacea. Racemi axillares, solitarii, terminales gemini, foliis dimidio breviores, multiflori. Petioli basi subtus glandula gemini. Pedunculatus, uti pedicelli et calycis margine villosi-cinerei. Pedicelli oppositi, bracteis minutis subulata, glandula fusca ad basin singuli pedicelli. Calycis lacinae oblongae.

*Dubra Malpighia*

Habitat herb. Tusf.

Folia oblonga, basi tripolliciana, subovata, venosa, supra nitida, subtus reticulata, venis albidis, utrinque glabra, acuta, cylindrica. Racemi sicuti in hunc modum  
Racemi compositi, simpliciter vel pedunculis bistrifidis gemmineo-tomentosi

glandulosa Malpighii

Habitat herb. Fusf.

Stem glabris. Folia elliptico lanceolata, bipollicaria, attenuata, utrinque acuta, venosa, membranacea (minima concava ut habet Cav) Petiolus apice utrinque glandula fusca. Pedunculi compressi, apice bifidi, semipollicares. Oculi rufi  
mof

macrophylla Malpighia color ellipticis coniacis supra nitidis fectus racemis que  
tomentosi

Habitat in Brasilia hab. Fus. 5

Rami glabri, crassitie penna anserino cygneo, superne compressi. Solia petiolatis, semi  
pedalis, utrinque obtusissima, integerrima venosa, remote nervosa, lineata, su  
peru glaberrima, subtus costata, eglandulosa. Stipula utraque in axillis  
ovata concava, obtusa. Petioli unguis ulares, valida. Racemus bive  
tripollicaris: pedicelli brevissimi, flores penduli. Glandula calycis oblonga,  
glabra, flavescente

Molpughia folio ovato - oblongo obtuso coriaceo, racemis axillaribus subgeminis  
42

Habitat herb. Guaj. 5

Rami teretes, glabri, rigidi. Folia petiolata, s. 6 pollicaria sesosa, utrinque <sup>expansulosa.</sup> glabra,  
petioli glabri. Racemi interdum gemini, foliis triplo brevioribus. Peduncululi rigidi  
vellosi, canescentes. Flores copiosi, oppositi, breviter pedicellati. Bracteae minute  
pubulatae. Baccis nigris tomentosis.

sub nomine nuni folio descripti sed ut recte.

buxifolia M.

monlla longata La Martine

Folia interdum pollicaria et ultra

~~Macron S. calycibus fructiferis clavatis, petalis semilobis fasciculato floribus  
terminali Dichotomo, foliis obovatis S. V. p. 421. Kart. V. 3.~~

V. 32

Habitat

ab orchidea vix diversa

*Dubra M.* foliis ovato-acutis castilagineis glabri ramis pinnatis,  
floribus racemosis minimis Cav. Desf. V. p. 413.  
Tab 242.

accidit ad Barnutenam a Ryano data foliis laevibus herb. Guss.

ponidi

glabra M. foliis ovatis integerrimis glabris; pedunculis umbellatis An.  
S. V. pag. Mill. Diet. 7. 181. fig. 2.

Arbor baccifera, foliis subrotundo, fructu cernuo sulcato rubro polypereno:  
osticulis canali ulatis Sloan. hort. 2. p. 106. t. 207. fig. 2.

Cerasus jamaicensis, fructu Tetrappereno Comm. hort. 1. p. 145. t. 25.

Habitat in Jamaica, et America Meridionali.

Rami cortice crispante punctati. <sup>glabri</sup> folia petiolata oblonga acuta  
obtusae interdum emarginata, venosa bipollicaria, peduni  
axillares et terminales oppositi foliis breviori filiformes, pedi  
celli umbellati inferne versus bracteati longitudine pedun  
culi

oblongis umbellis axillaribus pedunculatis

*Cucida M. foliis obovatis cuneiformibus integerrimis enerviis nitidis, pedunculis terminalibus multifloris Sw. prodr. pag. 74.*

*Habitat in India occidentali 5*

*non vidi*

<sup>nu</sup>  
munic folia Malpighia foliis ovatis integerrimis glabris pedunculis unifloris lin. S. V.  
p. 426

Ceraptes americana, myrti conjugatis foliis, fructu aceto tetrapyrreno Planch.  
alm. 94. t. 157. fig. 4.

Malpighia male punicea Plum. gen. 46. t. 166. fig. 4

Malpighia fruticosa erecta, ramulis gracilibus patentibus, floribus solitariis  
Brown. jam. 230

Habitat in America meridionali

folia pollicaria, oblonga, mucrone minuto terminata, utraque acuta.  
Rami apice allofoli herb. Fus

Solitariis

michi haud satis nota specimen unum in vidi in herb. Fus.

martiniensis M. foliis ovatis subtus setis decumbentibus hispida.

Taiqu-hut-pag

Habitat in Martinea

valde simili M. glabra

non vidi

urens M. foliis oblongo-ovatis. setis subtus decumbentibus rigidis, pedunc  
culis unifloris aggregatis Mell. c. 101. fig. 1. Lin. spec. pl. pag. 6094

Malpighia latifolia, foliis subtus junos Plum gen. 4. 6. Det. c. 4. 167. fig. 1

Arbor baccifera, foliis oblongo subtilissimis spinis subtus obtusis, fructu serotino  
sulcato, polypireno: operculi canaliculati Sloan. her. 2. p. 106. t. 207. fig.

Habitat in America calidior. 5

Ram. teretes glabri cortice fuso griseo punctati: ramuli videri ad  
folia alternatim compressi oppositi. <sup>interdum canaliculati</sup> folia petiolo opposita, ovalia,  
bipolliciana et ultra nervosa venosa acumine breviter minutata  
pedunculis axillaribus oppositis feliformes foliis brevioribus. p. 101

alia species Pichardis infestissima dicitur pedunculis quoque aggregatis hinc  
affinis extat quoque in Plameno

Plum. c. 167. fig. 1

~~notatur in Plameno quo in macedonia~~

incana M. foliis lanceolatis attenuatis subtus petiis adpressis un-  
bellis axillaribus sesquialteris

Habitat in America meridionali

Rarum superne pelopisculi. folia petiolata opposita  
bi polliciana acuta mucronata obscure vireo-fusca  
pallidiora petiis longis adpressis fere ut in M. uscata.  
pedunculis foliis triplo brevioribus infer tractat sursum  
seque crispis

~~an sagifolia Sw~~

angustifolia Mal. foliis linear lanceolatis: setis utrinque decumbentibus rigidis, pedunculis  
umbellatis Lin. S. V. p. 426. Jacq. Amar.

Malpighia angustifolia, foliis subtus spenoso Plum. Gen. 46.

Habitat in America meridionali.

Rami tenues, apice villosi subsericei. Folia petiolo attenuato, acutis  
in pollicana subavenia

Rami teretes glabri, ad folia parum latiores, minime scabri sed habet  
Rarum. nec nodosi. Folia pollicana mucronata, utrinque <sup>setis</sup> ~~setis~~ decumbentibus,  
subtus pallidiora. Umbella breviter pedunculata

Var. foliis 2-3 pollicantibus, lato lanceolatis herb. Juss.

~~folia non vidi~~

aguiifolia M. foliis lanceolatis dentato-spinosis subtus hispida Lin. S. V.

pag

Melpeghia angustis et acuminatis aguiifolia foliis Plum gen. 46. ic. 168.

fig. 1.

Habitat in America calidiora &

Rami erecti teretes glabri folia brevifloris petiolata <sup>holliana</sup> margine denticulatis nonnullis feta rigido-verminatis. Pedunculi axillares plures semper unguis alari uniflori

*Lagunea M.* foliis oblongis ovatis integris subtus sericeo nitidis; pedunculis  
tripartito umbellatis Sw. prodr. p. 74.  
Habitat in India occidentali.

non vidi

Coccyza Mal. foliis subovatis dentato-spinosis Lin. S. V. p. 426. Jacq. Coll. 2. p. 311  
Malpighia humilis, ilicis Coccyz glandifera Folio Plum. gen. 46. Fr. 16 p. 2.  
Habitat in America calidioribus

Rami tertiis articulis ramuli tenues purpurascens articulati scabri  
superne villis minutis adpressis. Folia petiolata glabra femineunguicularia  
vel primum majora copiosa supra nervosa venosa subtus laevia. <sup>adpressis</sup> stipulae  
utrinque bipalati minutae. Punculi axillares, capillares, sedus mediani  
bracteis brevibus minutis alternis approximatis, folio longiores solitarii

ovato-obovatis glabri integerrimi dentato-spinosis integerrimisque

folia ramorum sterilibus integerrima Richard.

etida Mal.

Foliorum lanceolatis integerrimis glabris, spicis lateralibus Lin. S. V. p. 226 Jacq.  
Sw. obs. p. 1017  
Malpighia foliis oblongo-ovatis utrinque nitidis racemis axillaribus Jacq.

Habitat in America

Nylus unicus Jacq.

Fructus ovale: caule erecto ramis tereti leviter: ramis decussatis  
erectis teretibus, cortice nitente. Folia petiolato decussata, oblan-  
ga apice obtusa integra, margine convexo, nervosa, venosa, costi-  
frentia, pallida viridia, nitida. Petioli breves. Racemi axilla-  
res foliis breviores multiflori: stylis 3. Swartz.

Folia Symplococarpa, lanceolata elliptica, attenuata, uti rami gla-  
bra, membra nacea, senesca, nitida, quaeque pollicaria, glandulosa  
racemi axillares: pedicelli oppositi, ubi pedunculor villosi herb. Trup.

brevioribus

nitidis racemis axillaribus foliis

foliis elliptico lanceolatis

michi haud satis nota

diphylla M. foliis oblongis <sup>concoloratis</sup> glabris racemis terminalibus ramulis diphyllis  
Malpighia diphylla foliis ovalibus glabris; racemis terminalibus. L'Esq  
h'ist.

Habitat in America meridionali. Bipollitana spe parva emargin  
Indes erectus octopedalis. Folia opposita ad apices <sup>na x</sup> ramulorum  
Racemi bipollitares flores glabri

scandens & foliis ovatis serratis villosis, floribus axillaribus, cauli scandente  
Thunb. fl. jap. pag. 313. p.

Habitat in Japonia

Caulis feli formis, ramosis, pumraescens, glaber. Folia a singula gemma tria  
vel quatuor, sub sessilibus, acuta dentata, dentibus setaceis utroque villosa  
unquidulana. Flores solitarii

in genere dubitat Thunbergus

odorata M. foliis ovatis emarginatis utrinque tomentosis saepe herb.  
pauc.

Habitat in America

non vidi

altissima M. foliis ovato oblongis acutis rigidis pilosis subtus tomentosis  
pinnis terminatis. Club. fl. gu. pag. 455. Tab. 101  
Habitat in Guiana

non vidi

*glandulosa* M foliis lanceolatis basi biglandulosis floribus racemosis  
monogynis Cavan. Desf. P. p. 411. t. 239. fig. 2.

non vid.

incana Malp. foliis lanceolatis attenuatis puberulis petioli adpressi umbel  
la

conica M. foliis ovatis acutis integris utrinque glabris; racemis termina-  
libus spicatis. Sw. prodr. pag. 74.

Tilia affinis laurifolia Sloan herb. 2. p. 163. fig. 1.

Malpighia C. Brown. jern.

Habitat in Jamaica

*Rapula* <sup>vata</sup> <sub>foliis lan-  
ceolatis</sub> attenuata glaberrima laxis integerrima supra multinervia  
subtus venosa. Petioli tomentosi costa folii supra inferne  
velloso cano pedunculi terminalis sectus angulatus ferrugineus  
pedicelli nudi sparsi solitarii gemini vel plures. Bractea sub-  
tata, flores nudi calyx supra glandulis villis et auris

Secund. herb. Surinam Cerasus racemosa foliis subtus aureis Plum. hinc pertinet vel  
ad Cory: La Martini notus  
— lanceolato-oblongis

Spicata Cavan. hinc pertinet

Manilla longata La Martini est Malpighia mea foliis subtus toment.

discolor M. foliis oblongis sul oblongis glabris obtusis inferne puber  
quida his ramisque glabris raris terminalibus

Habitat in canibus

affinis exacti M. conata at folia latiora obtusa utriusque  
venosa rami uti peduncululi glabri

Arenaria

ar menaia M. folius ovato lanicolati ~~bif. long.~~ magnis,  
spicis longis axillaribus, bacca villosa Cavan. Desf. bot. O. p. 410.  
Tab 230

non vid.

grandifolia M. foliis lanceolato-oblongis, racemis corymbosi  
axillaribus. Gaëqu herb.  
Habitat in America

non vidi

*Crasifolia* Mal. foliis ovatis integerrimis subtus tomentosis, racemis terminalibus Lin. Spec.  
pl. p. 610. S. V. pag. 426. Aub. fl. guian. tab. 102

*Tilia* affinis *laurifolia*, arbuti floribus albis racemosis odoratis, fructu pentagono  
Sloan. par. hist. 2. p. 20. t. 163. fig. 1.

*Malpighia arborea* floribus spicatis, foliis ovatis acuminatis Brown. jam. 230.

*Malpighia arborea*, foliis subrotundis alternis inferne sublanuginosis, spicis  
*Crasidis* compositis terminalibus Brown. jam. 231. v.

Habitat in America calidioribus

Arbor foliis ovatis palmatis crassis, subrotundis, supra pubescentibus, subtus  
tomentosis, saepius alternis. Racemi terminales longi tomentosi. Lin.  
Spec. l. c.

obtusobasi acutis

manila M. foliis ellipticis lanceolatis acuminatis subtus tomentosis supra  
state glabris raris terminalibus  
malpighia manila foliis ovatis integerrimis rigidis subpilis  
latipellis, spica terminali elongata Aubl. fl. gu. pag. 489.  
Tab. 183.

Habitat in America meridionali  
tam superne leviter tomentosa. Folia petiolata opposita  
tripolliciana supra venosa juniora cinereo tomentosa state  
nuda nitida subtus nervosa ferruginea tomentosa pedicelli  
gemini vel solitarii

Folia 2-3 polliciana, oblonga, obtusissima, basi acuta, venosa, juncea utri-  
que tomentosa, state supra glabra. Auchenio nudo tomentoso herb. Guaf  
— utriusque acutis

conspicua M. foliis oblongis obtusis pubescentibus, racemis axillaribus com-  
positis Hort. kew. 2. p. 105.  
Habitat in India occidentali.

Verbafifolia M foliis lanceolato-ovatis tomentosis integerrimis, racemis terminalibus  
Linn. Spec. pl. pag. 610. \* S.V. p. 426. Aubl. flor. Guian. Tab. 104.

Baccifera arbor calyculata, foliis laurinis, fructu racemoso esculento subrotun-  
do, monoplyreno pallide luteo Sloan h. 2. p. 198. fig. 2.

Malpighia humilis, verbafifolia et facie caule crassissimo Barr. squam. 71.

Habitat in America calidioribus.

Folia lanceolato-ovata, in petiolos desinentia, pedalia <sup>tomentosa</sup> villosa, subtus densissi-  
mo tomento <sup>et omentis</sup> vestita. Racemi terminales longi, villosi. Linn. L. c.

folia supra rugosa

foliis cuneatis — — — — — supra rugosis

~~non nisi folium vidi~~

ineficax Malpighia foliis oblongis obtusis pubescentibus, racemis axillaribus compositis

Hook. & Thunb. p. 105

Habitat in India Occidentali

non vidi

*glandulifera* Malpighia

*Malpighia glandulifera* Jacq. coll. 4. p. 207.

Habitat in Cambar 5.

Arbustula ramosa. Folia breviter petiolata, ovata, acuminata, raris  
venis sine crenulata, opposita 3-5 pollicaria. Nervi axillares  
solitarii, simplices, erecti 4-5 pollicares. pedicelli oppositi, suprema  
glandula nitida truncata, crudi. Calycis foliola villosa. glandu-  
la calycina calyce majori crata inaequali. Petala lutea  
crassa. Stylus. Stigmata tria. Rami juniores, rari, pedicelli  
pedicelli et folia utraque opposita lentis pilis decumbentibus Jacq.