

Malva

Si non fallor Calyx^{exterius} in omni malva triphyllus observari auctem
in variis ex his dictis calycibus exteriori & triphylo, calycem prope triphyllum in aliis spec: 2 est. in
aliis 1 phyl et interdum nullum in his Calyx exteriori descendens est in triph: magis persistens

Spithamea Mal. foliis subrotundis crenulatis calyce enter. setaceo

malva *Spithamea* caule *Spithameo*, foliis minimis subrotundo
crenulatis, calyce extenso diphyllo aut monophyllo Cavan
Diss. pag 67 tab. 10. fig. 7.

Habitat in Hispania. ☉

Caulis viri albus. Squala capellari. pedunculi axillares.
solitarii uniflori. Corolla alba capsula 3. Cavan.

non vid. an specimen pupillum malva rotundifolia

rotundifolia M. caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete
quinculobatis, pedunculis floriferis declinatis RV
fl. Dan. tab. 721. Carum Desf. p. 74 tab. 26 fig. 2
malva sylvestris pumila Buch-hist. 500.

malva sylvestris, foliis subrotundo Bauh. pin. 314.

Habitat in Europa nideratis, rici, plateis &

Caulei plures prostrati villosi. Folia petiolis multo breviora

cordato-subrotunda, ope lentis rarisimè pilis adper-

sa 5-que nervia. Stipula ^{crenata} oblonga parva ciliata

Pedunculi 2-5 axillares uniflori petiolo breviori

foliolo Calyx pilosus pleurae externae linearia

petalo Corolla parva calycis longior alba apice violacea
purpurascens. Capsula 15.

hispanica M. caule erecto, foliis semiorbiculatis crenatis: calyce
externo diphyllo. Loefl. d. 1574 Lin. Spec. pl. p. 9704
malva rotundifolia glabra ex hispania, flore amplo in
belle Plukh. alm. 230. t. 44. fig. 3.
Habitat in Hispania ☉

Tota planta villosa cinerea. caules erecti digitales vel
fruticatosi ramosi. folia petiolata unguiculata. Stipulae
subulatae parvae. pedunculi axillares solitarii super-
ne conferti. foliola calycis exteras linearis lanceolatae
corolla alba magnitudine fere Malv. sylvestris

Malva hispanica caule erecto villosa, foliis crenato-den-
tatis, inferioribus semiorbiculatis superioribus subhor-
bordatis supremis angustis: calyce externo diphyllo
Baran. Desf. pag. 62. t. 19. fig. 3

Erdia malva

malva cretica caula semi-pedati-hirsuta, foliis cordatis subrotundo-
lobatis venatis floribus platanis longe pedunculatis Cavan. Diss.
pag. 67. tab. 130. fig. 2.

Alcea cretica hirsuta Tournef. Cor. pag. 2.

Habitat in Oreta &

Caulis gracilis, hirsutus uti tota planta. folia inferiora
~~longa petiolata~~ petiolo breviora, cordata subrotunda
stipula lanceolata subannulata. pedunculi petiolo longior
res. foliola 3 calycis angusta Cavan

non vidi.

Cactea M. Guatemalensis, foliis angulatis acutis cordatis villosis, ^{ne} ~~parta~~
lis obcordatis calycibus brevioribus, pedunculis paniculatis

Hort. Vindob. 2. p. 440.

Habitat.

†

umbellata Malva foliis cordatis quinquelobatis, floribus umbellatis Cav.
vi. pag. 64. tab. 95

Habitat in Mexico

Caulis tomentosus Vasei. Stipulae petiolo aequalia subbis subto-
mentosa. Stipulae lanceolatae. Umbellae 5-que florum
axillares, pedunculatae. Videsi pollicares. Calyx
exterior ^{interdum 4-phyllus} foliolis orbiculatis concava-
ris deciduis. ^{exterior at omnium} Calyx interior ^{laevissimus} lacinis ^{tomentoso}
Corolla quae violacea. Fructus globosus polyspermus
Cav.

non vidi

Malva caule erecto oxyali ramoso, foliis quinquelobatis crenatis
vellopi: axillis multifloris Cavan. in 1. pag. 13. Tab. 20 +
Habitat in Mexico 4

Caulis oxyalis ramosus rami juniori. Tomentosi. Staba
glabri. Folia petiolis tomentosis longiora. Stipulae lan-
ceolatae reflexae. Flores subracemosi. Calyx exterior
2-3 lobatus laciniis interioribus ovatis corolla alba caly-
ce parum major. Capsula membranacea Cavan.

non vidi

abulea fo Malva

Malva abulea fo caule scabro tomentoso, foliorum inferiorum basi cuneata
v. anguata, superiorum cuneiformi, flombus breviter pedunculatis
Cavan. Diss. p. 76 tab. 34. fig. 3.

Habitat in hispania

Caulis bipedali uti tota planta tomentosa. Folio inferiora
longissime petiolata 5 angulata anguli obtusi superiora
basi cuneiformia 5-7 lobata lobis profundi unguato-denta-
tis. Stipula lanceolata. pedunculi interdum gemini
foliola exteriora calycis lanceolata Cavan

non vidi

Lobata Malva

Malva lobata foliis sub-ovatis quinquelobatis crenatis tomentosis; flori-
bus axillaribus et fastigiatis. Caran. Diss. p. 76 tab. 1. Fig. 4.

Habitat

Tota planta tomentosa: lobi crenati. Sepala ovata parva
foliola extenoni calycis ovata. Corolla magna Caran

non vid.

fastigiata Malva caule tomentoso, foliis cordatis 5 lobis lobis acutis floribus
glomeratis fastigiatis

Malva fastigiata caule tomentoso, foliis cordatis 5 lobatis: lobis acutis
medio productione, floribus fastigiatis conglomeratis Raven. Dis/p. 75
tab. 23. fig. 2.

Habitat in montib. Arvernens

Caule teri bipedali. Folia crenata lobo medio longiore. Stipula
canaliculata. foliola calycis extenora lanceolata acuta. Petala
emarginata. Caps: 12 Raven

non vid.

Sylvestris M. caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedun-
culis petiolisque pilosis Lin. Spec. pl. p. 969 & Cavan. Duf. p. 24
Tab. 2

Malva sylvestris recta Cord. hist. 114.

Malva sylvestris folio sinuato Bauh. pin. 314.

Habitat in Europa campetribus

Caulis prostratus

Caulis erectus teres scaber a tuberculis minuti piliferis

Folia petiolata inferiora 7 lobata superiora 5-que lobata

Malva sylvestris ultima 5-lobata, glabra subtus inae nervi pilosa
caule scabro, lobi oblongi subaequaliter serrati. Stipula lanceo-
folia 5-7 lobi crene lato petioli villosi prope apicem. Pedun-
culi dentatis, calyce cili axillares saepe 5-que usque 5 lobatae subae-
quales
exterioribus subnatis
phylo Cavan. Duf. uti calycis villosi foliola calycis subnatis decidua
p. 70. t. 26 fig. 2

Corolla corollae rotatae petalis 5-lobatis. Capsula
10 nervis glabra

Sylvestris

M. caule scabro erecto foliis 5-7 lobis serratis acutis
pedunculis petiolisque pilosis

14-15 Nicoensis Malva ^{glomerata} caule decumbente calycibusque pilosis, foliis quinquelobatis.
Malva montana; caule decumbente, foliis quinquelobis serratis villosis, mollibus.
 Calycibus axillaribus glomeratis, villosis Costa descr. pag. 124.
Malva nicoensis caule piloso decumbente herbaceo, foliis subcordatis quinquelobis,
 lobis acutis, pedunculis erectis Allion. flor. Pedem. n. 14/16. #

Carson. Desf.
 pag 79. tab
 25. fig. 1.

Petiolis supra pilosis fioni subtus nudis ^{caulis} Malva nicoensis la. Malva nicoensis All. fl. l. c.
 a Malva nicoensis, quam benevolentia All. debeo, in ^{Malva nicoensis} nullo alio differt modo.
 villositate majori in foliis junioribus ceterum omnia eadem. Valde affinis
Malva nicoensis est, an reverse diversa?

Habitat in ^{alveis} Italia ^{et} francia oriente ^{et} Stellatis
caulis ^{decumbens} villosus ^{ramosi} caulis ⁱⁿ culta ^{spere} tripedales
folia petioli brevis basif subcordata lobi ovati obtus.
crenata. Stipulae oblongae crenatae petioli apice pilosi
pedunculi 3-5 in frangula axilla brevis inaequalis, uniflori
calycis externi foliola oblonga interni lacini ovato
ambo crenato. capsula 11 subvillosa corolla malva rotunda
in folia

crassifolium

Sinenfis Malva

Malva sinensis caule herbaceo retinato glaberrimo, foliis quinquelobatis
obtusis crenatis, floribus paucis axillaribus numerosis. Caran
Du. p. 77. tab. 25. fig. 4

Habitat in China. O

Caulis teres, uti tota planta glaberrima. Folia longe
petiolata cordata. Stipula lanceolata. Flores 5-6 in
singula axilla. Siliola calycis extensa ovata
Corolla albicantha lineis purpureis. Capsula 10 mutica.
Caran.

non vidi

Spicato

Troglus Lappago. Cal. communis valvula monophylla

mauntiana M caule erecto herbaceo, foliis quinquelobatis obtusis,
pedunculis petiolisque glabris pilis Lin. Spec. pl. p. 970
Malva major Ventii Galech. herb. 586.

Malva hederacea folio Bauh. pin. 315.

β. Malva folio ficus altera Bauh. prodr. 137. pin. 315.

Habitat in Italia, Lusitania, Hispania O. Babona

Caulis erectus teris ramosus 4-5 pedali folia magna
basi ^{cordata} inferiorum petioli rariorem brevem glabra utraque nisi sub
tus ad insertionem petioli 5-que lobata supra triloba
lobi rotundati serrato crenata. Stipula parva lanceo-
lata, Petioli supra canaliculati, pili nonnulli utrin-
que ad marginem Pedunculi 3-5 petiolo breviores
opae centi parte pilosi. Foliole calycis extensa oblonga
ciliata uterque rare pilosa. Rete Corolla malva sylvestris
numa ^{major} Capsula glabra rugosa

maunt - M. caule erecto glabra ^{lovi} ————— Antobis que obtusi

Malva mauntiana caule erecto sublobis foliis
cordatis crenatis 5-que lobatis floribus numero-
sissimis rubescentibus: Stipuli connatis Cav. Diss. p. 77. t. 25
fig. 2

parviflora: caule patulo, foliis angulatis, floribus axillaribus
sespiteris glomeratis, calycibus glabris patentibus Sprengl. p. 969
Gacq. hort. tab. 39.

Malva annua rotundi-folia, floribus omnium minimis albis
pentapetalis verticillatis generulo ambientibus Monj.
herb. 2. p. 521.

Malva Unguitana, flore conico, parva Plukh. 44. fig.

^{2.}
Habitat in Barbana O
a rotundi-folia differt caule erectiusculo foliis acutioribus
apice petioli ascendente. Calycibus glabris exterius linea
nervi lanceolato. flores sespiteri capsula supra rugosa et
ad latera dentata Lin

Folia longe petiolata, 5-7 lobata angulata: lobi rotundati glabri
subaequaliter crenata. Pedunculi axillares vix unguiculati
uti calyces pilis raris adspersi herb. her
aliud specimen foliis villosis

in herb. deperdit

vestiellata M. caule erecto, foliis angulatis, floribus axillaribus
sespibus, calycibus scabris L. f. V. Faigu. hort. Tab. 40

Malva annua rotundifolia, floribus omnium minimis albis
pentaphyllis vestiellatæ genicula ambientibus Monj. hort.

2. p. 521.

Habitat in China O

Caulis teres puberulus. folia superiora reniformi lobata
superiora cordata quinquelobata crenata stipula
canaliculata flores in axillis glomerati omnes fere
sepales uno alterove pedicellato. foliola calycis extensa
in lineari. Corolla alba apice purpurascens.
Calyx villosus, fructus fere venoso reticulatis. ~~fructus~~

crispa M. caule erecto, foliis angulatis crispis, floribus axillaribus
glomeratis P.V. Cavan. dupl. p. 74. tab 23. fig. 1.

malva crispa God. pempt. 653.

malva foliis crispis Bauh. pin. 315.

Habitat in Syria

Caulis erectus glaberrimus sulcatus 6 pedalis ramosis
sulca remotissima petioli breviora magna glaberrima
ma excepto ad insertionem petioli, subrotunda basi corda
ta 7-7 lobis subtilissime crenulata crispa. Stipula
lanceolata ^{obovata} Petioli supra utraque ad marginem versus
apicem villosi. flores axillares copiosi glomerati.

Calycis villosi - foliola extenoni linearia lanceolata 4
petala emarginata d. luteo purpureo. Capsula glabra
marginem rugosa

fructiferi
si vendi

— lobatis — glabri

alcea M. caule erecto, foliis multifidis scabrisculis Linn

alcea vulgaris Clus. hist. 2. p. 25.

alcea vulgaris major Bauh. pin. 316.

Matru alcea caule erecto glabro, foliis cordatis inferioribus
subrotundo peltatis crenatis reliquis profunde quinque
partitis Cavan. diss. p. 123 t. 17. fig. 2 non bona

Habitat in Europa &

Caulis erectus tuberculis piliferis. Folia ^{tri-5-nervia} 3 vel quin-
quefida laciniis oblongis obtusis dentato paucispin-
to. ^{nerv. 3-5 nervia} Stipula lanceolata. Flores axillares solitarii
terminales congesti pedunculati calycis pilosi
exterior folioli lanceolati

capsula
~~terminalis~~ glabra

~~moschata M. caule erecto foliis radicalibus reniformibus incisiss,
caulinis quinquepartitis pennato-multifidis Len. l. V. p. 626
Alcea foliis rotundo laciniato Bauh. pin. 316.
Malva montana f. alcea rotundifolia laciniata Col. Ceph.
1. p. 140-147.
β. alcea vulgaris minor Bauh. pin. 316.
Habitu in Gallia Italia. 4
Semina lipida~~

moschata

radicalibus reniformibus incho. caulibus sparsis

~~Alcea~~ M. caule erecto, foliis ~~multipartitis~~ ^{radicalibus reniformibus incho. caulibus sparsis} ~~scabris~~ dent. v.

pinnatifid. multifidis Lin

Cavan. Desf. pag 126 tab

pag. 10. fig. 1.
~~Alcea vulgaris~~ ~~Claf. bot. 2 p. 25~~

~~foliis rotundis laciniatis~~
~~Alcea vulgaris major~~ Bauh. pin. 316

Habitat in Europa. 4

Semina globosa & hispida

~~Malva alcea caule erecto glabra, foliis cordatis inferioribus~~
~~subrotunda palmatis peltatis crenatis: reliquis profunde spar~~
~~tatis~~ Cav. Desf. p. 123. t. 17 fig. 2

caulis pilis raris adpressis ramosis folia inferiora
multifida laciniis linearibus crispis. superiora 5quepartita
laciniis pinnatifidis lobis apice subincisi obtusis subtus
oculo armato pilis aliquot raris. Stipulae lanceo-
latae. Pedunculi axillares solitarii sex niales co-
festi. Palyx villosus foliola exteriora linearibus
fructifer parum inflatus. Semina dorso villosa

malva montana s. alcea rotundifolia laciniata Col
Echp. 1. p. 140 v. 147

Malva alcea vulgaris minor Bauh. pin. 316

Stipulacea Malva

Malva stipularia foliis inferioribus trilobatis, lobis subrotundis
superioribus palmatis incisive stipulis longissimis, calyce exteriori
maiore setaceo Cavan. Des. p. 62. Tab. 15 fig. 2.

~~Habitat in Hispania~~

Malva foliis inferioribus lobatis superioribus palmatis incisive
calyce exteriori setaceo diphyllo asp. Synops. Strop
Amag. pag. 90 tab. 5 fig. 1

Habitat in Aragonia

Caules sesquipedales scabri. folia petiolata inferiora
lobis subrotundis media superiora tripartita
stipulae longissimae unguiculares lanceolatae pedunculatae
axillares solitarii uniflori. Calyx exterior setis duabus
interioribus longioribus exteriori pyramidato pentagono
laciniis nervosis. Corolla perispermica

Trifida Mal.

malva trifida foliis parvis duplicato trifidis, calycibus pilosis
scabris, exteriori diphyllo Lavan. d. f. p. 200. v. 137. ff. 2

Habitat in Hispania

Taliter malva aegyptiaca caulis erectus basi rami aliquot adscen-
dentes simpliciter altitudine caulibus semipedales pilis rari-
scellatis adpressis foliis petiolis brevioribus unguiculatis
tripartitis laciniis trifidis linearibus propinqua
pedunculis axillaribus foliis longioribus. Calycis exteriori
bus staccis saepe duo una. Interior pentagono prope
mediatis laciniis ovatis acutis tubulatis basi pilosis.
corolla pollicari

con mal. stipulari diversa

Tournefortiana M. caule decumbente, foliis radicalibus quinque
partitis trilobis lincantibus, pedunculis folio caulino longioribus.
Lin. L.V. p. 6264 Am. acad. 4. p. 2034

Malva mantima gallo provinciali, geranii folio Tournef.
inst. 90.

Alicea minor mantima tenuifolia procumbens. Herm.
parad. 7. Tab. 7

Alicea tenuifolia humilis mantima gallo provinciali
foliis inferioribus ad geranium accedentibus Plukin. alm.
13. t. 44. fig. 4

Habitata in gallo provinciali, Hispania maritima O. herb. Tournef.
Caulis teres procumbens pedalis. folia caulina pennatifida
apice trifida laciniis ciliatis. stipula lanceolata
pedunculi axillares solitarii uniflori folio longiores.
foliola calycis exterioris lanceolata. Coroll. magna
petala angusta Caran

^{dent. 4 fus.}
Caulis pilis stellatis. Boka radice longe petiolat, vix semipollicaria
tubus pilosa: lacunula obtusa ^{dent. 4 fus.}
~~na~~

Aegyptia M. caule erecto, foliis palmatis dentatis, corollae calycis
minoribus *Lin. S. V. p. 626. & Jacq. Hort. V. 65. Spec. pl. pag. 971*
Habitat in Aegypto. ☉

Caulis erectus spithameus vel ultra inferne panum ramosus
fiaber pilis adpressis Folia petiolata 5 partita
laciniis trifidis incisive linearibus acutis supra
^{sub pilosis} ~~glabra~~ subtus pilis ^{frequentibus in nervis} aliquot ~~minoribus~~ stipula lanceo-
lata ciliata. flores axillares solitarii pedunculati
petiolo longior uti ille villosus. Calyx pilosus
foliicola est exterior linearis interior laciniis
ovatis attenuatis. Petala angusta calycis panum bre-
viora int eisdem longiora purpureo albicantia

maior aegyptiaca caule erecto fiaber, foliis pal-
matis dentatis, corollae calycis brevioribus
exterioris diphylla *Cavan. Diss. pag. 61. t. 17.*
fig. 1.

fiaber

laciniis incisive

popaver mal folus ternatis ^{foliolis lanceolatis} quinquatis ~~quatis~~ caule ~~que~~ crispato

Malva popaver caule hispido parte foliata folus: 5-3 phyllis
calycis estbericis dyphylo Cavan. dos. p. 64. Tab. 15. Fig. 3.

Habitat in Lusitania

totu planta hispita folia petiolata inferiora pent quinata
superiora ternata. Sepalo lanceolato caule latior

Pedunculi terminales, solitarii seu pedales uniflori. Cal.
est 2 phyllis foliolis linearibus Corolla violaceo rubens
Cavan.

prunella M. caule erecto, foliis oppositis & bifidis calycis exterioris
filiformi Ritz. obf. 3. p. 37.

non vidi.

montana Malva caule decumbente, foliis lobis serratis villosis molli-
bus, calycibus axillaribus glomeratis villosis Toepf

Depi: pag. 124

Habitat in Arabia

non vidi