

Malva

malva leprosa caulis prostratis leprosis, foliis reniformibus obliquis crenatis

Vis. Ort. Dec. pag. 95

Habitat in Inf. Cuba

Herbaria

Curasparia Malva

Habitat in Curaspar herb la Martini

affinis plicata. Folia ovata, 7 nervia, mollissima. Spica terminalis
hirsuta.

eadem ac ovata

glabra Malva

Habitat

Les ha Marchii

affinis Mauniana.

Malva

Malva lusitana, Ribesii folio Tournef. Hist. v. herb. pag. 96

Habitat in Lusitania herb. Tournef

Caulis erectus, teres, lavis, raris pilosis, summis. Folia polliciana, latitudine et longitudine squalia, remota, subcordata, subquinqueloba: lobis ovatis, profunde serratis, quinque nervis, villosis, prostratis subtus. Stipulae lineares, erectae, ciliatae, femiinquenervae. Petioli pilosi, longitudine folii. Pedunculi axillares, solitarii, capillares, folios longiores, uniservi, ebracteati. Calycis villosi, incani: exteriori uniphyllus: foliola linearia, interiori ^{et} brenonibus. Corolla Malv. sylvestris minor

betulina Malva

B.

Herb. Ca. Martii

Rami teretes, iniani. Folia petiolata, palmata, ovata, acuta, obtuse serrata,
villosa, suprafiabripula, subtus mollia, ternaria. Stipulae subulatae, minu-
tae. Ocreae axillares et terminales, hispidae, in specie semipollicari confecta

Vitis folia Malva

Habitat

herb. La Revelliere. Le Poux

Caulis teres, superne pilis stellatis raris, apice incanus. Folia petiolata
5que lobata: lobi inaequaliter obtuse serratis, stellato pilosi, pili supra rari-
ores, sulcis frequentiores, venosa. Stipula lanceolata reflexa. Petiol. pilo-
si, sesqui pollicares, folio parum breviores. Pedunculi pilosi, petolo. bre-
viores, multiflori. Calycis foliolo extensa setacea. Flores parvi.

Sepiana nova species

rotifolia Malva

Habitat herb. Tusf.

Rami teretes, superne villosi, incani, inferne glabri. Folia sesquipedali
cana, petiolata, quinqueloba: lobis ovatis, acutis, subinaequaliter
obtusis serratis, quinque nervis, utrinque raris pilosulis lateralibus, junctura
incana. Stipula parva lanceolata. Petioli, uti pedunculi et caly-
ces incani. Pedunculi axillares multiflori. Calycis extenori foliola
brevissima, setacea: lacina interiori crata. Flores parvi. Capsula ca-
vis glabri

biflora Malva

Habitat herb. Tusc.

Cauli erectus, herbaceus, hirsutus, ubi tota planta. Folia tripolliciana,
ovato subcordata, pilosa, mollia, profertim pubes, pili non stellati. Pa-
tuli pollicares. Stipula lanceolata, patenter, unguicularis. Pedunculi
axe steres, biflori, ex apice ramulorum. Calycis foliola exteriora lon-
gitudine fere interiori, lanceolata: lacina interiori attenuata

Cymbalaria folia Malva

Habitat

Herb. Thourin

Caulis herbaceus raris villosus, teris. Folia semipollicaria rotundata puberula
formia, obsolete squeloba, crenata, otulo armato villis raris. Petioli folios lon
giores. Stipulae lineares. Pedunculi axillares, longitudine petioli, uni flori, solitarii
Calycis interioris lacinae ovatae, villosae. Corolla magnitudine *M. sylvestris*

La marit

pubhastata Malva

Habitat herb. Gusf.

Facies Malv. comand. et ameniana. Cauli purpurascens, adpressis pilis stellatis 4 radiatis, radii 2. supra 2. deorsum versus paralleli. Folia subhomboides-oblonga ovata, acuta, basi integerrima et interdum lobis breviter ovato-acuto angulata, inaequaliter serrata, utrinque pilis raris ut in caule. Stipula subulata. Capsula trianistata, margine villosa, in usque eadem planta ut Comand. eliana.

Cobata Malva

Habitat herb. Guss.

Rami inani, teretes. Folia pollicaria, basi vix cordata, quinque nervia, subsessile, canescenti-vindia, supra minus villosa, velli stellati. Calyces inani.

crata Malva

Habitat herb. Guss.

Rami teretes, incani, scabri. Folia oblonga vix pollicaria, subinaequaliter
ferrata, utrinque villosa, subtus incana, nervosa. Flores in flosculis termi-
nati, cylindrica, congesti hirsuti. Capsula laxis, dorso linea elevato, apice
velosa.

cuneifolia Malva

Habitat herb. Tusf.

Raulis, uti reliqua planta pilis stellatis adpressis. Folia semipolliciana
vel ultra, trinerva, subuloba, extropium crenata, intropium integerrima
Stipula subulata. Calycis exterioris foliolo subulata; interioris lacinae ovata

Malva

Malva Lusitania n. b. f. folio Peruv. n. f. 4. R. h.

Habitat in Lusitania

Caulis herbae cius, saepe per, erectus, teres, scaber et punctis raris piliferis: petioli foli-
tari. Folia petiolata, pollicaria, subcordata, squesfida: lacinae serratae in ipso
attenuata, utrinque uti petioli pilosi. Stipulae lanceolatae, vides, pilosae.
Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, terminales ramorum 4-5. uniflori, polli-
cari, scabri, pilosi, supremi remoti subverticillati cum foliis minutis trifidis.
Corolla parum ^{minor} ~~magis~~ quam in moshata. Calycis ^{pilosus} ~~et~~ teneris seleda linearia
Petala retusa. Semina glabra, loria.

malva

Althoa cretica hespeta

Habitat in Creta herb. Mus.

Caules ramosi, decumbentes, pilosi. Folia petiolata, pollucina, basi cordata, 5-7-loba,
lobi ovati, obtuse crenati, utraque pilis adpressi. Petioli folio longiores, pilosi. Stipula
ovata. Pedunculi ex axillis superioribus, solitarii, uniflori, folio longioris, pilosi.
Calyx extensor 3-phyllus: foliolis lanceatis: lacinis interioris unguis ulares,
lineares; tuberculis periferis adpressis. Capsula glabra, lora.

Cretia Malva

Habitat herb. Guss.

Folia semipollucina. Peduncul¹, foli³ subquadr⁴, super²ne, sesquipollucina
res. Calyci ~~exteriori~~ ^{interiori} ~~foliata~~ lacina lanceolata. Hipulo oblongo, acuto,
vinder, integerrimo.

prostrata Malva

Habitat herb. Lusj.

Folia radicalia cordato-subrotunda, incisiva. Lobi foliorum inferne angustati, serrati, pubescentia, glabra. Calycis exterioris foliola oblonga, interiora longiora, acuta pubescentia.

capitata Malva

Habitat herb. 4 usq.

Rami; uti folia et petioli viliis raris stellatis adpressi, apice mucronati. Folia
subcordato-ovata subangulata, vel 3-5 sublobata: lobi crenati. Stylus
lineares. Calyx interior villosissimus.

bonari en fi Malva

Habitat in Bonaria herb. Guss.

Folia sesqui pollicaria, mollia, basi subcordata, ovata, obtusa, Rami inferne
nervi purpureo scentes, superne floside incarnati. Hipule linearis - lanceolata

popaver Malva

Habitat herb. Tusc.

Caulis erectus, uti tota planta adpressis pilis decumbentibus. Foliola lineari
lanceolata, sesqui pollicaria, sessilibus, subtus pilis stellatis 3-5 radiatis, su-
pra simplicibus. Calyx hirsutus: lacinae interiori ovato lanceolata.

Scoparia Malva

Habitat herb. Guaf.

Habitus Malva americanus. Rami superiores villosi, cinerei, inferne purpureo
raspentes, vili ramis, teretes. Folia pollicaria, quinque nervia, in qua
lites obtuse serrata, basi versus integerrima, subtus canescentia, villosa-stel
lata. Flores in axillis ramulorum et apice, congesti. Calycis lacinae inte
rioris ovato, acuta, incurva.

althaeoidis Malva caule prostrato foliis inferioribus lobatis superioribus
5fidis, floribus solitariis longe pedunculatis Cavan. 4to. p. 30
tab. 135.

Habitat in Hispania &

Caulis teretis pilosus saepe bipedalis. Folia radicalia orbiculata
cordata crenata. Lobi superiorum lanceolati serrati. Stipulae
obovatae lanceolatae. Pedunculi axillares solitarii uniflori
Calycis exterioris foliola 3 lanceolata ciliata. Corolla
magna roseo albicans. Cavan.

bryoniifolia M. caule fruticoso tomentoso, foliis pennatis pabris
pedunculis multifloris Lin. l. S. p.

Althoa frutescens bryoniifolia Bauh. pinod. 130. p. 376.

Althoa profunde serrata f. dentata folio Bauh. herb. 2. p. 955.

Habitat in Hispania T. h.

Caulis inermis. Folia basi cordata, utrinque a pili stellati sic aberrante
inqualiter serrata, inferora squeloba, superiora triloba: lobi
ovati, acuti. Stipula lanceolata. Pedunculi amilani et ternaria
les triflori, unguiculati. Calycis exterioris foliolo 3, linearia
interiora pedice vicino tomentosa. Capsula glabra herb. Royen.

Vix in meo herb. & inventis

figura Bauhini herb. mecum nullo modo adferent.
len ad quadrat

mibi ignota planta sub hoc nomine a Ca Barnades
cum D. ferent len. mecum convenit

minuta Malva caule erecto tomentoso foliis trilobatis, fructu
exsertis - Coron. fr. vol. 3. pag 40 tab 270
Habitat 4

caroliniana M. caule repente, foliis multifidis Lin. t. V. p. 625
abutilon carolinianum repens, alio foliis, gilvo flore
Mart. Cent. 34. t. 34.

Abutilon repens, alio foliis, flore helvulo Dill. Elth. 5. t. 19.
fig. 4.

Habitat in Carolina O magis apice

Rami teretes pilis raris adpressis. Folia petioli breviora
ferrato incis, cordato subrotunda glabra nigri juniora pubes-
centia. Stipula oblonga parva. Pedunculis axillaribus

filiformis, longitudine petioli, uniflori solitarii
Calyces pilosi exteriori foliolis oblongis interiori laciniis
ovatis, foliolis parvis

malva carolina caule repente radicante, foliis radicalibus
crenatis indivisis, superioribus multifidis, fructu
in scoto Camm. Det. p. 9. t. 15. fig. multifidis, subpinnatifidis

axillaribus solitariis fructu instructo

prostrata Malva caule prostrato foliis cordatis inciso serratis & que sedis que
floribus axillaribus solitariis fructu glabro

Malva prostrata caule humifuso anguloso, foliis palmato-multifidis
floribus solitariis fructu glabro Caran. disp. p. 59. tab. 16. fig. 3.

Habitat circa monte videt.

multa communia habet cum malva Carolina. Caulei duri
tamen, humifusi ^{super} angulatus et parum villosus. Folium petiolo
breviore vel aequante subrotunda profunde inciso lacini
serratis stipula parva oblonga pediculi vero longitudi-
ne petioli reliqua ut in antecedente

crispifolia M. villosa incana foliis ^{tripartitis} inciso serratis subtus
rugosis; calyx^{te} exteriore ^{lobato} ~~capitulo~~ ~~oblongo~~

Habitat in Cap. b. Spei 5

Taxis M. eleg. foliis tota planta villosa in densis pellatis
sordide ^{gr} ~~inc~~ ana. folia supra plicata subtus venoso rugosa ungi-
culata obtuse serrata. stipula canaliculata petiolo
ramum brevioris. pedunculi axillares gemini lon-
gitudine folii calyx exterior folioli linearis oblongi
lacina interioris ovata. capsula multiloculari
loculis polyspermi villosa. Corolla malva
sylvestris

elegans
abutiloides M. fruticosa incana, foliis profunde lobatis sinuatis
que Lin. Suppl. p. 307. N. p. 625. (Sub nomine abutiloides)

Malva ~~pa~~ elegans Cassan. Desf. caule tomentoso foliis pennatifidis
tomentosis crispis, subtus albis fructu globoso capsulis trispermis Cassan
vel Desf. p. 49. t. 9. p. 16. fig. 1
Habitat in Cap. b. p. 11

Rami teretes sparsè ~~pubescenti~~ ^{incano tomentosi}. folia petiolata
tripartita unguiculata lobis ^{trifido} obtusis incisi ^{tota} subtus incana

supra ^{bracteatis} ^{sepi} ^{pubescenti} lanceolata. Racemo terminali magni. foliola
axillares saepe geminae. Calycis exteriora linearia lacinae interioris ovato sublaeva

ni
fructus globosus lacinatus capsulis 24 uniter compositus
Capsula compresso trisperma

abutiloides M. foliis lobatis villosis, caule erecto, calycibus brevissimis,
capsulis globosis striatis: loculis polyspermis Lin. Sp. pl.
pag. 9714

Abutilon althaeoides, flore carnea, fructu globoso Lill. Alth.
t. 1. p. 1.

Habitat in providentia, Bahama &

folia Althaeae alta, caulis villosus. folia longe petiolata
crasso tomento mucronata obtusa crenata-dentata 5-7.
angulata, angulis acutis. pedunculis axillaribus multifloris
flore pedicellatis Cav.

caulis tenui tomento denso tectus. folia longe petiolata, 2-3, peltatis
basi subcordata, quinqueangulata sublobata, utroque mollescentibus
mucronata: lobi ovati, acuti, unequaliter crenati. stipulae subulatae. petio-
li longitudine folii. Pedunculis axillaribus, foliis longioribus in flori-
bracteis linearibus. Flores magnitudine M. sylvestris. Calycis foliola
externa linearis: interna lacinis ovata. Germen hirsutum. Emis-
sus videtur capsula herb. Desfont. ex herb. Parf.

non vidi

angustifolia M-folius lanceolatis, floribus axillaribus binis,
pedunculis petalo brevioribus, calyce exteriori setaceo deciduo
Hort. Vind. 2. p. 447.

~~Malva~~ Malva angustifolia foliis ovato lanceolatis dentatis angustis, fructu glo-
boso tomentoso calyce exteriori ^{minimo setaceo} deciduo
Cav. dec. 2. p. 64. Tab. 20. fig. 3.

Habitat in Mexico

Caulis fruticosus, ~~per~~ tomento scellato tectus, erectus ramis
tripedali. Folia petiolata bipollicaria et ultra a
basi obtuse apice acuta inaequaliter serrata, utraque
pilis scellatis profertim subtus adpressis denella tomento-
sa. Stipulae setaceae Petioli unguiculati incani
pedunculi vix longitudine petioli uniflori gemini
Calyx incanis corolla dilute violacea petala
obcordata basi tubi filamentorum pilosius Capsula
plures mutica trisperma

Malva angustifolia foliis ovato lanceolatis fructu
globoso tomentoso capsulis trispermis
— Calyce ext. etc: capsulis trispermis

2
Speciata M. foliis cordatis crenatis tomentosis, fructu oblongo hirsuto
Linn. Am. Acad. S. p. 401. +

Althoa speciata betonicæ foliis vellosissimis Sloan herb. 1.

p. 210. t. 130. fig. 1.

Ido specus Habitata in Jamaica O

Secund. Rumph.

Althoa americana humilis flore luteo speciata Breyn
Cent. 124. s. 57.

~~Malya~~
Speciata M. foliis subcordatis crenatis subtrilobisque crenatis pinnatis
sculis, floribus axillaribus solitariis terminalibus
sempre speciatibus Cavendish p. 80 tab. 20. fig. 4

Caulis dumis teres ramis bipedali velloso immixtus
nisi folia subcordata vel ovata indivisa vel la-
riter triloba utrinque stellato subvelloso pinnatis
sculis simpliciter venosa obtusa vel acuta venato
inæqualiter serrata. Stipula parva subulata
pedunculi axillares biseis uniflori lineari uti petioli
floribus terminalibus conferti ^{in pinnis cylindricis} Calycis pilosi foliola exteriora
lineari lanicolata, corolla lutea petala obcordata
Capsula 14 decim ^{exterioribus} pilata compressa mutica subrotunda

ovata Malva tomentosa incana foliis ovatis crenato serratis pinnis terminalibus

Malva ovata caule tomentoso, foliis ovatis dentatis, floribus pinnatis,

fructu densissima oblonga Cavan. Desf. pag. 81. Tab. 20 fig. 2.

Althoea pinnata betonicifolia vellopsimo Sloan hist. jam. 1. p. 210. Tab.

138 fig. 1. Habitat quod ad pinnat

Habitat in Jamaica Bafilia

penum vel nihil differt a M. pinnata et forte exisplemendo.

in retai tomentoso tantum et folio mollioribus minoribus

videtur subrotundis ovatis vides quoque in specimine a

Thouinico communis tot in foliis supremis utraque

lobo obsuro. Capsula similis

calycina Malva

malva calycina foliis cordatis crenatis indivisi pelop-hespidis, flori-
bus solitariis longe pedunculatis, calycis exteriori maximo Cavan
D. J. p. 81. Tab 22 fig 4

Habitat in Cap. b. p. i. 5 x herb. Thouni

Primi tomentis. Folia interdum suborbiculata peli
triangulata breviter petiolata, squarrosa. Stipula
parva ovata. pedunculi axillares geniculati
petiolis sexies longiores. foliula calycis exteriorum
lanceola. Capsula 10 dorso fultata Cavan
in glutinosa β la manth

tomentosa M. foliis cordatis crenatis ~~crenatis~~ tomentosis, floribus lateralibus congestis, caule fruticoso fl. Zegl. 2554 Spei. pl. p. 9 677

^{P. S.}
Althoa orientalis bidens, subrotundis foliis, floribus parvis luteis Plukh. amalth. II. T. 356. fig. 1. ?

Habitat in India

caulis frutescens tomentosus folia absque lobis. Semina rostrata Lin.

polytachya Malva

Malva polytachya caule fruticoso, foliis ovatis acuminatis serratis scabris,
floribus spicatis, capsulis glabris mucosis. Caron. Desf. pag. 201. Tab
130. fig. 3.

Habitat in Penz
Caulis quadrupedalis griseus. Folia petiolo longiorum dequen
dentata. Stipula subulata. Spicis plures termina
tes in axillis superioribus. Foliola calycis externa
lanceolata. Cor lutea. Caps. mucosis Caronil.

non vid.

gangetica M. foliis cordatis obtusis scabris, floribus sessilibus
glomeratis, antheris densis muticis crenatis Lin. Spei. pl.
pag. 9674 Coran. dist. p. 82.

Malva indica, abutili subrotundo folio, flore luteo spicato
Plukh. 74. fig. 6.

+ Habitat in India
Folia singula papula linearis, flores adramona opus glomerati
lutei tuberoso-dorso reflexi margine fissi tuberculati
crenclatis l.

subtus pubescentia l. manihoti an hujus varietas?

na. v. d.

coromandeliana M. foliis ovato oblongis acutis, floribus glomeratis
et axillis densis truncatis. Hort. Cliff. 3467
Althoea coromandeliana, angustis prolongis foliis, semine
bicorni Plukin. mant. 10.

Habitat in America? C

Rami filiformes tenues debiles prostrati. Folia
ovata acute serrata utraque vix petiolis caulis
et vix axillares solitarii foliola extensorum
calycis lineari corolla lutea. Capsula reniformis
aculeis duobus in dorso oppositis et ubi ad apicem
ten

mibi ignota

americana M. foliis cordatis crenatis, floribus lateralibus solitariis,
terminalibus spicatis. Lin. S. V. p. 624 & Royen. Lugd. 359
Habitat in america O.

Malva americana caule nibeisente erecto ramoso, foliis
ovato-lanceolatis dentatis, floribus solitariis terminali-
bus spicatis capsulis tridentatis. Caran. S. V. p. 80.
Tab. 22 fig. 2.

Carpini folia
la Martii
herb. Thour.

Caulis ramosus rami teretes adpressi pilis adpressis. Folii
petiolata sesquipedaliana utraque glabra perennia
subtus pilis paucis in venis, lobisqualiter serrata obtusa
vel acuta. Sinipula lanceolata denticulata ciliata
pedunculi axillares, solitarii breves ~~forma~~ superiori confertis
rei hinc spicis spicatis. Calycis exterioris lobis subulatis
interior laciniis ovatis acutis ambo pilos ciliati. Corolla
fulva calycis parum longior. Capsula 10. tridentata apice
pilosu

ovatis inaequaliter serrulatis, floribus etiam
capsulis tridentatis

Scabra Mal. Scabra foliis cordatis ovatis basi obtuse inaequaliter crenatis
pedunculis solitariis bifloris
malva scabra caule rugata scabra rubescente, foliis cordatis crenatis
subrugosi, pedunculis solitariis 1-2 floris Cavan. des. p. 281. Tab. 138
fig. 1.

Habitata Peru

Tota planta scabra Caulis erectus et pedalis inferne sub
lobata. Stipula oblonga. Pedunculi axillares longitudo
e petalorum. Siliola calycis exteriora angusta
interior pentagonis. Corolla dilute lutea petala 2 fida
Capsula 12. Centro mutica et versus peripheriam bifida
Cavan.

Caulis teres, rubescens, pilis stellatis cinereis adpressis. Folia subcordato
ovata, obtusa serrata stellata pilosa, supra secundum nervos lineata,
stipulae subulatae. Petioli semipollicares, inaequali. Pedunculi un-
guis ulares, uti calycis inaequali herb. Mus.

non vidi

Cuneifolia Malva foliis obovatis crenatis.

Malva cuneifolia foliis lato-cuneiformibus supra crenatis; floribus
solidatis calycis exteriore diphylo (Cavan. de pp. 64. Tab. 20. fig. 1)

Habitat.

Caulis herbaceus, tenuis, amovis, velosus, uti tota planta.
Folia petiolata inferne integra apice crenato dentata.
Stipula lanceolata. pedunculis axillaribus petiolo len-
gionibus. Calyx extenor folioli ciliati. Corolla 5-loba
rotacea Cavan.

non vidi

Sisoparia malva foliis ovatis crenato-serratis, floribus axillaribus con-
gestis, caule fruticoso, ramis oppositis L'Herit Prop. nov. p. 53
Tab. 27.

Malva sisoparia. caule fruticoso, foliis ovatis acutis latius crenato
serratis, floribus axillaribus solitariis ad latus ramuli superiori-
bus glomeratis, calycibus in peltidam apertis Cavend. Desj. pag 65 -
Tab 21. fig 4

Habitat in ~~Planis~~
Planis

Caulis oppositis ramosis semis subsaber, superne
tenuinosus. Folia petioli fere aequali scabru

Folia ovato-acuta lata crenato serrata.

Stipulae setaceae. Flores axillares unius pedunculati
latus reliqui ^{his} sessiles. foliola calycis externi setu-
ta frutiferis acutis patentissimis. Corolla
flava emarginata Capsula 12. truncata

an eadem cum *Sisoparia* Jacq. haud ab simili
mea mihi ^{et} ~~et~~ ^{ut} serratura foliorum multo minor quam in

Rhombifolia

~~Scoparia~~

malva foliis rhombico ovatis ^{oblongisque} glabris floribus axillaribus: subsessilibus
libris ~~isomeratis~~ ^{terminalibus} ~~femuribus~~

malva scoparia Jacq. coll. 1. p. 59.

Habitat in St. Domingo.

Indet altitudine hominis, erectus caule et ramis principalibus teretibus virgatis

rami junioris cortice colore cinnamomi juniori superne villosuli. Folia delto-

ideo ovata, petiolata alterna acuta, serrata scabrufula. Hipula subulata

strob. sepius aggregati ^{terminales} superne in ramulis et axillaribus. Calyx villosulus.

foliola calycis: exteriori linearis lanceolata. lacina interiori ovato longitu-

dine exteriori petala flava calyce dimidio longior. Antherae apice hispidae.

stamina muti.

variat foliis oblongis

folia ope lentis puncta copiosa minutissima pilis raris primis
ad spem grossae aequaliter serrata. foliola calycis
foliola exteriora petala. Antherae apice hispidae

ut supra

seta alba

depresso saxe

geminae ex co

lorea puncto

Triangulensi Mal. folus pibordato triangulatis obtuse serrate
pedunculis axillaribus multifloris.

Habitat in Brasilia Thourin 5

Rami apice pilis raris stellatis. Folia petiolata
peltata inaequaliter obtuse serrata arena pubescentia
crassifolia vix pilis stellatis adpersa. Stipula
lineares obtuse. Pedunculi petiolo longiori apice flori-
feri glomerati: foliola calycis interiora ovata vix
interos incanis

an huius generis floris non vidi solummodo secundum habitum
classifici

subhastata Malva pilosa foliis
nec uncinatis

Malva ^{sub}hastata caule pilis adpressis, foliis subhastatis, floribus soli-
tariis breviter petiolatis Cavan. d. s. j. pag 72. Tab 21. fig. 3.

Habitat in Brasilia, Peni insula Bourbon 4

Tota planta pilosa prope totum folium et calyces. Caulis
erectus ramosus, bipedalis. Stipulae petiolo multo longio-
res oblongae attenuatae supra atro viridia dentatae
stipulae lineares pedunculo longiores. Flores axilla-
res. foliola calycis exteriora angusta corolla
lutea. capsula villosa breviter aristata Cavan
M. trichopoda her. la marth. herb. l. m.

bonanensis Malva

malva bonanensis caule tomentoso, foliis lobatis lobis inaequaliter crenatis
dentatis, floribus glomeratis axillaribus subsphaerico-paucis. Carum
Asf. p. Gyl. Tab. 22. fig. 1.

Habitat in Bonana

Caulis striatus. Folia petioli longiora innervia, inferne ovata
integra superne unlobata. Sepala lanceolata. Glosula
calycis extensa fovea Carum.

michi non satis nota ^{de} specimenis ⁱⁿ Herbario. non Cestru
sum

Andactyletes Malva caule fruticoso foliis cuneiformibus cuneatis 3-5que
restatis

Malva Andactyletes caule frutescente ramosisimo, foliis minimis
cuneiformibus supra lobis Cavan. des. p. 73 tab. 21 fig. 2.

Habitat in cap. b. p. 5

Rami & caeterae cortice purpurascente glabra ramuli sparsi
frequentes rose glauco adpressi. Folia ^{breviter} petiolata semurquiculata
utroque acuta inferne integerrime versus apicem utroque den-
tibus 1-2. crassa avenia utroque rose glauco demum evane-
scent. Stipula linearis parva petula pedunculata axillari
solitaria uniflora, folia calycis exteriori linearis longitudi-
ne interiori cuius laciniis acuta tiliatis. Petala emarginata
petal. foliis duplo majora tubus stamenum villosissimus
Capsula 10 glabra mutica

Dentes laterales in figura Cavan. nemo magna

retusa M. foli caule fruticoso foliis lanceolatis serratis obsolete tubo
usque flonibus axillaribus solitariis terminalibus subspicatis
malva retusa foliis sub lanceolatis velutis dentato crenatis
obsolete trilobatis, flonibus subspicatis, fructu glabro Paron
Duf. tab. p. 73. tab. 21. fig. 1.

Habitata cap. b. p. 15
Caulis ^{in ramis} rami pauci frequentes, sicut in fusis prope rami extra
pilos. folia frequentia videntur ramulorum in pagulis
fere axillis breviter petiolata, vix pollicina ^{margini}
firmatuni profundis basi parum angustata acuta medio
utrinque interdum lobo obliquo utrinque pilis stellatis
rari. Stipula lanceolata pedunculata axillari uniflora
superne uti folia confusa calycis stellato pilos foliis
lanceolatis interior lacini ovati acuti sub-
num inferne villosissimi. Petala calyce duplo longiora
sa capsula glabra 10 margine utraque crenulata

~~Tabulare G. foliis cordatis sublobatis crenatis dentatis glabris subciliatis,
caule fruticoso. Lin. Spec. pl. pag. 474
Geranium africanum, hederis arboreo folio, flore pur-
pureo Raj. suppl. p. 514.
Geranium africanum, floribus rubellis, foliis glabris
cordiformibus serratis circulo purpureo inscriptis
Raj. suppl. p. 514.
Geranium calycibus monophyllis, foliis peltatis rotun-
datis angulosis dentatis glabris, caule fruticoso
Burm. ger. 44. t. 1. fig. 44.
Habitat ad Cap. b. p. 24
Geotafoides C. Herd~~

t

Caperis M. foliis cordatis quinquelobis, caule arborescente
per. pt. pag 960 &

~~malva capensis frutescens, grossulana foliis majore hispida
Dill. Elth. 200. t. 169. fig. 206~~

~~Malva capensis frutescens; grossulana foliis majore hispida
Dill. Elth. 200. tab. 169. fig. 207.~~

~~Scabra V malva caule fruticoso, foliis lobatis floribus erectis
petalis incumbentibus Lin. Am. acad. 41. p. 325.
malva africana frutescens, flore rubra Pomet. hort.
p. 171. t. 10.~~

~~malva africana frutescens, flore parvo carnes unguiculis
atromentibus Plukh. amalth. 140. v. 431. fig. 9.~~

Habitat in Othiopia

malva capensis caule fruticoso foliis quinquelobis suspensibus
trilobis crenato dentatis glutinosi floribus bene carnis
pedunculis fructiferis erectis petalo longioribus
Caran. Desf. pag 71. tab. 24. fig. 3

Carmi piloso vespis foliis foliorum ovatis acutis
inequaliter dentatis glutinosi stipula ovata

^{heruata}
~~acuminata~~ pedunculi gemini vel solitarii florentibus
carnui fructiferi erecti. Calyx extenor 4 phyllis paleolis
laniceolatis uti interiore creati fructiferis compressis
petala rubentia unguibus saturate rubris obtusata.
Siliqua hamulosa villosa Capsula 12. 13 nigra.

^{lobi cordati}
folia peltata villosa foliorum 5 lobis lobis ovatis ^{acutis} dentatis
pedunculi subgemini

grosulanofolia Malva

Malva grosulanofolia caule hispido frutescente, foliis subpinnatis-
lobatis serratis rugosis, floribus solitariis fructu hispido. Cavan. Desf.
p. 71. tab 24. fig. 2.

Malva capensis *chitensis* *grosulanofolia* majore hispido Willd. herb.
Eltz. 4. 169. fig. 207.

Habitat in Cap. b. freit

Caulis teres hispido sericeo. Folia subrugosa dentata hispida uti
tota planta. pedunculi axillares gemiculati petiolo
longioribus reliqua utriusque virgata Cavan

eadem videtur ac balsamea Jacq.

Balsamita M. foliis crenatis sublobatis inequaliter serratis glutinosi;
caule fruticoso Haecqu. in l. V. p. 625. Misp. 2. p. 321

~~Icon. rar. t. 10~~

Habitat.

eodem fonte ac *grosfulentolia* Caran.

Lagran M. Caule erecto frutescente, foliis subrotundo cordatis
semiquinquelobis laevis. in L.V. p. 626. Hort. vol. 3. V. 33

Habitat in Cap. b. mei 5

Malva lagran ~~caule~~ frutescente ~~et~~ rufescente atropurpureascente, foliis cordatis
5-7 lobatis crenatis floribus solitariis, pedunculis capul-
latis foliis brevioribus Cavan. Diss. p. 72 Tab. 23 fig. 3.
Malva africana frutescens flore rubro Commel. Hort. Amst.
2. pag. 171. Tab. 86.

Caules uti petioli et pedunculi pilosi rufosus; 6 pedales
folia remota cum rudimentis ^{ramulorum} foliorum in axillis
si ab infirma utroque pilis raris adpressis pro tenellis
frequentibus propositum subtus. Lobi ovati obtusi cune-
submucronata. Sepala ovata, ciliata patentia pedunculi
capillares. foliola exteriora calycis lanceolata
tubis ^{staminum} glabris
Petalis subrotunda

lobis obtuse crenulatis
~~marginatis~~ foliis uti Cavan

fructuosa M-folis tripartitis serratis incisae caule pedunculis calycibus
eque hispida

Habitat in C. b. p. t.

Caulis uti calycis petali pedunculi pilis sordide fla
vescentibus pellucidis hispida. folia parva vix
vix pilosa pedunculi axillares flori nutantes tubus
framinum pilosus

virgata M. foliis basi angustatis multifloribus parvis: Caerulis
incisus venatis, pedunculis unifloris, caule frutescente
Murr. in Com. 908. 1779. p. 20. V. C.

Habitat. Malva frutescens capensis grossulano folio minor
glabo Sill. Elth. t. 169. fig. 206.

Malva virgata caule frutescente virgata: foliis incisus venatis,
glabri rugosis, corollis planis substellatis Caran.
Vesf. May 70. Tab. 10. fig. 2. et 24. fig. 1.

Habitat in Cap. b. Speitz

Caule bipedali, pubescenti, stellatis ramis adpressis per totam
longitudinem fere floribus. foliis petiolata lobis
cava vel minoribus obsolete multilobis subtrilobis
lobis ^{non} cava obtuse pinnatis serratis basi acuta
subtus pubescenti stellatis stipulis parvis ovatis
pedunculis axillaribus interdum binis petalo ~~per~~ longioribus
Duae folii superiores crispae stellatae pilosae pri-
mum cernui fructiferi erant. foliola ex tenore calycis
lineari. Petala unguibus albis, rubra strobis saturatioribus
tubis staminum villosi. Capsula 16.

— acuti

penurana M. caule erecto herbaceo, foliis palmatis specie
secundis axillaribus, seminibus denticulatis Spreng
p. 960. Aiqu. hort. 7. 156. Cavan. des. pag. 60. t. 19. fig. 1

Habitat in Peru O

Caule 1 pedali pilis raris sapor geminis. folia
septemloba plicata glabra venosa. acuta serrata
petiolo longitudine folii stipula ovato lanceolata

Pedunculus axillaris nudus longus. Spica ante flo
rescentiam recurvata. Cor. parva purpurea sem
Capsula 10 supra exasperata denticulis alternis plu
rimis lina

Tomentum racemis simplicibus vel compositis. Calycis lobula
exteriora linearis. Capsula mucronibus exasperata, in lumen
h. modo rugosa & venis remotis, elevatis lobis fus

— glabris

non vidi

Lemenfis M. caule erecto herbaceo, foliis lobatis, spicis secundis axilla-
ribus, seminibus denticulatis Corburi Am. ad 4. p. 325
2. 8. 141.

Habitat in Peru, Lima. O

Pauli tenuis, ramosis primis 3-4 pedalis scabris pilulis
villosis folia ~~petiolata~~ petiolis aequantibus basi sub
cordata 5 lobis lobis oblongis obtusiusculis vel
utrinque villosi inaequaliter serratis. Stipulae
cuneolatis ciliatis. Pediculi petiolo longioribus

varietatem vel
prolem hybridam

Calycis luscis. exterior foliolis petae angustis primis
linearibus. Corolla coerulea capsula nigra glabra

Mal. penuriana
credit hinc.

Malva Lemenfis caule erecto scabro ramosis primis, foliis
septemlobatis nigri spicis axillaribus, floribus coe-
ruleis caps. lobatis Cavan. Desf. pag. 69. Tab 19.
fig. 2

scabro, foliis lobatis villo-
sis, seminibus lobatis raris axillaribus secundis
in meo panem nigra an cytus potius penuriana sed
obtinui a Dr Meijer sub nomine Lemenfis

capitata Mal.

malva capitata caule arborescente foliis oppositis sinuatis medio
longioribus, floribus corymbofo-capitatis Cavan. Des. p. 200 tab
137 fig. 1.

Habitat in Perù

Caulis erectus ramifus tomento obductis ^{rami} perispermis teneris. Folio
petiolis longioribus subcordata crenata interdum cordato
ovata vix lobata. Stipula lanceolata. floes numerosi
lesiles in capitulo. calicula extensa calycis subulat
tubus staminum pubescens. Capsula tomento ^{se} breviterata
Cavan

non vidi.

openulata Malva
D₅

ruicinis fœm

Malva openulata foliis cordatis quinque lobatis tomentosis, floribus ruicinis
nigro punctatis fructu operculato Cavan. D₅. pag. 65. Tab. 35. fig. 1

Habitat in Peru &

Caulis ramosissimus, uti tota planta tomentosa. internodiis pubescentibus. Folia petiolis quadruplo longiora cordata crenata
stipula capillares. Pediculi axillares plerumque solitarii
foliis longiores, floris fecundi. Calycis foliola extensa septem
lobis staminum basi villosi. Capsula octo-10 Cavan
fructus corpe sicula operculatis

non vidi

acaulis malva aculis foliis sublobatis inaequaliter dentatis dentibus
seta terminatis pedunculi 2-4 floris

Malva acaulis foliis omnibus radicalibus lobatis denticulatis, pedun-
culis radicalibus 2-4 floris Cavan. des. pag. 82. tab. 35. fig. 2.

Habitat in Cordillera Pem 4

folia ~~h~~ albedo pilosa inaequaliter denticulata denti-
bus seta terminatis. Pedunculi numerosi foliis
breviores foliola calycis extensa. Caps. 20 Corolla
flavescent Cavan.

non vidi