

Mammea

americana M.

Mammea humilis, foliis acutis, pedunculis petiolo longioribus, baccis trioper  
mis.

Habitat in Monte errat Ryan t.

Arbuscula circiter sex pedalis, sulco luteo aquoso scatens.

Rami inferne teretes, superne alternatim compressi, rigidi, glabri,  
articulati, sub articulis parum dilatati, in arbore masculinis  
Dicitur <sup>sciatriculam</sup> utrinque tuberculato, piceo parum minore, inaequali, mucronato,  
florifero.

Folia petiolata, opposita, quadripollicia vel quinque polliciana,  
elliptica, plerumque acuta, rarius obtusa cum emarginatu  
ra parva, integerrima, subcoriacea, utrinque venosa, gla  
berrima, subtus pallidiora, costa flavescente.

Petiolus subtus carinatus, supra canaliculatus, pollicaris.

Stipella nulla.

Pedunculi infrafoliacei, in masculo arbore a tuberculis; in foemi  
neo parum supra cicatriculam petioli, duo ad quatuor,  
sesqui pollicares, teretes, uniflori, patentes, subreflexi

Flores polygamæ.

Hermaproditus in distincto individuo a masculo

Calyx inferus, diphyllus, persistens: foliola subrotunda, concava, breviora,  
petali quintuplo breviora

[Corolla. Petala quatuor, subrotunda, patentissima, subtus valde convexa  
supra concava, peract duo parum majora, peracta florifica  
tia reflecta

Stamina. Filamenta copiosa, ad basin receptaculi germinis inserta, peto-  
li breviora. Anthera parva, subrotunda.

Pistillum. Germen superum, receptaculo hemisphorico, flavescente e  
post casum filamentis <sup>ordium</sup> deciduis tuberculato insidens, ovato subrotundum.

Stylus brevissimus. Stigma convexiusculum, saepe inequaliter  
Anlobum.

Pericarpium. Bacca oblonga, apice acuminata, obtusa, bipollucaris,  
trisperma. Semina oblonga, venos reticulata, latere inte-  
riori plana.

mas

Calyx, Corolla et Stamina ut in mas

Rtr. L.  
p. 46.

Pistillum nullum . Receptaculum hemisphaericum

Quoties figura Rhœdia in iconibus Plumierianis intueor, & thei mihi vero simile videtur eam a Mammea hic descriptam vix & perire, ne quidem genere differre. Conveniunt etenim exacte figura foliorum, situ, florum, figura petalorum, fructu et toto habitu, differunt modo secundum characterem Linnœi, quod Rhœdia calycis destituitur. Linæus autem, qui, ut ipse in specibus plantarum fateretur, plantam non vidit. Characteremque generis a Plumierio mutuavit, cum vero hic nil de calycis commemerat, et ex figuris partium fructificationis haud optimis potius ecalyculata quam calyculata videtur, Linnœi forte eam ecalyculata pronunciarit. Secundum Martso Linnœi secunda, pagina 401. observatio in speciebus plantarum Rhœdia addita excludi debet, aliamque dedit descriptionem in Systemate plantarum edit. Holm. 1776. ubi et descriptionem uberiorum staminum et pistilli in Martso pag. 141.

forte ad specimen etsiccatum confectas, calycem vero in utroque loco intactum reliquit. Nonne conjicere licet, quod calycem vel protervidit in specimine sicco propter parvitatem, vel quod omnino defuit in casu in specimine a viro illustri viso. Tantum a veritate non abhorere videtur hoc mea conjectura, cum non modo illi jam dixi: mea <sup>planta</sup> penitus ad figuram Rheedia Plumieri quadrat, sed in omnibus, calycem si excipias, cum descriptione Linnæi.

Mammea

Mammea americana, foliis obtusissimis striatis, pedunculis brevibus, bacis  
tetraspermis

Mammea americana Lin. Syst. Veget. pag. 492.

*Mammea parviflora*, foliis acutis, pedunculatis petiolo longioribus, baccis  
Anispermis

Americana Mammia Lin. I. V. pag. 492. + Jacq. hist

mammay Dalech. hist. 1036 Caet am. 363. Bauh. hist. 1. p. 172

Arbor india mammey dicit Bauh. pin. 417.

Mammey magno fructu, persico sapore Plum. gen. 44. ii.

170  
malus persica maxima, foliis rotundis splendens glabris  
fructu maximo sicuti nyctag. Sloan. hist. 2. p. 123. t. 217.

fig. 3.

Habitat in Hispaniola, Jamaica  
Rami venter glabri. Folia petiolata latera opposita  
ovalea basi acutiora, obtusissima glabra venosa, stibus  
conspicuis obliqui, puncta <sup>minuta</sup> elevata utraque inde  
germina nitida palmata vel spithamea utraque  
ramis crassiora resp. paululum reflexa. Flores laterales