

Manettia

Manethia umbellata. foliis ovatis subcordatisque, stipulis connatis acuminatis
pedunculis umbellatis multifloris fl. Penn. 1. pag. 50. tab. 90. fig. a

Habitat in Pennis nemoribus.

nitidus

glabra, nitida. Caulis ramosus, scandens, teres. Tota petiolata, deflecta in aeger
rima, supra nitida, caetero interdum acuminata. Apule ad pressa, petiolis con
natis. Pedunculi axillares. Pedicelli umbellati, plures. Bractea 2-4 adba
sin pedicellorum, lanceolata. Calyx 4-partitus: laciniis lanceolatis. Corolla
concolor. Limbus et fovea barbatus. Capsula glauca obovata, didyma bis
cavalis, aqua bivalves. Semina compressa, membrana cincta, minima,
Receptacula oblongum, dissepimento contrarium utroque adnata, imbricata
fl. Penn

(notus hypocrater. spec. figurum)

Charact. mutationes sequentes additur. Calyx 4-5 partitus. Corol. infundibuli formis
~~taberbari clavati~~. Dactylus barbatus clausus. Limbus 4-5 partitus, laciniis lanceolatis
reflexis. Stamina 4-5. Anthera crassa bifida inclusa. Capsula didyma, 2-10
nervi, bilocularis, bivalvis valvulis duplicatis bifidis. Semina numerosa
reliqua ut supra

Manetta acutifolia foliis lanceolatis acutis, stipulis connatis acuminatis
pedunculis uni-² floris. fl. Peruv. 1. pag. 50. Tab. 89. fig. 6.

Habitat in nemoribus Panatahu anim.

glabra. Caulis volubilis, ramosissimus, teres. Ramis filiformes. Folia petiolata
lanceolata, integerrima. Stipulae interfoliaceae, petioli connatae, acumina-
tae. Pedunculi axillares, solitarii, 1-3 flori involucri bractea vaginante
bifida acuta. Calyx 4 dentatus. Corolla purpurea, 4 fida, fere subhypocrateriformis
extus faucibus villosa. Stigma bilobum. Capsula biloculari, bivulvi: val-
vulis duplicatis, bifidis. Semina orbiculata, membranacea cinerea, compressa
fl. Peruv.

in 2
3
familia, ^{axillares} pedunculi ^{axillares} ^{terminalibus oppositi} ^{triflori}, foliis ^{subjecto brevioribus}

Manettia racemosa foliis ovatis oblongisque acuminatis, stipulis semicircularibus,
pedunculis bi-multifloris fl. peruv. 1. pag 50 tab. 29. fig. a

Habitat in montibus Cuzco et Chinchao

Pubescens. Caulis herbaceus, scandens, bi-quadrinervis, teres, ramosus. Nervi
tetragonis longissimi. Edica petiolata, attenuata, oblonga vel ovata, integerrima,
venosa, secunda. Petioli folio duplo breviores. Stipulae interfoliaceae, petiolis
connatae, semiorbiculatae, acuminatae ad apicem, ciliatae, persistentes. Pedunculi
axillares, 2-12 flori; ^{pedicelli} racemosi. ^{folio longioris pedicelli} flori ^{1 flori} subulatae. Calyx 4
partibus saepe 8-10 partibus. Corolla purpurascens, hirsuta. Capsula ova
lis pubescens fl. peruv

Coccoloba Manihoti caule volubili foliis ovato lanceolatis glabris acuminatis,
petiolatis, corymbis axillaribus

Nacibe *Coccoloba* calycis floris 3 dentato; foliis ovatis acumi
natis Aubl. fl. gu. pag. 96. tab. 37. fig. 1.

Habitat in Guiana. 24

Caules plures tetragoni ramosi. Folia opposita petiolata
stipulae oblongae inter petiolas. Aubl.

non vidi

non vidi

axillare Lygost. glabrum, foliis ovatis venosis, caule flexuoso subrobulo, racemosis
axillatis La Mart. F. L. p. 286 tab. 67 fig. 2. sub *ternata*

Lygostemum Brown & Jacq. Tab. 3 fig. 2.

Petechia Lygostemum foliis ovatis nudis lineatis caule ~~fruticosa~~ flexuoso
Humb. & Jacq. pl. p. 160. * Syst. V. p. 153

Habitat.
Rami teretes vel obscure tetragonii glabri superne pubescentes. Folium
petiolata, opposita ovata, attenuata, integerrima pollicari
supra ^{glabra} lineata ~~pubescenti~~ venosa nervosa nervis subreticosis. pedun-
culi axillares subinflor. foliis breviores. Cavendish calycis pube-
lata

Lygostemum Manetti foliis ovatis aculis caule volubili suffrutescente

Manetti Lygostemum Sw

~~Manetti~~

Canicollata Manettia Manettia foliis lanceolatis, floribus pentandris.

Ophionkera lanceolata Torrh. Desf. pag. 42.

Certe furtiva est.

Pedunculi terminales ^{termini} saepe ~~longi~~, laterales intermedio triplo longiores
apice trifido. Foliolum lanceolatum ad diversam pedunculo
^{innum} flores primum congesti, dein racemosi, secundi: folioli petalis ad
basin calycis.

Cum Capsula calyce coronata ideoque non Ophionkera. Cum
Manettia convenit Corolla, ^{nectare,} stigmatibus et Pericarpio, differt solummodo
numero staminum et laciniarum calycis. +
~~Nasibus Aullat. Tem. pag. 37. Deum hujus~~
generis ~~speciei est~~ Genus ordine naturali Cinchonae affine.

Canicolata Musfonda inermis villosa, foliis lanceolatis, floribus ^{demum} racemosis.
Ophiorrhiza canicolata; foliis lanceolatis ^{Bot. de J. pag. 42.}
Certe fruticosa est.

Folia utrinque

Pedunculis ex apice ramorum, interdum solitarii, saepe ternis, laterales intermedii triplo longiores, superiores bifidi; foliolum angustolanceolatum ad basin ^{diversam} pedunculi.
Flores primum conferti ^{subcapitati} dein racemosi; fructus

reclinata Manethia foliis ovatis acutis pubescentibus, caule reclinato Her
bae ed. Sw. prod r. pag. 37

manethia reclinata Lin. Mant. 558 & S. V. p. 164

Habitat in Mexico

Caulis debilis, ramosus. Folia opposita, petiolata, approximata
subsistat lequipollentia. Pediculi brevissimi his sub. Sti
pula opposita, petiolis adnata, adpressa, semicirculari, bre
vissimo. Pedunculi axillares, solitarii, foliis brevioris, multi
flori. Pedicelli oppositi, his sub. Bractea ad pediculum pedicel
lum, minima, acuta. Flores albi. Linn.