

Mangifera

6

5. Mangifera. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala. Stam. 5: 4-sterilia. Dr.
pa bulcata, 1-sperma, Putamine fibri lignosis in
nito

axillaris

Mangifera foliis ovato oblongis obtusiusculis, paniculis
axillaribus, floribus decandris La Martre Enzycl. 3. p 667
Habitat in India orientali T

non vid.

indica 1 Mangifera foliis lanceolatis petiolatis, ^{paniculis erectis,} petalis apice patulis, drupa
subreniformis glabra.

Mangas Clav. exot. 228 & 203

Persia similis putamine villosa Bauh pin 440

Mao & Mau & manghas Rheed Mal. 4. p. 1. t. 1. 2.

Manga domestica Rumph. amb. 1. p. 93. t. 25.

Mangifera indica Lin. Spec. pl. 290.

Mangifera amba Torsk. descr. 205.

Habitat in India Orientali 3

Rami teretes, glabri. Folia versus apices ramorum, approximata,
sepe epithamoa, exteriorum attenuata, suboriata, versus ^{infera} glabra

Petiolis breves, triquetris, versus folium scripta plani, basin ver-
sus canaliculati, dorso gibbosi, per ramum parum decurrentes.

Panicula terminalis, pedalis. Pedunculi et pedicelli alterni.

Strobili remoti, ultimi brevis sibi confertiores. Bractea ovata

ad basin florum. Stamina quinque, unicum corolla longius
fertile, reliqua sterilia

Stamen quantum tantum fertile observant quoque Torskhal, La-
mark et Richard.

Piper obliquum foliis oblique cordatis obtusis, specie longis fere dependentibus fl. Peru

1. pa. 7. 37. Tab. 63. fig. a.

Habitat in sylvis Peruvia &

glabrum, leve. Caulis fruticosus, erectus, teres, nodosus. Rami fructibus solum
petiolatus, ^{alternatim} antegressiva, magna, subtus 11-15 nervis, venosissima, reticulata,
repanda. Spica solitaria, fere bipedales, dependentes. Flores ex annulis di-

gesti fl. Peru

foliis basi inaequalia, profunde cordata.

foetida 2 manjifera foliis lanceolatis petiolatis, ^{paniculis erectis, petalis reflexis} drupis cordatis pubescentibus +
manja foetida Rumph. amb. t. p. 90. t. 28

Manjifera foetida; racemis elongatis, petalis integre reflexis, drupa
cordata pubescente Lour. fl. Cochinch. 160

Habitat in India Orientali 5

Arbor magna. folia triplumajora quam in M. india, obscure viridia.

Flor. et rubi Lour. l. c.

Stamen quintum reliquis longius Rumph. l. c.

Piper acutifolium foliis cordatis acuminatis, spicis erectis cylindricis brevibus fl.

Peruv. 1. pag. 30 tab. 64. fig. a.

Habitat in sylvis Peruv. 5

Caulis fruticulosus, tergyalis, erectus, teres, nodosus, striatus. Rami tenes pubescentes
subdorsif. Folia breviter petiolata, ovata, integerrima, venosissima, utrinque
rugosa, subtus pubescentia, supra aspera, alternata 13-17 nervia, apice ob
liqua, basi inequalia, obliqua. Spicis foliis 4plo brevioribus. Flosculi in annulo
digesti, squamis cuneiformibus peltatis, concavis vallis coronatis interstiti.

Stigmata 3. fl. Peruv.

folia cordato ovata attenuata

Laxiflora. B. Mangifera foliis lato-lanceolatis sessilibus, paniculis laxis pendulis, Drupa subrotunda.

Mangifera laxiflora; foliis ovato-lanceolatis subsessilibus; floribus pentandris; drupa ovata, subrotunda La Mart. Dict. bot. 3. p. 697.

Habitat in insula Mauritii. Ex Herbario La Martii.

Nam teretes, nodoso-cicatricati. folia semipedalia, basin versus angustata.

Habitus. Arbores procer. folia, versus apicem ramorum, approximata, alterna, integerrima, glabra, venosis prima.

Panicula terminalis.

Mangifera axillaris et pinnata La Martii minime huc pertinent, nec eundem generis et generis quoque inter se differunt. M. axillaris habitu foliorum cum mangiferis quidem convenit, at stamina ^{duo} secum ^{duo} fertilibus guardat, stylis quinque et fructu omnino diversa. M. pinnata decandra est, sed habitu toto coelo diversa.

Laxiflora B. Mangifera

Castoreia pro Salmo nea Lour. fl. Cochin. pag. 14. +

Habitat ~~in~~ ⁱⁿ Caetona ~~Cinamomum~~ ^{Cinamomum} Sinarum

Caetoni ^{Sparsa,} herbaceus, ^{est} pollicis, erectus, sulcatus. Folia cordata, trine-
ria, acuminata, integerrima, glabra. Petioli breves.
Spica ^{infera,} perianthales, simplicis, brevis. Flores violacei. Calyx
compressus; lobis subulatis. Corolla formata e lamella
oblonga in tubum cylindricum, fissum, longitudinalem
connis, externi limbi latius rotundatis, media longior,
cucullata. Germen subrotundum, compressum. Stylus
inflexus, ⁱⁿ ^{medio} ^{ventriculo} ^{infero}. Stigma crassiusculum
siliicula compressa, biloba, scabra.