

Manulea

1. ^{officinalis} *Cheranthus* M. foliis obovatis serratis subsquamosis, caulibus subaphyllis, pedunculis alternis unifloris, lacinis corollae attenuatis
2. *Tomentosa* M. foliis obovatis crenatis tomentosissimis, caulibus foliosis, spicis racemosis
3. *Thyrsiflora* M. foliis obovatis tomentosissimis dentatis, corymbo terminali elongato
Compositis.
4. *Capellana* M. foliis caulinis obovatis glabris dentatis, ramis lineantibus, spicis ovatis
5. *argentea* M. foliis obovatis serratis argenteo punctatis, floribus axillaribus
6. *canesfolia* M. foliis elliptice ovatis glabris dentatis, spicis oblongis
7. *capitata* M. foliis ovatis serratis villosis, floribus capitatis globosis, ramis diffusis
8. *antirrhina* M. foliis ovatis dentatis glabris, floribus alternis
9. *plantaginifolia* M. foliis ovatis subdentatis integrisque glabris, capitulis ovatis, ramis
diffusis
10. *corymbosa* M. foliis oblongis dentatis glabris, corymbo glomerato
11. *integrefolia* M. foliis ovatis sparsis glabris integris nervosis

12. pennatifida M. foliis ovatis inciso-pinnatifidis, pinnis dentatis
13. hirta M. foliis lanceolatis dentatis cauleque hirtis, spicis corymbosis
14. rubra M. foliis linearilanceolatis dentatis, spicis villosis, spicis racemosis
15. altissima M. foliis linearilanceolatis integerrimis dentatis, spicis terminalibus
caule subaphyllo

16. heterophylla M. foliis linearibus sparsis villosis integris dentatis
17. coerulea M. foliis linearibus oppositis tomentosis dentatis, floribus racemosis
18. microphylla M. foliis linearibus oppositis integerrimis, pedunculis lateralibus
unifloris
19. tridentata M. foliis cuneatis tridentatis sessilibus glabris, pedunculis lateralibus
unifloris glabris

3-4 cuneifolia M. foliis obovatis serratis cauleque hirtis serratis spicis terminalibus
corymbosis
13-14 viscosa M. foliis lanceolatis serratis glabris, spicis terminalibus

Cheiranthus M. foliis nudis, caulebus subaphyllis, pedicellis alternis uniflo-
ris. P. V. pag. 56

Cheiranthus africana, flore luteo Com. hort. 2. p. 83. t. 42.

Lobelia cheiranthus caulebus erectis, foliis oblongis dentatis Lin. Spec. pl. p.
manulea foliis nudis sculis racemo longo simplicis Lin. Mant. 80. 1319x

Habitat ad Cap. b. p. c.

Herba stativa Euphorbia, caulis palmari basi ad medium ramosus
superne uti bractea in plures caulicos erectos, teretes, interdum simplicis formae.
inferne uti bractea adpressus

folia plurima radicata petiolata alterna, obovato-oblan-
ga, obtuse serrata pollicina superiore uniuersa vel alterna mino-
re. racemus terminalis, erectus plaxta longior, bractea linearis
longitudo sine sepe calycis. pedicellus brevissimus lacinus umbi
pubulata

foliis obovatis serratis subquamatis, caulebus subaphyllis
pedunculis alternis unifloris, lacinis corollae subulatis attenuatis

Lobelia cheir.

Tomentosa M. foliis tomentosis, caulibus foliosis, pedunculis multifloris h. n. v.
pag. 569 + Mont 420 Am. acad. 6. p. n. 224.

Planta Plut. n.

7. 319. pag. 2.

Habitat ad Cap. b. spec.

Selago tomentosa racemis ramosis, foliis obovatis crenatis
tomentosis, caule prostrato h. n. Am. acad. 6. p. 90. n. 22. + spec.
pl. pag. 877.

Habitat ad Cap. b. spec. ①

Tota planta villosa tomentosa incana, palmari ramifera. Solia
obovata obtusissima opposita crenata. Racemus terminalis
et ramulis alternis. Calycis foliola linearia tubus corollae
superne profunde villosi limbus supra glaber laciniis linearibus
oblongis obtusis

aliam e cap. b. spec. habes an modo varietas? caule duplo altiore
inferne leviter villosus superne glaber uti specis. Solia majora
profundius crenata glabriora racemus specis dichotomis

Selago

obovatis crenatis tomentosis, caulibus foliosis specis
racemosis

Thysaniflora M. foliis obovatis tomentosis dentatis, corymbo terminali elongato. *Flora*
posita in Suppl. pag 205: F. V. pag 56y.
Habitat ad Cap. b. p. i.

non vidi

capillaris M. foliis caulinis obovatis glabris dentatis, ramis linearibus spicis ova-
tis lin. Suppl. pag. 205. S. V. pag. 569
Habitat ad Cap. b. frei

non vidi

argentea M. foliis obovatis cuneiformibus, serratis argenteo punctatis, floribus
axillaribus Lin suppl. pag. 286. P. V. pag. 570
Habitat ad Cap. 6 ppei

non vidi

Cuneifolia M. foliis ellipticis ovatis glabris dentatis, spicis oblongis len.

Suppl. pag. 205. S.V. pag. 569

Habitat ad Cap. b. p. r.

Paulis villosis Vers. folia petiolata opposita, unguiculata
spica terminalis brevi flori alterni

capitata M. foliis ovatis serratis villosi, capitatis globosi, ramis diffusis hinc
Suppl. pag. 205. T. V. pag. 569
Habitat ad Cap. b. frei

non vidi

Indica manulea foliis ovatis integerrimis oppositi, flore capitato Lour. fl. Coch. pag

386

Habitat in arenis maritimi Cochinchina

Caulis herbaceus, sesqui pedalis, erectus durus, villosus, simplex, ramis adscendentibus.

Folia oblongo-ovata, ciliata, incana, sessilia. flores coerulei. bracteae setosae.

Calyx 5 partitus acutus, villis hepaticis, subaequali. Cor. limbus 5 partitus.

Carinae 4ae superiores magis connexae. Capsula 2 loculari, 2 valvi polyperma.

Lo. rind.

anthemina M. foliis ovatis dentatis glabris, floribus alternis ten suppl. pag 285

S. V. pag. 569

Habitat ad C. byssi

refert antheminum
non vidi

plantaginis M. foliis ovatis subdentatis integrisque glabris, capituli ovatis, ramis
diffusi Lin Suppl. pag. 288. L.V. pag. 569.
Habitat ad Cap. b. frei

refert Plantaginem. Theunne

non vidi

Corymbosa M. foliis oblongis dentatis glabris, corymbo saepequato Len. Suppl
pag. 286. S. v. pag. 569.
Habitat ad Cap. b. p. r.

non vidi

Integrifolia M. foliis ovatis sparsi glabris integris Len. Suppl. pag 285. L. V.
pag. 569.

Habitat ad Cap. b. p. i t

Caulis ramosus. Rami verticillati & lineis duabus utroque a singulis
petioli decurrentibus subangulatis, glabri. ^{varius} folia ^{boji} tres petiolata
rigida sex angulata obscure trinervia glabra acuta subpungentia
racemi superne alterni approximati. ^{per pappellinas} pedunculi angu-
latis flore subpungenti bractea oblonga ad basin singuli pedicelli
fol. et duo alia minori inferne. ^{foliola} calycina ovata

pennatifida M. foliis ovatis inciso-pennatifidis: pinnis dentatis Lin. Suppl.
pag. 286. S. V. pag. 570
Habitat ad C. b. p. c.

non vidi

herba M. foliis lanceolatis dentatis cauleque hirsuto, spicis corymbosis

Habitat in P. b. fruct. Lahl.

Rami teretes uti folia villis hirsuti sic ad apicem glaberrimos.

Folia pollicaria inferiora opposita basi attenuata, obtusa

dentibus utroque 3-4. Spicis ad apicem alternis subsessilibus

rubra M. foliis lanceolatis villosis serratis, floribus racemosis remotis Lin.

Suppl. pag 286. P.V. pag 570

Habitat ad Cap. b. p. ai

~~Xriten~~ ^{legue} pedalis infer ^{ne} ramosis, erectus; purpurascens inferne
fusio pu. villosus. Rami proxi interdum approximati simpli
cispmi. Folia bipollicaria vel unguiculata, basi attenua
ta, villosa, subretrolata, obtusiuscula, dentibus utroque
2-5 ^{interdum unguiculatis} remotis. Pice unguiculata, bifida, alterno, ^{obtus} distantes
in racemo, elongato

bif. do

specis racemosis

altissima M. foliis lanceolatis subdentatis villosis, specia ovata den. Suppl. pag

286 S.V. pag 560.

Habitat ad Cap. b. frei

Caules plures herbacei sesqui pedales erecti simplicissimi villosi. Folia ^{intere} linearia integerrima vel subdentata tripollicaria omnia inferne in caule sex nulla nisi i. c. umbre vel. Specia terminalis sesqui pollicaris. Bractea lineari uti calycis villosi

lineari lanceolatis integerrimis dentatis que, specia ovata
caule subaphyllo

Heterophylla M. foliis lineari-bus prostratis villosis integris dentatis ve. Lin. Suppl.
pag. 205. P. V. pag. 569.
Habitat ad Cap. b. p. c.

non vidi

Coenulea M foliis linearibus oppositis tomentosis dentatis, floribus racemosis
Len. Suppl. pag. 205. P. V. pag 569

Habitat ad Cap. b. p. 5

~~Stem~~ pedalis inferne ramifera erectus, ^{inferior} perperam inferne
superiora ~~pernitata~~ superne leviter villosus. Rami filiformes sim-
pliciter, inferne ~~sparsi~~ ^{velis pinnatis} interdum approximati. Folia ungui-
culata inferne attenuata, obtusa dentibus 2-3. ~~obscure~~ remoti-
que ~~trina~~ ^{trina} spica breves unguiculatae, bifidae alternae in racemo longa
40, globosae, distantes

Spica racemosa

non vidi

sub nomine M. rubra missa a Thunb.

microphylla M. foliis ovatis fasciculatis glabris integris Lin. suppl. pag. 205

L.V. pag. 569

Habitat ad Cap. b. p. 5

fruticulus pedalis glaber ^{alternis} ramosis ^{linearibus} vixatis. folia frequentes
- ^{integerrimi} plura, saepe 12. e prozulo tuberculo alter parva filiformia. pedunculi laterales filiformes pollicares uniflori remoti. Calycis foliola subulata.

lineantibus
lateralibus unifloris

integerrimis pedunculatis

Indentata M. foliis fasciculatis cuneatis indentatis, pedunculis lateralibus
unifloris

Habitatio C. b. per I. de Bulow

Frutex pedalis, ramis, vixatis superne glutinosus. Folia
parva angusta, plura ex eadem gemma apice utrinque dentata
glabra. pedunculi et axillis alterni unguiculares glutinosi
distantes ad apicem compositos. Corolla unguicularis pui
tescens
facies microphylla

Euneifolia M. foliis obovatis ^{ternatis} cauleque hirsuti, spicis terminalibus corymbo
si.

Habitat in Cap. b. spei
an manulea *Thysiflora*?

Rami tetragoni hirti. folia basi attenuata frequentia parva profun
de serrata unguiculata. Spicis ad apicem. bracteis lanceola
to longitudine florum

an potius *Selaginis* species

viscosa M. foliis lanceolatis serratis glabris, spicis terminalibus
& habitat in Cap. b. p. r.

Caulis erectus herbaceus palmari ramosus, rami simplicis & pini
2-4. remoti altitudine fere caulis, pubescenti fibriferos. Folia
polluciana basi attenuata, glabra. Flores ad apicem conferti breves
pedicellati conferti alterni, folia floralia fructum caule non
an manulea capitata lin.

98
divaricata M. Thurb.
indiana Courcui