

Maranta

Maranta Arifia Aubl. gener distincta secundum Richard uti et Thalen No 116.

Catea Maranta

Maranta Catea Jacq. coll. 4. p. 117.

Habitata ad Canabas 2.

Caulis plures, sex pedales erecti crassitie calami, compressi, nitidi ad
folia nodose inersati. Folia radicalia plura disticha, caulina
oblonga disticha, acuta oblique lineata, nitida, plana, pedalia
petalastera. Spica pedunculata disticha, erecta terminalis
et axillaris, ramo uno saepe aucto, simpliciter. bractea bivalves alter
na, ^{quibus} disticha, subconacea lactea, inferius sequi pollicari-
altero ^{major} minore. Calyx bracteis exolor. Corolla duplex esse
non tripetala petalis oblongis. interior monopetala tripartita
lacina una reliqui major Jacq.

Maranta capitata Culmis simplicibus apice florifero, capitulo globoso depresso
30 fl. Penev. 1. pag. 3. tab 5.

Habitat in Penevia umbrosis et humidis

Radix fibrosa. Culmus simplex, teres, erectus, nudus, longitudine folio-
rum, in summitate ⁴ florifer, purpureo-roseus. Nodus radicalis longe
petiolata, ovato-oblonga sublanco-lataque, acuminata, integerrima
globosa, basi inaequali, lineis nervis notata. Petioli teretes, ultra me-
dium curvati. Flores in capitulo globoso, depresso. Bractea ad singulum
flor, ovato-lanceolata, acuta, integerrima, viridi-lutea, longitudine

facies nervi
et canudina
eas an dicitur
pa? v.

ferre florem. Calyx 3phyllus: foliola lanceolata, concava, albicantia.
Corolla 1 petala, infundibuliformis, nigra. Tubus cyathini us inflexus
basi incrassatus. Laciniae sexfidus: laciniae 3 exteriores ovato, obovato
albida: 3 interiores luteo-fulvae; 2 sub laterales ellipticae, integrae
suprema emarginata. Filamentum membranaceum laciniae corollae semi-
le. Anthera linear-oblonga. Germen obovatum, trigonum inferum. Stylus
longitudine corollae. Stigma obsolete trigonum. Capsula obovata, 3gona,
triloculari & trilobulari, 3-valvis. Semina solitaria, nigra.

aruma M. caule infero nudo. Aubl fl. guian pag 1

Habitat in Guiana

non vidi

anudinacea M. culmo ramoso Lin. L. V.

Maranta anudinacea, Cannae in foliis Plum. gen 16 Max.

Cent. 39. 8. 39.

Maranta Hort. Cliff 24

Habitat in America calidioribus

Caulis erectus superne dichotome difusus tenues. Folia
petiolo inferne vaginante versus folium nodoso
punculi ultimi biflori spatula monophylla linearis
pedunculo communi brevior

~~Specimen herbarii nunc valet~~

Junica Mar. caule virgato inferne nudo, foliis cauleni petiolatis, pedunculis
squamoso loricatis la Mark. P. Engl. pag. 9.
Habitat in Caribei Guana

non vidi

Cutca Mar. foliis radicalibus ovato-lanceolatis acutis longe petiolatis, pinnis
squamoso-imbriatis. F. Enc: pag. 9
Habitat in Cambosi Guiana.

michi ignota

malaccensis M? Culmo simplicii, foliis oblongis petiolatis subtus pennis
pubescentibus Wild. Juss. pl. p. 14.

Galang malaccensis Rumph. amb. 5. p. 17 t. 71. fig. 1.

Maranta malaccensis culmo simplicii, foliis ovatis pe
tiolatis Burm. ind. 2.

Habitat in Malacca

Costus malaccensis Herb. obs. 3. p. 71.

nisi ignota

~~Conza Curcumae foliis lanceolatis: nervis lateralibus numerosis Con L. V. p. 51.
maxilla sua Rheed. Mat. 2. p. 21. f. 11.
Curcuma radice longa Herm. Lugdb. 208. t. 209.
Habitat in India 4~~

comosa M. coma foliolis reflexis den. Suppl. p. 00. 4. 5. 1

Habitat in Sumatra 4

Scapus nudus teres terminatus foliis frequentibus lanicatis
oblongis confectis finis

caulis prope nudo mucato comosus, coma foliolis reflexis

Lobelia M. foliis siapo nudo, capitulo folioso, foliis ovato
rotundatis

Aheed mat. II. p. 67. t. 34

habitat in Andia orientali

non rd.

a Clouya Maranta radicibus tuberosis, culmo simpliciter apice folioso, spica
ovata imbricata La Mart. P. Eni: pag 9.
Habitat in America, Domingo

non videtur eadem cum folioso

humilis ^m caule ramofo foliis brevior radicibus tuberosis Aubl.

Habitat in Guiana

non vid.