

122.

Manisuris.

Cal 2-valvis, subtrifloro. ^{Cor.} Glumae ^{superior} ~~distiche~~ ^{inferior} ~~umbri~~ catuae. Sty
lus trip 3-fidus. Setae nullae vel brevis simae.

inferior superiorem inferne amplexans

Manduc

alterni folia *Glycyrrhiza* spicis cylindricis retrosum imbricatis, involucri ne
dunculi quoque alternis

Habitat in Guinea Thunberg 4

Culmi pedales & ultra, crassitie pennae columbinae, inferne
foliati. Folia culmo breviora, graminea, lacinata, extorsum

Involucrum decaphyllum, foliola alternis, opposita, serrata, nonnul-
la longitudine tres culmi, latitudine foliorum. Pedunculi tot

quot involucri foliola, unicus inter pingulum, ^{foliolum} tripollicares et
ultra. Spiculae semipollicares, ~~retrosum imbricatae~~ : spiculae

A Octo eae pol
vix pollicares, Mun
catae, superne
purpureo puncta
sae

ut in *H. umbellata*. Stamina tria. Stylus trifidus. Spiculae
pubescentes, virides; foliolum ^{retrosum brevissimum} ~~multum~~ ad spiculam ^{pubescentem brevissimum} ~~longius~~ ^{pubescentem brevissimum}

~~superioribus~~ longioribus linearibus. Corollae glumae inferioris glumae
oblongae, superioris. Stamina tria. Stylus trifidus. calycis valvula
brevior ovata, longior linearis-lanceolata. Corolla glumae oblon-

10 Manducos

Cyperinus 7

Kyllingia spicis cylindricis, spiculis erectis, bracteis spiculis brevioribus,

Kyllingia cyperina; culmo triquetro striato basi folioso, umbella simplicis, spicis sessilibus, involucrio universaliter polyphylo longioribus, partiali nullo Retz. obs. 6. p. 21. ?

Habitat in India orientali Koenig, et in Guinea Thunberg &

Culmus basi Radix repens. Culmi pedales vel parum ultra basi inferae foliosi. Tota nonnulla altitudine fere culmo altiora. Involucrum

Ochreae oblique truncatae obtusae.

hexa-heptaphyllum: foliola longissima⁴. Umbella sex-septemradiala; radii semipollicaris. Spicae pollicares. Spicae pollicares, imbricatae: spiculae subulatae, peristae; ^{valvulae} calyis glumae ^{longae⁴} inaequales, oblongae. Corollae glumae linearis. Stamina tria. Stylus trifidus.

Quamvis spicae sessiles in Retzii Kyll. cyperina, forte Tamen eadem

4) margine pallidae, lanina viride.

cum mea reliqua descriptio quadrat et in nonnullis affinibus videtur spicas sessiles in aliis individuis in aliis sicut pedunculatas.

- Inaeq. R. capitulis terminalibus subternis glomeratis sessilibus (er. Suppl.
14. t. 2. p. 67
p. 104. V. pag. 101.

Motenga Rheed. mal. 12. p. 97. t. 52.
Gramen cyperoides minus; spica compacta subrotunda, viridi; radice
odorata Sloan hist. 1. p. 119. Tab. 70. fig. 2.

Funicellus maderupnatenfis capitulis compactioribus; acuminis
bifido longiora Pluken. Tab. 147. fig. 7.

~~Siquis glomeratus, culmo Inguetro folio lina spici~~

Thyriophalum Schoenus nucus
nemorale
Forsk

Schoenus tuberosus culmo Inguetro; capitulis ternis sessilibus; in
volucris longissimis viridi radice tuberosa Burm. ind. pag. 19

Habitat in Indis

Culmi plures, caespitosi basi subpullosi erecti digitales vel palmari-
basia aequant folios superne nudi Inguetri glabri folia angusta lan-
ta, canaliculata glabra. Involucra 3-4 phylla strictura foliorum
2 longissima brevis pollicare capitula terminalia plerumque
terna interdum 2 vel 400 sublonga intermedium reliquis parum
maius magnitudine pisi squama lanceolata

Schoenus nucus

capillaris,
nanus

~~Cyperus~~ Mansuet spica

Cyperus capitato oblonga retrosum imbricata, spiculis linearibus
retiusculis culmo basi foliis involucri diphylla culmo basi foliis

Schoenus
capillaris

Cyperus nanus; Culmo triquetro setaceo, umbella sessili capitata diphylla,
glumis nervosis Wild. Spec. pl. 1. p. 272

culmo triquetro

Habitat in Caribaeis West.

pro nudo foliis
capillaribus, spi

Culmi caespitosi, digitales - pedales, filiformes, ter inferne folio-

culis fasciula

bi, basi subbulbosi. folia setacea, culmo interdum longiora

tis reflexis in
volucribus; in

trifolium, & reflexum; folium unicum

volucri diphylla

tripollicare, reliqua sensim minora: Capitulum ^{simplex solitum} magnitudine

Waltz prodr 20
Fl. ind. ant. 1.
p. 106

Pipens nigr, interdum duplo vel triplo minor, flavo - ferruginea,

spiculae lineares, ~~retiusculae~~ retrosum imbricatae. Spiculae ter-

triflorae, triplorae, ⁵⁻⁷ Va basi valvulis duabus minutis ovatis calycin-

latae: valvulae ⁵⁻⁷ oblongae, striatae.

Habitat Ab ^{est} partibus reosimile habuit Cel. Wildenowius Deoque

Guineam uti patriam assignavit, & certius vero fide herbarii

exer cum in Martinique insula Martiana legit. Synonymum
nunc Plukenetii dubium videtur. Spiculae majores vel minores
ratione magnitudinis ^{et hinc} ~~capituli~~.

~~adde~~
taxis

Heliformis K umbella terminali simplici, fructis seplibus pedunculatis que ovatis,
speculis ovatis acutis, involucri triplicato, particali nullo Sw. prodr. p 20
Habitat in Hispaniola, Jamaica

non idem

gracilis 2 ~~Quercus~~ ~~nanicus~~ ~~apiculatus~~, ~~spica~~ ~~Spiculae~~ ~~subiflorae~~ ~~Diphylla~~
~~capitata~~ ~~subglobosa~~ ~~sessilibus~~ ~~foliis~~, involucri ~~8~~ ~~setae~~ ~~co.~~

monicus Habitat in America meridionali Richard.

~~ephyllum~~
Culmi fere pedales et ultra, subpetalici, monophyl basi vaginis dua-
bus vestiti, monophylli. Solum angustum, bi-Tripollicare, ~~unicum~~
Involucrium triphyllum; foliola dua setacea, duo bi-Tripollicaria,
tertium pennisulcare. ~~capitulum~~ ~~semine~~ ~~coriandi~~ ~~parum~~ ~~ma-~~

Spica ~~is~~, flava. Spiculae ovatae, acutae, fructiferae trigonae. Corollae
glumae ovatae, stia acutae. Semen trigonum
Stamina duo. Stylus trip. duo Richard.

incompleta *Nyctanthe umbellata* composita foliosa specis oblongis sessilibus diva
mi ato digitatis La Mark. Gen: pag. 149.

Nyctanthe incompleta Jacq. coll. 4. pag. 100.

Habitat ad Cap. specis 2

Culmi plures, basi bulbosè incrassati erecti, triquetri; nitidi glabri
inferne purpurascetes aphylli tripedales calamo crassioris umbella
terminali basi vaginæ foliorum. Depeditonum vestiti. Stoliolum in
planta floente plerumque unicum vel alterum radiale culmo
brevis, dimidiam unciam lata vaginans lineare lineatur canna
tum efflabrum canna et margine scabrum. Involucrum uniseriale
et polyphyllum, tubus exterioribus radiali simillimis longiori
bipedali caeteri breviores acutiores inaequales. radii plures tri
quetri, longiores trunciales valde inaequales. Radii externi umbelliferi
specis ^{in herbis} ~~in herbis~~ 4. Inferiore simplicissimi rad. spica unica exteriorem
omnes monostachyi. specis cylindrica recta, calamum crassa 1.2 polli
Carlo. flosculi distincti patentissimi. Calyx univalvis Jacq.

mihi ignota

aphyllus 3 Maritimus

~~odorata~~ 6 Nyctingya aphyllus, ^{Spica} ~~capitula~~ globosa sessili solitaria, in volucri
subtriphylo brevis pino.

Tuncus cyprioides, culmo compresso striato, radice odorata tuberosa, capitula
lo rotundo compacto Sloan. cat. 36 hist. 1. p 121. V. 21. 7-2

Habitat in arenosis ad sinus maris Americanae Honduras dictus, # in 4

Senegal Dupuis Radices repentes. Culmi pedales, bigoni, basi vaginati. Colo Vaginae
loco foliorum, plures, griseae interiores longiores, oblique truncatae,
ex obtusae, griseae apice ferrugineo-marginatae. Capitula involu-
cris ^{ovatis} ~~et ovatis~~ lanceolatis. Capitula

Di-triphyllum, Spica enim # diphyllum, ~~capitula~~ brevius: foliis lanceolatis. Capitula
Spica ^{parvae} ~~parvae~~ ^{duplo} ~~duplo~~ major, globosam. Spicula copiosissima, lineari-lanceolatae
glumae ~~volubiles~~ purpureae punctatae. Stamina tria. Stylus bifidus

Specimen a Senegal differt quod duplo majus magnitudine du-
plo majori.

4 manicus Spicis cylindricis

panicum ^{ur} 7. Spiculæ oblongæ acutæ, bracteis setaceis spiculis brevioribus.

Kyllinga panicæ; culmo setaceo, triquetro; spicis cylindricis, imbricatis; flori-
bus triquetris, subulatis arato - patentibus Roebb. gram 15. t. 4. f. 1. Gaertn. de fr

fruct 1. p. 12
t. 2. f. 5.

Kyllinga panicæ; umbella terminali: spicis sessilibus pedunculatis que
cylindricis imbricatis, involucrio univ ersali subtetraphyllo, partiali nullo
Lin. suppl. 105

Habitat in Arabia felici & India orientali König. basi bulbosissima
Radix bulbosa. Culmi pedales, acute angulati, rigidi, basi foliosi. Soli
pluro, unum vel alterum altitudine culmi, carinata. Involucrum tetra-
phyllum, unum semipedale et ultra. Umbella quinque - sex radiata.

Bractea setacea, radiis & semipollicares. Spicæ semipollicares, cylindricæ im-
bricatæ. Spiculæ ^{trifloræ} ~~trifloræ~~ ^{trifloræ} ~~trifloræ~~ trifloræ, trifloræ. Calycis ^{salvular} ~~glab~~
oblongæ, membranaceæ. Corollæ glumæ oblongæ, sæpe fusco in-
ratæ, frequenter margine & apice flavescetes, carina vides.

umbellata R. umbella terminali: specis fasciculatis pedunculatis que cylindri-
cis squarosis, involucri unicefali polyphyllis, partiali: diphyllo her
Suppl. p. 105 L. V. 101

Kroll-pulle Rheed. mat. 12. p. 119. t. 83.

Trullenga umbellata: culmo triquetri; umbella strictis sima
simplicis; specis terminalibus solitariis; floribus confertis
reflexis Prott. gran. pag. 15 Tab. 4. fig. 2 *

Scopus cyperoides: culmo triquetro nudo; umbella simplici;
specis oblongis; flosculis subulatis, unifloris, reflexis
Linn. mat. at p. 101 *

Habitat in India

Culmi triquetri nudi pedales & lani teres. involucrium subper
marginata abemina
triphyllo longissimo specis ^{circiter 6} unguiculari-
fere pedunculata pedunculata saepe bipollicari flosculis
angusti verticillati reflexi.

Flav^{us} 24 ⁵ mansus Spicae cylindricae
~~Spiculae~~ oblongae, bracteis setaceis serrulatis Spiculae
~~longae~~ aequantibus.

Habitat in America meridionali s. Robt, Richard

Culmi approximati, sesquipedales. Sola culm duo-tria, culmo breviora.

4 vel volucrium Tetraphyllum; foliolum longius quadripollicare. Spicae

quatuor Umbella quadri-quinque radiata; radii brevis simi. Spicae

semipollicares, cylindricae. Calycis valvulae oblongo-ovatae. Corollae

glumae purpureo lineolatae flavescentes, purpureo lineolatae.

Affinis praecedenti; diversa, bracteis, et glumis latioribus, magis qu-

striatis.

Gramen Cyperoides, articulum, spicis gracilibus, oblongo-rotundis, spar-
gatis in medium articulis, et funiculum caulem radiculis longis in articulis
bus interdixit. Plecton.

Stellatus L. Culmo ~~sub~~ ^{tri}quetra, spiculis conglomeratis involucri foliaceo,
basi colorata ~~in~~ ^{superior}
gramen cyperoides ~~spica~~ ^{spica} compacta alba, foliis ad ~~spicam~~ ^{spicam} partem albis
partem ~~veridibus~~ ^{veridibus} Sloan herb. 1. pag. 119. t. 7. p. 1.

Habitat in India occidentali

Culmi uti ~~in~~ ^{infera} ~~volucri~~ ^{infera} folia marginata et involucri foliola extus
basi villosi, pedales inferne ~~obpuse~~ ^{obpuse} ~~in~~ ⁱⁿ ~~quarta~~ ^{quarta} ~~superne~~ ^{superne} ~~in~~ ⁱⁿ ~~quarta~~ ^{quarta}
seriatis folia basi vaginatis plura striata culmo dimidio
breuora carinata supra laeva ~~subtus~~ ^{subtus} striata involucrium
circiter octophyllum folioli carinatis: tri 4-pollicantibus
inæqualibus extus pallide ~~veridibus~~ ^{veridibus}. Spicula plures oblon-
ge albide

Genus distinctum secund. Richard. Dichroma dictum. herb. Guis. et Aubl.

Secundum De la Mark involucrium pentaphyllum est

Sloan herb. 1. pag. 119. t. 7. p. 1. ~~verum mea~~ ^{verum mea} ~~Su~~ ^{Su}
~~villosi~~ ^{villosi} ~~in~~ ⁱⁿ ~~quarta~~ ^{quarta}

ovularis 6 manicus spicis ovali subrotundis, involvens polyphylla

Cyperus floribus capitatis acutis pedunculatis Gron. v. 12.

Schoenus umbellatus, Culmo ~~floso~~ triquetro foloso, spicis umbellatis paucis

Gramen cyperoides Collect. 1. p. 113. G. var. 1. t. 10a

americanum, spicis hyllingui ovularis; spicis umbellatis, sessilibus pedunculatis que, glom-
eris grandioribus baso-ovoides: glumis rectis, lanceolatis: valvulis exterioribus ovalibus;
oblongo-rotundis, staminibus tribus: stylo tripartito Mich. fl. bor. amer. 1. p. 29.

peruvianum in monte Habitat in Georgia et Carolina Bois. 4

dum est notis, Culmi plures, pedales et sesquipedales, acuta trigoni. Solia culmo brevi
ad summum cau viosa, sesqui- basam lata, linearis, base vaginantis. Involucrum

tem pediculis

sub hexaphyllum umbella longius: foliola structura foliorum, longius

longiora in nitas

marginem connaque de latro
spith maeu umbellae, di sex septem, longior tripollicari

tibus Plukh. alm

spica per major, interdum foliola duo sub ad basim, interdum nulla;

179. t. 91. 4

spiculae sub rotatae: equanae striatae.

Nullum descripserunt inter Sch. umbellatum et hylling. ovularem in revis

deoque eos conspicui, quod hic scirpus echinatus virginicus linearis

non subito de synonymis reliquis cum et patria et icone Plukh.
tailor venit.

sub nomine
echinatus

Quod scirpus echinatus echinatus Lin. fl. 2. sept. 12. huc pertinet? pro

mod culmus tenuior, brevior: pedunculi breviores, capitulis minoribus, spicis

parte

Sic quod magnitudinem quadrans cum sc. echinato Lin. Diverso modo Spiritu globo-
ris, nec putatis, si vero Plura. figura genuinum sc. echinatum representat, Dam-
erit ac Manibus evulans.

7 ~~1202~~ ~~manisau~~ ~~Spici~~ ~~retrofractum~~ ~~subumbriat~~ ~~s~~,
retrofractus ~~120~~ ~~Cyperus~~ ~~Spiculis~~ ~~subulatis~~ ~~retrofractis~~, involucrio ~~triphylla~~
24 umbella longiore

Cyperus genus indianum, panicula speciosa, spiculis propeantibus
atris Pluk. t. 4. 15. f. 4

Scirpus retrofractus; culmo triquetro, umbella simpliciter, spicam
flosculi retrofractis Lin Syst. veg. 102. Gaertn. de fruct. 1. p. 12. t. 2. f. 5
Habitat in Virginia. Ex herbario Vaillantii et Gussiae

Glomeris Culmi sesquipedales, graciles; ^{folia coniseta} ~~alutae~~. Involucrum triphyllum
foliola ~~foliola linearia~~, duo umbella longiora, marginia ~~scabra~~ ~~marginata~~ ~~marginata~~ ~~marginata~~
a basi ad apicem ~~granulata~~ ~~scabra~~. Ochrea bidentata, purpureo
punctata. Umbellae radii quique, longior sesqui pollicari, erecti.
Spicula ~~Spica~~ vix semipollicares. Spica ^{ata} viginti quatuor omnes
retrofracti praeter ~~terminalem~~ ~~quos~~ ~~erecta~~, unguicularia infirma
inferiora pedum radii adpressae, unguicularae, variae, vix ad ~~stamina~~
filiis ~~serati~~ ~~filiiformes~~; ~~laetiora~~ ^{libera} ~~laetiora~~. ~~Salvula~~ ~~lineares~~, ~~convoluta~~
~~lineares~~. ~~Subtilis~~ ~~et~~ ~~vine~~ ~~seriata~~, purpureo punctata. Germina linearia ~~striata~~
ta Inia.

Corollae glomerat

129

umbra simpl.

Plus quam flosculi duo in singula spicula non inveni; alternantes
Valent ~~in~~ ~~apicem~~ ~~laetiora~~ ~~et~~ ~~laetiora~~ ~~et~~ ~~laetiora~~ ~~et~~ ~~laetiora~~

alternifolius. C. culmo tranqueto nudo ~~apice~~ suprame alternatim folios
pedunculis lateralibus spica ornatimuriculis proleferis. An. Mont. 1808
gramen flexatile geniculatum, panicula foliacea, pedunculis
~~lateralibus~~ ~~erigularum~~ Monf. bot. 3. p. 103. f. 51. t. 3. fig. 17
Habitat in Argentina.

Culmi pedales. Folia vespis summitatem ter, pedales margine
si abiusculo bractea subulata a singulis alis. Peduncu-
lus filiformis, folio quadruplo brevior. Pedicelli aliquot
e spica basi apice ferentes spicam similem. Deoque umbella
simplex

~~Spicae describitur vel lignum. Habitat in Argentina. An. Mont. 1808.~~
at 1811
h

umbellata^{us} ^Q ~~Hydropgia~~ ^{manicus}

~~Hydropgia~~ ^{ribas} ^{vivulens} polyphyllis
Kollpullu Rheed. mal. 12. p. 119. t. 63.

Scirpus Cyperodes; culmo triquetronudo, umbella simplicii; spicis oblongis; flosculis pubulatis, unifloris reflexis Lin. mant. 181.

Nyctaginia umbellata; culmo triquetro; umbella strictissima, simplicii; spicis terminalibus, solitariis; floribus confertis reflexis Roth. gram. 15. t. 4. f. 2.

Nyctaginia umbellata; umbella terminali: spicis sessilibus pedunculatisque squarrosis, involucro universali polyphyllis, partioli diphyllis Lin. Suppl. 105

Nyctaginia Sumatrensis, umbella terminali, spicis sessilibus pedunculatisque cylindricis squarrosis, involucro universali polyphyllis, partioli nullo Retz. obs. 4 p. 13.

Habitat in India orientali & ^{Caesura}
Betacium, ^{etylem} ^{base foliosae} ^{longiora}, ^{marginibus}
Ozthrea ^{obliqua} ^{truncatae}, ^{mucosa}
^{quadruple} ^{longiora}: ^{partiale} ^{triphyllum} ^{vel} ^{nullum} #. Umbella ^{quadrupla}
^{quae} ^{quae} ^{radiata}; ^{radius} ^{longior} ^{tripollicinarum}. ^{pericla} ^{cylindrica}
^{semipollicinari}, ^{retro} ^{sum} ^{imbricatae}: ^{spiculae} ^{parvae}, ^{reflexae} ^{confertae}, ^{partim} ^{patenter}
^{vel} ^{reflexae}, ^{pubulatae}. ^{calycis} ^{solvulae}, ^{minutae}, ^{ovatae}, ^{imbricatae}.

Corollae glumae linearis. Stylis trifidis

~~V. umbellata~~

~~Tres alia misit~~

~~Duae alia misit~~

Tres ^{es} alia misit Koenigium ~~sub nomine~~ Kyllingaeum bulbosum, altera

~~ab eoque nomine, ambae diversae # partibus omnibus ^{robustior} ^{et} ^{magis} ^{robustioribus}, specieis pluribus;~~
~~umbellata~~ ~~et~~ ~~brevis pedunculatis, coeternum quoad reliquam & fructuram omnino~~ ~~res semi-~~
~~les, nisi quod secundae folia non glauca sunt et speculae parum curvatis~~ ~~parum curvatis~~ ~~quae quoque observo in speculis nonnullis~~ ~~Kyllingae~~
~~umbellatae. Varietatem secundae ^{nonnullis} ^{ex India} ^{orientali} habui, et culmo foliisque~~
~~filiformibus, specieis duabus vel quatuor~~

id eoque
non nisi
varietates
esse suspicor

Duo specimina, unicum sub nomine Kyllingae bulbosae, alterum ab eoque nomi-
ne, misit Koenigius, utrumque a M. umbellato diversa, dunc in toto robu-
stante sunt, specieis pluribus brevius pedunculatis et fructura robustiori, quo-
ad habitum vero omnino confamilia sunt, nisi quod specimen innominatum gaudet
foliis non glaucis et speculis viridifuscis parum curvatis, quod quoque
in speculis nonnullis M. umbellati observavi, ideoque ea non nisi va-
rietates esse suspicor. Varietatem quoque habeo speciminis innominati

culmo foliisque
filiformibus, spic-
ulis tantum dua.
bus quatuor.

Conspectu veniunt

Habitus. Radix stolonifera. Culmi erecti, acute trigoni, striati, basi subul-
bosi, inferne foliosi. Solia linearia, latiora vel angustiora, carinata, basi
vaginantia, marginibus serrulato-sabrat. Involucrum foliolis
simillima. Spicae in Umbella Terminali, unica in singulo radio,

vaginae purpureae
imbricatae, centrali sessili. Spiculae alternae, remotiusculae, in basi teretes. Bractea
dentata. Corollae glumae striatae. Rachis angulata, dentata.

Hoc a Hyllis separari non modo ^{tam ob} habitu, ^{quam ob} fructificationem
Diversam. Spiculae teretes, sunt subulatae sunt, haec ovatae, compressae. Ca-
lyx non unicum flosculum continet, sed minimum duos plerumque veros.
Corollae glumae longe alio modo disponuntur, non enim parallelae bitae

interiorem tam planam que vix ad dimidiam partem includens, omnes suis pedicellis
gaudentes, quod etiam in Speciminibus exsicatis facile negotio apparet,
florente glumae in ferio, superior concoluta est et nil nisi receptaculum
comune habet, cum inferiore ^{praeter} receptaculum. Sunt igitur
tot flosculi quot glumae, non glumae quodam flosculi.
Stylus semper trifidus, non bifidus. Si flosculi tres ad sunt, secun-
do pedicellatus est, in quo fundo singulae glumae semen inveniuntur

status

Pl. mariscus Spicis cylindricis, spiculis patentibus & imis, bracteis spiculis longioribus.

Nyctingia incompleta; culmo triquetro folioso, umbella terminali composita, spicis cylindricis; calyce monophylllo Forqu. Collect. 4. p. 101.
Gr. var. 2. t 300

Nyctingia cayanensis; umbella terminali: spicis sessilibus pedunculatisque, flosculis reflexis; involucrio longissimo sub-orthophyllo Lamarck illustr. 1. p. 149.

Habitat ad Carracas locis edis, in Cayenna v. Rohr.

Culmi pluri ^{interdum} tripedales, crassitie pennae anserinae, nitidi. Sola altitudine fere culmi, semiunguem vel ultra lata. Involucrium universale subhexaphyllum: foliolum unicum pedale vel bipedale. Umbellae radii plures, longiores bipolliares: pericalis quadriradiata. Spicae crassitie pennae anserinae, pollicares bipolliares: spiculae triflorae. Corollae glumae erectae, margine tenuiores. Spontanea, uti et culta variat, spiculis omnibus sessilibus, quinque ad septem, lateralibus horizontaliter patentibus ^{intermedia} terminali erecta, vel umbellis compositis simplicibus vel compositis. Calyx certe bivalvis, pericarpium ~~in~~ mediante aculeo levi manu abraditur, ambae in

~~egg~~

Affiniores Cyperis videntur, et forte non absolum foret eum eis conjugere, dum glu-
 mae ^{enim} distichae sunt, ~~et spicula, tantummodo paucitate, sequitur diversa,~~
~~diversae, tantummodo spiculis paucis floris.~~ Quod glumae duae
 infimae & teretes sunt, deque calycis valvulae dictae, nil impedit, dum in quam
 plurimis Cyperis ^{idem accipit.} etiam adsunt et eundem structurae. Si vero uti genus distinctio
 tum assumitur vel ob paucitatem flosculorum, vel quia Cyperi genus
 jam dudum satis vastum est, character naturalis quam sequens erit.

Character naturalis:

Glumae
 flores sic
 & triquetri
 bit

- Calyx valvulae duae, inaequales, subtriploae, membranaceae,
- Corolla uniglumis, ^{inferne} inferior & superiorem amplectens.
- Stamina tria. Antherae lineares.
- Pistillum. Germen angulatum. Stylus trifidus. Stigmata simplicia.
- Semen. Trigonomum. Setae nullae.

L
 Productus rotundus. Flosculi conferti, apiculati, bise recurvi.
 Gleditsia in Africa? Rob. Nut.
 Rydberg?

flava

~~Nyctinga~~

Habitat in Insula St. Thomae Ex herbario Fusisiei

Culmus pedalis, crassitie fere penae columbinae, acuta angulatus,
rigidus, basi foliosus. ^{duo} Solia tria, culmo breviora, rigida scissula, can-

nata, margine ^{laevia}: Vaginae aequales bi-tripollicares, superne

exstrorsum

et carina uti folio membranaceae, pallide ferrugineae. Involucrum pentaphyllum: folia
ca involuti sicca laevia, rigida, caninata, unicum tripollicare. Spicae sessiles
berrima
sex pollicares, imbricatae, teretes, obtusae. Flores ovati. Bractea ova-

ta ^{attenuata} ^{oblongae membranaceae} ^{concavae sub} ^{quadratae} ^{laevae}
valvulae ^{attenuata} ^{oblongae membranaceae} ^{concavae sub} ^{quadratae} ^{laevae}
saee. Stylus bifidus. Semen ^{quadratum} ^{laevae}

Spicae sessiles eadem cum cla