

Marbrica

Cal. prismatica pentagonis. Cor. infundibuli formis. Capsula bivalvis
bivalvis, superne coarctata, polysperma.

Coccinea Martiana Act. Soc. Hist. Nat. Cors. Tom 1. P.

Habitat. Capenna Richard 4

Orbita fermentosa, sicandens et subvolubilis, totus glaber. Folia brevia, petio-
lata, alterna, subsessilia, elliptica, basi ovata, acuminata, acuta, in-
venissima, avena, e nerva, subtus simpliciter obsolete venosa, supra lavi-
a dunculi panem ad latus axillo, solitarii, longi semi, recurvo pediculi
superne in ramis nonnullis, uniflori dursi. Calyx tubulosus, pentagonus,
squefidus: laciniis lanceolatis, valde attenuatis, persistentibus. Corolla subtrifida
dibuliformis: tubus calycis duplo longior et multo angustior, sive angulatus
in faucem latescens. Limbus subrotato-patentissimus, sive patitur: la-
ciniis aequalibus, suborbiculatis. Stamina sive longitudine tubi, corpa infor-
ta: filamenta basi pubescentia. Anthera exserta, oblonga, obtusa, profunde
quadrisulcata. Germen superum, conoideum. Stylus aethidine staminum
stigma sublanicolatum: Capsula oblonga, supra medietatem coarctata, et lo-
culant, 2 valvis. Semina numerosa ad axin disposita, oblique asurgentia,
oblonga, subincurva, Versus pupula Richard

Monkea

Pal. Linguis spong. prismaticeis semispiduis. Cor subinfradibuliformis
limbo patente subequaliter et obtuse spartito. filamenta squalea
longitudine tubi. Capsula oblonga teres superne dilatata
polyperma

^{in honorem}
sic dicta La Monkei

Coccinea Markea Act. for: hist. h. Par-1. pag. 107

Habitat in Amer. merid. Pedic. & rachis
glaber nuda foliis oblongo obovatis acuminatis basi rotundatis
ovatis obtusis nitidissimis. Pediculis longis pediculis ramis