

# Marrubium?

\* calycibus quinque dentatis

1. alyson M. foliis cuneiformibus subquinque dentatis plicatis, vertice illis involucri  
*definitis* *ferratis* *bracteatis*
2. peregrinum M. foliis inferioribus ovalibus, superioribus lanceolatis, calycium  
*denticulis petalaeis*
3. cardispermum M. foliis subovatis lanatis, denticulis calycinis subulatis *superioribus*  
*laciniis labii*
4. afranicum M. foliis ovatis crenatis tomentosi nervosissimis, dentibus caly  
*cinis subulatis*, laciniis corollae superioribus acutis. *obtusis*
5. supinum M. foliis oblongis crenatis, dentibus calycinis petalaeis rectis  
*allops* laciniis labii superioribus acutis *multis*

\* \* calycibus decem dentatis

6. vulgare M. foliis ovale subrotundis nervosis, dentibus calycinis petalaeis uncinatis
7. hesperis fimum M. foliis cordato-ovatis serratis hesperis, dentibus calycinis petalaeis  
*caulis reflexis*
8. africanum M. foliis cordatis subrotundis emarginato-crenatis

9. *crispum* M. foliis cordatis subrotundis crenato-subdentatis, calycibus <sup>inferius brevifloris</sup> decemdentatis  
 his muticis
10. *hispanicum* M. calycum limbis patentibus decemdentatis, denticulis acutis
11. *pseudocitannus* M. calycis foliis cordatis concavis crenatis, calycum limbis  
 detrim. dentatis  
 planis villosis, caule fruticoso.
12. *acetabulosum* M. calycum limbis 20 dentatis tubo longioribus membranaceis  
 de 20 dentatis: Dentibus alteris majoribus rotundatis

*Pseudodictamnus folio nigricante et villosa herb. Tournef*  
*manus. herb. Hafa.*

*M. leucatum*  
*rugosum* } Banks.

Mamibium

Habitat in Syna herb. Desfont

Caules in<sup>2</sup> anni, herbari. Folia petiolata, unguiculata vel parum ultra, ob  
ovata, basi acuta, supra rugosa subplicata, subtus nervosa, magis incana  
crenata. Verticilli multiflori. Calycis striati, parvi, decem dentati, dentes  
setacei, erecti. Bractea subulata, brevissima.

*Marubium*

*Marubium orientale* catano folio flore albo Tournef. Cor.

Habitat in Orienta herb. Desfont

Caulis herbaceus, canescens. Folia longa petiolata, semipollicaria, ovata-subrotunda, obtusissime grosse serrata, utrinque villosula, avenia, leviter, subtus incana nervosa. Verticilli axillares, multiflori. Involucrum subulata, longitudine calycis. Calyx dentibus 5-que filicis, erectis subquingentibus. Corolla villosa. Labrum superius lineare, bifidum.

Marrubium?

Marrubium orientale folus subrotundis flore albo

Habitat in Oriente herb. Desfont. 7

Caules plures, subterreos ascendentes, semipedales. Folia petiolata, semipollicina  
na, obovato-subrotunda, basi acuta, rugosa, et trifurca crenata. Verticilli multi  
flori. Calyx 5-natus: dentes 5que erecti, unipedati. Involucra ptacea calyce  
breviora

Marrubium

Marrubium orientale foliis subrotundis flore albo Tournef. Cor.  
Habitat in Oriente

habes



Marrubium<sup>o</sup>

Marrubium orientale foliis subrotundis flore purpureo Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. brief

Caulis adscendens, pedales

*Marrubium*

*Pseudodiatamnium orientale*, folus crenatis Tournef. Cor. pag. 12.

Habitat in Armenia herb. Tournef.

Caulis ramosis, villosus, canescens. Folia petiolata, pollicaria, ovato-subrotunda, venoso-subrugosa, supra lineata, subtus venosissima, canescentia utrinque villosa. Verticilli multiflori. Bractea subulata, pilosa, utriculosa ejusque longitudini. Calyx striatus, dentes 10. subulati.

Mamubium.

Mamma Pseudoclamnus hispanicus amplissimo folio candidante et villosis  
Habitat in Hispania herb. Tournef.

Caulis villosissimus, incanus. Folia suprapollicaria, cordata, obtusa, villosa  
subtus incana, profunde crenata. Calycis dentes ovati.

*Marrubium*

*Pseudodictamnus alpinus* & *verticillatus* minor

Habitat herb. Tournef.

Caulis herbaceus, inanis. Folia pollicaria, cordata, obtusa, venata, supra per un-  
dum venas lineata, subtus nigra. Verticilli multiflori. Calyx decemdentatus  
dentibus aequalibus, ovatis, acutis.

Catanosolum Mambium

Mambium orientale Catanosolio, flore albo Tournef. Cor.

Mambium ibenicum Catanosolio, flore albo Tournef.

Habitata in oriente herb. Lus.

Caulis sesquipedalis, ramosus, canescens. Folia petiolata, subcordato subrotunda, superius ovata, grosse obtuseque serrata, basi attenuata, nervosa, vix venosa, supra glabra, subtus villosa-incana, obtusa. Verticilli remoti, 24 flori. Bractea subulata. Calycis fructus villosi, dexter quinque subulati, patentes. Corolla extus ore lenti villosi.

Microphyllum Marrubium

Habitat hest Guss.

Folia unguiculata, ovata subcordata, tomento densa, uti rami verti, crassa, crenata obtusa, in ramulis aggregata. Verticilli multiflori. Bractea lanceolata longitudine calycis, Calycis infundibuliformis, 10 dentati, dentibus ovatis, mucronatis perulosis, alternis parum minoribus  
affinis Pseudodictamnus

*rotundifolium Mamebrum*

*Mamebrum orientale* foliis subrotundis floribus albis Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Tuss.

Caulis suffruticosus, basi ramosus, villosus canescens. Folia pedicelata, unguiculata basi acuta, subplicata, canescentia. Petioli longitudine folii. Stipes sessilis, utraque quinque. Calyces striati, quinque dentati, spinulosi verti, uti calyci villosi.

hujus varietas forte

*Mamebrum orientale* foliis subrotundis flore purpureo Tournef. Cor.  
+ foliis superioribus lanceolato oblonga. Caulis sesquipedalis. Bractea spatiosa longitudine calycis. Verticilli 20 flori.

*Cucurbitum Mammbium*

*Mammbium album*, foliis amplis lere cucurbitati

Habitat herb. fusc.

Raculi lanato-tomentosus. <sup>ut supra</sup> Folio petiolata, pollicaria, subrotunda, venoso-vegis, vil-  
losa-tomentosa, incana, basi parum acuminata. Verticilli multiflori. Bracteo-  
li <sup>knatus</sup> naves, calyce brevioris. Calycis dentes, quinque, subulati, recti, pilosi.



Indicum M. foliis cordatis serratis, calycibus villosis, dentibus subulatis

Burm. Thes. Zeyl. t. 7. fig. 1

Habitat in India orientali

non vidi

marginatum <sup>linear-lanceolatis</sup> A. foliis <sup>linear-lanceolatis</sup> ovatis <sup>linear-lanceolatis</sup> superioribus <sup>linear-lanceolatis</sup> profusis, floribus aggregatis terminalibus

~~Antorchicum marginatum foliis glaucis linear-lanceolatis, ovatis verticillatis superioribus profusis floribus aggregatis terminalibus, femine marginate de fontana~~  
<sup>in Ant. par. 1. pag. 36. tab. 7.</sup>

~~Habitat in montibus Orabona.~~

*Alyson m* foliis cuneiformibus quinque dentatis plicatis, verticillis involucri  
destitutis Lin. Spec. pl. p. 815 & Hort. Cliff. 3114

*Alyson Galeni* Claf. hu. 12. p. 35.

" *Alyson verticillatum*, foliis profunde incispi Bauh. pin. 232

*Marrubium album*, foliis incispi, flore coeruleo Monf. hist. 3. p. 377. f. 11.  
t. 10. fig. 12.

Habitat in Hispania &

*Marrubium plicatum* foliis semiorbiculatis plicatis vel foveatis  
topi rugosi plicato lobatis Roth. def. r. p. 213.

Caulei ramosi rigidi tomentosi incani saepe lana albida vestiti  
uti tota planta. Folia unguiculata supra lineato-subre-  
gosa subtus venosa apice dentibus 5 ad 8 inaequalibus obtusis  
flores sessiles. Calyces rigidi 5 dentati, dentibus angulatis den-  
tibus patentibus pungentibus tubus mucosus

peregrinum M. foliis ovato-lanceolatis serratis, calycum & bracteis  
petalis  
L. S. V. p. Jacq. fl. austr. 2. t. 160

Marrubium album pannonicum Clus. hist. 2. p. 34

Marrubium album latifolium peregrinum Bauh. pin. 230. Monf.  
L. 3. p. 577. f. 11. t. 9. fig. 8.

B. Marrubium creticum Dalech. hist. 9. 62.

Marrubium album angustifolium peregrinum Bauh. pin. 230

Habitat in Sicilia, Creta, Austria sicca & in Libano &

Caulis sesquipedales etiam usque tota planta foliis ramisque  
folia petiolata nervosa sesquipolliciana cloracea  
minus acute venis et nervis minus villosa serrata  
versus basin integerrima flores utraque 3. 5. bractea  
calycis longitudine calycis decem bractea

inferioribus  
ovalebus superioribus lanceolatis

~~D. L. L. 214. t. 174. fig. 15~~

~~D. L. L. 214. t. 175. fig. 214~~

candidissimum M. foliis subovatis lanatis, denticulis calycinis subulatis  
L. L. V  
Marrubium album candidissimum et villosum Tournes corol. 12.

Habitat in Creta?

Caulis semipedalis foliis inferne prostratis villosi  
setiselli densi. flor. candidi  
Folia subrotunda, basi acuminata, lacinato-tomentosa, secundum  
venas sulcata. Sed planta Royenii potius est superum. Folia basi  
versus integerrima herb Royen.

Dell. Coll. 210. 7. 174. 7. 214.  
non vidi.

afraicanicum M. foliis ovatis crenatis tomentosis rugosissimis; dentibus calyci  
nis pubulatis, laciniis corollae superionibus acutis L.V. p. 537.  
Gaëqu. Mpi. 2. p. 306. Fir. var. 4. 7.

Habitat ad affraican 4

Caules procumbentes; semi-pedales, ramosi plures e quibus  
quotannis alii caules adspurgunt herbacei pedales iniani  
erecti ~~et~~ ramosi, lanati. Folia petiolata iniana  
molliora <sup>certi illi multo flori involucria pubulata &</sup>  
lanata <sup>10</sup> <sup>offinatum</sup> Calyx 4-10 stratus  
Calyx <sup>superius</sup> bifidum Gaëqu

in herb. Schum.

calycibus ciliatis

*Lupinum* M. Dentibus calycinis setaceis rectis villosis lin. l. v

Marrubium album, feni co parvo et rotundo folio Boic. mus. 2. p. 70. f. 69  
Barr. c. 609

Marrubium album hispanicum majus Barr. c. 606.

Habitatio Hispania, g. narbonensi & herb. Mus.

Caulis ~~femipedalis~~ inferne prostrambentes villosi. verticilli  
densi floris candidi.

Tota planta cinerea. Caulis pedalis. Folia subtus magis  
cinerea ut in Althea oblonga obtusa crenata. Corolla  
alba  
v. 174. f. 15

non vidi

Dill. t. 174. v. f. 15.

vulgare M. dentibus calycinis fetaceis uncinatis Lin. 1. v

Mammibum vulgare Clus. hist. 2. p. 34.

Mammibum album vulgare Bauh. pin. 230

β. Mammibum album villosum Bauh. pin. 110. Pin. 230

Habitat in Europa boreali niderati &

Caulis lanato tomentosus basi ramosus pedalis et ultra  
Folia petiolata ovata inaequaliter ~~et~~ crenata venosa  
rugosa, pallidiora subtus et lanugine albida. ver  
tuelli multiflora. Calycis lutei floris parvis labio  
superiore bifido



*hispulosimum* <sup>vatis</sup> foliis cordato serratis hispidis dentibus calycibus  
petalis reflexis  
Mammium albur rotundifolium hispanicum Heron. pand.

201. tab. 201

Habitatio Hispania 4

Caulis uti tota planta epulis copiosi valde <sup>molli</sup> hispidi ramo  
fus. Folia petiolata inferiora sesquipollicaria sub  
tus villosiora laneflora vix nullis obtusa, obtuse  
serrata sessili multiflora. Calycis infundibuliformes  
decem dentati. Corolla labium superius quadridentatum

tab. 99 (Pseudoditamnus hispanicus serpyllariifolius Tournef. in H. v. h.  
Pseudoditamnus hispanicus amplifolius candicans et villos.  
Tournef. f. s. h.)

Poyenianus herb.

convenit cum figura Heron. minima vix cum fig. Poyen.  
et Heron herb. Poyeni

alysson Marrubium foliis cuneiformibus. quinque dentatis plicatis verticillis  
in volucero depressatis Lin. l. v. pag. 537

Marrubium plicatum foliis semiorbiculatis, tomentosi negosi, plicato  
lobatis Boiss. pag. 213.

Forsthalii  
A Linno: M. alysson. Marrubium plicatum differt, convenit enim caule  
rigido, foliis plicatis basifatis in petiolum attenuatis, apice in equaliter  
obtusis crenato-dentatis, in volucris nullis, calycibus rigidis pun-  
gentibus differt, quod illa planta alto lanato, foliis minus cune-  
atis rotundioribus

africanum M. foliis cordatis subrotundis emarginato-crenatis  
maroubium album rotundifolium minus crispatis foliis Otheopium  
Pluken. alm. 242. t. 306. fig. 2.

Chido-Dictamnus africanus, foliis subrotundis subtrilobatis Com. hat  
2. p. 179. t. 90.

Habitat in Cap: b. p. 2

Caulis tetragonus pilosus. Folia petiolata pollicaria  
vellosa, profertim margine. verticilli multiflori pilosi  
bractes lineares labium superius corollae emarginatum  
lobis inferioribus trifidum lacina intermedia subrotunda  
inqualiter denticulata

*crispum* M. foliis cordatis subrotundis crenato-subdentatis, calycibus decemden-  
tatis mutis Lin. Spec. pl. 1674. L. V. pag. 530.

*Pseudo-Dicamnum nigrum*, rotundo *Enipifolium* Boerh. mus. 2. p. 152. t. 109.  
In titulo male.

*Marrubium de Lamni pruni foliis et facie* Herm. parad. 200. t. 200

Habitat in Italia, Hispania &

Caulis suffruticosus erectus, hirsutus, Stipula petiolata nigropilosa  
crenata subdentata subtus pilosa. Calyx infundibuliformis  
10 dentatus. Corolla purpurascens, non pilosa. Labio superiore subro-  
tundo, obtuso, integro; inferiore 3 fido: calicis intermedia bifida  
Lin.

hispanicum M. calycum limbis patentibus, denticulis acutis Lin. Vp. 5304

Lin. Spei: pag. 0164

Marrubium subrotundo folio Boiss. mus. 2. p. 167. t. 122. Barr. ii. 797

Marrubium album rotundifolium hispanicum Hermy. par. 201. t. 201.

Habitat in Hispania <sup>et huc spectat a Borel. fig. diversa.</sup>

limbibus acutis folio. folia omnia retroata crenata. caulis  
et rami hirti folia subtus dense villosa incana supra  
viridiora calyces hirsutissimi dentes omnes acuti alter  
nis majoribus

10 denticulis

~~caulis hirtus~~

hispanicum La Martiniæ <sup>condito</sup> gaudet foliis subrotundis herb. Guss. & Mus.

herb. Rozenie est hirsutissimum meum

gaudet hirsute

<sup>20 dentatis</sup>  
Acetabulofum M. calycum limbo tubo longioribus membranaceis: angulis  
majoribus rotundatis Lin. S. V. p. 530 & Spec. pl. naz. 817. &

Pseudoditamnus acetabuli moluccis Baub. pin. 222

Ditamnus foliis verticillatis, pene arpio conoide, botrius  
Marrel. ii. 1294

Habitat in Preta &

~~Molucella fruticosa Forst.~~

~~Caules dense tomentosi. Folia infera petiolata superna  
septica, cordata subrotunda, pollicaria subent infera~~

~~obliqua crenata superna integerrima, rugosa & tomentosa  
superiora crenata crenata  
causa adultiora superna virentiora. Verticilli multiflori~~

absoluta florifera sit tubo Duplo longior, nudus et mem  
branaceus, nec villosus ut in precedentibus: limbi majoris  
20 dentatis lobis alteris <sup>mucronatis</sup> <sup>mucronibus</sup> ~~rotundatis~~ alternis acutis minoribus.

calycis & preli longioribus uniani  
franal foliis glabris caule pilos

*Pseudodictamnus* M. calycium limbo planis villosis, foliis cordatis concavis,  
caule fruticoso. Lin P.V. Hort Cliff. 312x

*Pseudo-Dictamnus africanus*, foliis subrotundis subtus nidois Rom. hort.  
r. p. 179. t. 96

Hab

*Pseudodictamnus* Dod. pempt. 201

*Pseudodictamnus* *reticulatus* inodorus Benth. p. 22.

Habitat in Anta 5

Rami teretiusculi superne tomento niveo vestiti. Solea petiolarum  
cordato subrotunda e tomento densa crassa, nerva propositum  
subtus et juniora crenata, subtus venoso subrugosa. E radi-  
mente ramulorum in axillis. Calycis multiflori explanati  
si dentibus omnibus rotundatis alternis minoribus  
involucella fruticosa Torr.