

# Matricaria

1. parthenium M. foliis compositis: foliolis ovatis incis, pedunculis ramosis
2. Tanacetifolium M. foliis inferioribus pinnatis superioribus pennatis: calicibus lanceo  
latis serratis, pedunculis ramosis corymbosis
3. prostrata M. foliis simplicibus ovatis dentatis, pedunculis lateralibus uni floris  
ramis decumbentibus
4. suaveolens M. receptaculis conicis, radiis deflexis, squamis calycinis margine  
aequalibus
5. Chamomilla M. receptaculis conicis, radiis patentibus, squamis calycinis mar  
gine aequalibus
6. argentea M. foliis bipinnatis pedunculis solitariis

Chrysanthemum a fructu enagellarum est lei: Fus. spec. Matricaria

prostrata Madriana foliis obovatis subincanis dentatis, <sup>caulis</sup> pedunculatis <sup>caulis</sup>  
laetibus unifloris ramis decumbentibus.

Madriana prostrata Sw.

Habitat in America meridionali non Rorh. n. 11

Caules herbacei ramosi decumbentes lanati folia obovata in  
petiolum attenuata angustilana basi versus integerrima  
dente periclym sublanata denticula nuda subplicata. Pedunculi  
ad latus folii, saepe supra medium folio lineari, folio longiores  
flores matris suas. minoris foliola calycis lineari lanceo  
lato. facies verb. nodiflora

punctata Martiana

*Leucanthemum orientale palustre chrysanthemifolium Tanacetii*, odore Tournef

Cor. pag

Habitat. in Armenia herb Turf.

Caulis erectus, glaber, angulatus, sa mosus, pedalis. Folia sessilia, pollucana, pennata  
trifida: penna alterna, lanceolata, inferiora minora, crassa, subtus punctata  
Pedunculis terminalis, striatus, uniflorus. Flores magnitudine Chryf. Leucanthemi.  
Calycis foliola margine fusca

absinthoides Matricaria

La Maritima

Habitat

Herb. La Maritima

Caule herbaceo, erecto, ramoso, villosus, subanascens. Folia infima petiolata, superiora sessilia, pinnata: pinnae lanceolatae, integerrime incanae; superiora lanceolata, indivisa, integerrima. Pedunculus terminalis, striatus, uniflorus. Calyx villosus. Corolla ut in Matricaria odora absque margine fusco

Matricaria

Matricaria orientalis Tanacetifolia incano et villosa flore parva Thunberg  
Cor.

Habitat in oriente. herb. Thunb.

Caulis adscendens, pedalis, simplex, villosus. Folia radicalia, petiolata,  
superiora pauciora, sessilia, pennata: penna sessilis, pennatifida, semipolli-  
cariis, inferiora minoribus: lacinis lanceolatis, acutis, integerrimis vel  
vix uno alterove, inciso villosis superne, uti pedunculis tomentosis. Pedun-  
culi superne 3, uniflori.

1 Parthenium Matricaria foliis compositis: foliulis ovatis incis, pedunculis ramosi L. S. V. pag  
774. Fl. Dan. t. 674

Matricaria Parthenii 1 species Kunz.

Matricaria Luyd Dod. pempt: 35.

Matricaria vulgaris s. sabwa Bauh. Pin  
Matricaria vulgo in p. parthenium Bauh. h. 3. p. 129.

Matricaria foliis pinnatis, pinnis semipinnatis acutis dentatis, laciniis obtusis  
Habitat in Europa cultis, ruderatis 4.

floribus umbellatis  
Hall. h. n. 100

+  
flosculosus. Matricaria

Tota glabra. Caulis erectus striatus ramosus. Folia pedicelata pinnata: pinnis  
ovatis incis basi acutis extrorsum dilatatis: suprema obovata incis. Pedunculi  
ramosi terminales, in ramis saepe simplicissimi. Pedicelli simplices supra

7 Folia calycina linearia medium folio strato, apice parum crassiores. 2. 3. differ radio nullo

+ Habitat in Europa cultis, ruderatis 4.

2 Tanacetifolia Matricaria inferioribus pinnatis superioribus  
ramosis corymbosis  
Matricaria orientalis, Tanacetifolia incana straloso, flore parvo Tournef  
Matricaria <sup>cool. pag. 37</sup> parthenium? Forst. Bot. pl. Arab. n. 514.  
Habitat in Oriente, Arabia

Habitus Parthenii. Caulis erectus, sulcato angulatus; villosus, subnervosus.  
Folia infera sessilia lanifolia, ~~interdum~~ <sup>interdum</sup> ~~infera~~ <sup>infera</sup> pinnata suprema  
pinnatifida: <sup>Pinnae</sup> ~~lacinae~~ <sup>maxima</sup> extrema oblonga inciso lobis serratis: pinna latera  
suboppositi: tenui, usque ad basin rachidis, lanceolata serrata dentata, acuta.  
Pedunculi versus summum ~~se~~ <sup>ramosi</sup>, fastigiati bis vel ter divisi  
foliolum lanceolatum ad ramificationes. Calyx globosi subullosi.  
Flores Matr. Parthenii duplo minores: radio albo.

Diversa omnino a Parth

83 Synonym. Tournefortii dubium cum ad Chrysanth. inodorum refertur a Vaillant

5. *argentea*. *Matricaria* foliis bipinnatis, pedunculis solitariis L. Hort. Cliff. 415\*  
*Chamomelum orientale incarnum, millefolii* foliis Tournef. Cord. 37.  
*matricaria monoleucanthemos, foliis argenteis plerumque conjugatis* Vaill. art.  
1720. p. 369.  
Habitat in oriente.

non vidi



3. *suaveolens* Matricaria receptaculis conicis, radiis deflexis, squamis calycinis marginibus aequalibus

*Chamomelum* L. S. V. pag. 774

tenuis incisum, foliis floribus deorsum proteris: umbone scituberante,  
suavis olens Cypari Hort. Cathol. suppl. 17.

Matricaria Eucanthemos annua suaveolens, chamomeli folio, ovario albican-  
te Linn. Vaill. Paris. 1720.

Habitat in Europa O

~~Receptaculis~~

similis chamomella ut agra distinguitur forte non nisi varietas

radiis deflexis minus nota bona cum <sup>quod</sup> communia habet cum officinis, omnes enim radii vespere  
seram deflectunt ulterius inquirenda nota non nota dantur praestantiores

4 Chamomilla matricariae receptaculi ionici, radiis patentibus, squamis calycinis margine  
aequalibus L. S. V. pag 774. Poll. h. 815.

Chamomelum Partheni 3 species Brunf.

Chamomelum sylvestre Dod.

+ Chamomelum vulgare f. leucanthemum Dioscoridis Bauh. Pin. 135.

+ Anthemis vulgare Lohel. Ic. 770

7 Habitat in Europa agris cultis &c.

Caulis sesqui pedali erectus, glaber striatus, ramosus. Folii sessilia, pollicaria, bipinnata  
pinnis alternis multifidis: laciniis subtus setosis, glabri. Pedunculis ramosis  
et caulem terminatis solitariis unifloris. Solis lobis calycinis margine serrato aboque fissis

7 matricariae foliis planis capellanibus, foliis duplicato-pinnatis, pinnulis lan-  
ceolatis bifidis trifidisque Hall. h. 1161.

*Chamomilla Matricaria*

prostrata Mart. ? foliis simplicibus ovatis dentatis, pedunculis lateralibus unifloris;  
ramis decumbentibus.  
Habitat in Pusasco.

descriptis inter americanas invenitur