

Melaleuca

aequatica Mel foliis cordatis acutis ^{subtus} ~~venulatis~~ ^{venulatis} lobis, caule tetragono hirsuto,
paniculis terminalibus diffusis

Melastoma aequatica foliis cordatis, crenatis; supra hirsutis, ferrugineis, ^{subtus}
lobis; floribus albis, paniculatis Aubl. Fl. Gu. 1. p. 430. Tab 169

Melastoma aequatica foliis quinque nervis cordatis acutis crenulatis, superne
hirsutis ^{subtus} lobis; paniculis terminalibus bichotomis diffusis
Schw. prodr. p. 73

Habitat in ^{Gamaica} Surinamo, Guiana ad ripas fluviorum &
^{bis in pedales} ^{dentis}

Caules plures erecti, tetragoni, hirsuti, purpurascens, ^{subtus} ^{ovata} pilis ferrugineis hirsuti

~~superne ramosi~~ ^{superne ramosi}. Folia petiolata remota, ^{quaque nervis} ^{subtus} ^{glabra} ^{pellidiora} ^{transver}
caulis superne ^{trijidis} ^{obsoletis} pilis ferrugineis adpressis, ^{et areolata} ^{subtus} ^{glabra} ^{pellidiora} ^{transver}
sunt nervosa. ^{panicula} ^{terminalis} ^{diffusa} ^{unicula}

panicula terminalis ^{diffusa} ^{unicula} ^{capit}
parvas capellares dichotomi. Flores petiolati pedicellati in dichotomia
pedicellis ultimis uniservi. Bracteae petalae ad duriferas et binae parum
infra flo. Calycem. Laciniae calycis lanceolatis flores octandi

Calycis ^{fructu} ^{adnatus}. Semina receptaculo ^{centruli} ^{affixa} ^{hinc}
forte potius ^{phexica} ^{prospitem} ^{cum} ^{fructus} ^{capellari} ^{est} ^{offerunt}

^{one} ^{de} ^{S. Thom}
aequatica Aubl. foliis subcordato-ovatis acutis venulatis quinque nervis glabris
racemis axillaribus ramis dichotomis

armillari Melaleuca

Smith. Linc. Transact. 3. p. 277.

metropidiosi armillari Calycis fruct. perisperm. subgloboso crasso edent.
tulo Gort. de fera. tab. 34. fig. 5

non vidi

nodosa M

Smith. Lin. Transact. 3. p. 276

metrosideros nodosa calycibus aggregatis sphaericis edentulis
glaberrimis Gortn. De sem. Tab 34. fig 6

nonardi

attenuata M. foliis lato lanceolatis glabris attenuatis racemis
axillaribus solitariis floribus digynis
an malpighia nitida Cavendish.

Primi Verticis glabri. folia petiolata opposita 4-5 pollicia
utroque ^{attenuata} acuta ~~extensa~~ attenuata per quipollicem lato
utroque glabra integerrima obsolete venosa supra vix reti-
da. petioli unguiculati ^{elongati}. Racemi axillares foliis dimidio
breviores oppositi erecti. pedicelli suboppositi distantes
basi breviter.

a nitida tanquinii differre videtur foliis acuminatis acuto
suo obtuso stylo duplici nec unico uti et credo sicum
cum pictura Schumacheri.

venosa mea an purpurifolia her

Canescens M. folio^{bi} pinnatis septempugis petiolis pedunculisque axillaribus quaternis
tomentosi, floribus fasciculatis

Habitat in India orientali

Rami teretes. Ramuli villosi tomentosi uti petioli. Folia juniora subtus
peduncululi incani pinnis 20 utraque lineam glandula nulla Calycis
ad centem vix villosi. Peduncululi ebracteati

Acacia non spinosa Cheerae Malabaricae Plukh. Mant. 1. tab. 324 fig. 2.
an Acacia ~~non spinosa~~ Ind. orientalis folio paucis, angulis
canugine ferruginea villosi Plukh. al. 2. amalt. p. 2.

angulata. Mel. foliis lanceolatis sparsis trinerviis mucronatis
mucrone reflexo, spicis axillaribus subgemmatis ramis an-
gulatis.

Habitat -

in fide Thunberg.

Rami glabri. Folia subpetiolata subsensu nervis 3 bus
validioribus, 4-5 pollicibus. Spicis 2. subsessilibus folio-
ris pro brevioribus. flores utroque gemini parvi

virgata M. foliis oppositis linearibus - Canaliculatis enerviis, umbellis terminalibus

Lin. Suppl. p. 343.

Leptospermum virgatum T.

Myrtus amboinensis Rumph. amb. 2. p. 77. t. 10.

Habitat in Nova Caledonia

Thymifolia M. foliis ellipticis - lanceolatis enerviis ramulis
floriferis brevissimis paucifloris, filamentis medium usque
ramosis Smith Lin. Trans: 3. p. 270
Habitat

non vid.

Linaria folia M. foliis linear-lanceolatis trinerviis subtus
multi punctatis, ramulis glomeris terminalibus
laxi, filamentis pennatis Smith. Lin. Trans.

B. p. 270

Habitat

non vidi

Hypericifolia M. foliis ellipticis oblongis uninerviis, floribus
confertis, filamentis longissimis lanceatis apice radi-
ato multifidis Smith. Lin Trans 3. p. 279.
Habitat

non vidi

genistifolia M. foliis sparsi lanceolatis mucronatis trinervi
ribus multijugatis, ramulis floriferis sermua
libus laxis, filamentis apice radiato multifidis
Smith. Len. Trans: 3. p. 277.

Habitat

non ord.

ericifolia M. foliis sparsi oppositi ve Cuneobus enervis
sub recurvis muticis, flombus tuberculatis vespis apice
dem ramulorum confertis Smith Lin Trans 3. p 276
Habitat

non vid.

Stypheloides M. foliis ovatis mucronato-pungentibus multi-
nerviis, floribus lateralibus, dentibus calycinis parvis
mucronatis Smith h. Trans. 3. p. 275

Hab. Port Jackson

non vidi

*Launna m. foliis obovato-lanceolatis uninerviis, pedunculis
axillaribus dichotomis pubescentibus. Smith. Lin. Trans.
3. p. 275.
Habitat in nova Hollandia*

non vidi

viridiflora M

Smith. Lin. Trans 3. pag. 274
Melaleuca viridiflora

gestn. Tab 35
Melaleuca leucadendron B. Lin. Suppl.

Habitat in novo Hollandia insule et nova Caledonia

non videri

