

Melampyrum

1. crispatum M. fructis quadrangularibus, bracteis cordatis complicitis dentatis imbricatis
2. arvense M. fructis conicis laxis: bracteis dentato-petaleis coloratis
3. nemorosum M. floribus secundis lateralibus: bracteis dentato-petaleis, summis coloratis sterilibus, calycibus lanatis
4. pratense M. floribus axillaribus secundis, foliis lanceolatis basi attenuatis
5. sylvaticum M. floribus subsessilibus secundis, foliis lanceolatis basi subcordatis

Linnaeus Melampyrum

Habitata Carolina herb. La Martini

americanum Melampyrum

Habitat in America boreali. Nutt.
Caules semipedales.

habet

Enflatum M. species quadrangularibus, bracteis cordatis compactis denticulatis im-
bricatis Kun. t. V

Melampyrum luteum linearis folio Bauh. prodv. pag. 112.

Melampyrum luteum, angustifolium Bauh. pin. 234

Melampyrum angustifolium Enflatum Plehn. alm. 249. T. 99. fig. 2

Habitat in Europa borealis affinis O va

Caules erecti, simplicissimi vel interdum ramis duobus vel quatuor
oppositis simplicissimis. Folia opposita, vix petiolata linearis
canaliculata, attenuata integerrima glabra vix venosa, sesquipedali.
Cana. Spica terminalis sesquipedali. Bractea ovata serrata
subnuda unguiculata glabra purpurea floe longitudine florum

arvense M. spicis conicis catis. bracteis dentato-fetacis coloratis An. P. V.
fl. Dan.

Triticum vallerinum Dod. pempt. 541.

Melampyrum lanuginosum boeticum. Bauh. pin. 234.

Melampyrum purpurascens coma Bauh. pin. 234.

Habitat in Europa agros O

Caules plerumque simplicissimos spithameos pubescentes. Folia
opposita, sessilia, linear-lanceolata acutius attenuata subtus
habitu scabra pollicaria villosa suprema floralia basi dentata
dentibus tribus vel quatuor semper unguis ulantibus. ~~bracteis~~
pallide purpureo flore breviori.

basi dentato incisio fetacis

remiosum M. floribus secundis lateralibus: bracteis dentatis summis coloratis sterilibus,
calycibus lanatis Lin. t. V Fl. Dan. 305

Panicaria sylvestris L. Clus. hist. 2. p. 44.

Melampyrum comae conica Bauh. pin. 234.

Habitat in Europa borealis nemoribus O

Caulis erectus prostratus pubescens superne ramo uno vel altero.

Folia petiolata opposita, superiora alterna, lanceolata vel ovata
lanceolata, integerrima, venosa sesqui-pollicia vel ultra subtus ^{partim} pilosa
velis varioribus, inferiora floralia basi dentibus duobus vel tribus
setaceis. Bracteis inferioribus vix et superioribus coenulis violaceis
figura foliorum, altera opposita subtus pilosissima basi denta
to incisive dentibus ^{se} in setam attenuata, & ceteris diffantes opposi
ti sesquipedales

bracteis dentatis incisive
setaceis

pratense M. floribus secundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis,
corollis clausis Lin. t. V

Melampyrum luteum latifolium Bauh pin. 242. 234

Habitat in Europa borealis proles sicca O

Simili M. sylvatico. Differt floribus spicam non formantibus
foliis in petiolum dependentibus

foliis lanceolatis pet. basi attenuatis floribus axillaribus

nondum vidi

Sylvaticum M. floribus secundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis,
collis hiantibus Lin. Spei: pl. 243, fe. Dan. tab. 145

Melampyrum latifolium, floribus parvis luteis Cels. upp. 32. pl. hupp.

²⁴⁰
Habitat in Europa borealis sylvis O

Caulis erectus, ramis oppositis simplicibus, tetraedris. Folia
subsiliata attenuata glabra integerrima, floralia basi den-
tata. Flores in axillis superioribus in fenore remotiore, bracte-
breviori oppositi brevipedunculati.

foliis lanceolatis basi cordatis subpetiolatis, floribus subspeca-
tis

eadem, ni fallor, e Canada mes. de Montin