

Melanoma

Dichotoma melastoma foliis cordato-ovatis crenulatis pilosis, pedunculis axillari-
bus terminalibusque Dichotomis

Habitat ad Rio Janeiro Dombey herb. Muscovit

Faciis melastoma aquatico. Caulis erectus, obtus. Tetragonus, purpureo cinis,
scaber, pilis griseis apice glandulosis aspersus, ramosus. Folia petiolata, bipolli-
carias, acuta, quinque nervia, proter nervos marginales, venosa, utraque
pilis distantibus adpressis, subtus pallidiora. Petioli hirti. Pedunculi et alii
foliorum ramorum axillariem, apice hirti, bis dichotomi. Folia parva, ob-
longa, subpetiolata ad basin ramorum, et duo minuto in pedicello. Flores pedicel-
latis. Calyx subhispidus: dentibus quinque f. facis. Stamina ¹⁰ ~~septa~~.
Anthera acuminata, in ferne purpurea, acumine albo. Calyx fructu
non adnatus. Stamina ~~tantum~~ ¹⁰ sive ad breviora La Mark

Melastoma dichotoma; herpidula foliis cordatis, acutis, denticulatis;
panicula foliosa ramis lateralibus dichotomis. La Mark Dict. bot. Engel
4. p. 41.

Stamina 10. quinque breviora La Mark

Laxa Melastoma foliis cordatis ovatis rugosis serratis hirtis, pedunculis terminalibus

duobus, calycibus hirtis

Habitat in Pen. Herb. Guispei 5

Caulis fraber, hirtus, ramifus, inferne teres, superne tetragonus. Folia petiolata, sesqui pollicaria, aequaliter serrata, utrinque fatis adpressis flavescens ^{gris} ~~gris~~ subhis hirsutiora, pal lidura, utrinque venoso-rugosa, quinque nervia, proter nes vos marginales, acuta. Pedunculi ex apice, gemini, bifidi, elongati, hirti, folium seipse utrinque addivisur. Rami triflori. Flores pedicellati: ^{calyce} pedicelli et calyces flavescens ^{gris} hirti, quinque dentati dentibus ovatis. Flores magni rosei. Stamina 10.

Melastoma laxa, pilosa foliis cordato-ovatis serratis rugosis; paniculis laxis, foliosis, terminalibus La Mark Bot. Encycl. 4. p. 41

Capparea melastoma foliis cordatis subtus flavescenti-tomentosis, pedunculis
terminalibus compressis trichotomis calycibusq; hirsutis

4 Habitat. herb. Turc. Palma ignota. Herb. Turcici: 5

Rami tetragoni, uti petioli, pedunculi calycisq; setis glandulosis hirsuti. Folia petiolo
tra, 5 que vel 6 pollicana, acuminata, quinque nervis, præter nervos marginales,
supra scaberrima, setis flavis adpressa, subtus flavescenti-tomentosa, venis sub
rectis. Petiulus alter 3-4 pollicari, oppositus sesquipollicari. Pedunculi ex
cepti terni, trichotomi, ramis præter hujus ultimi dichotomi, cum flore sessile
in dichotomia. Calyx dentibus quinque subulatis

4 Melastoma capparea; foliis cordatis, acuminatis, subtus tomentosis; panicula
divaricata, terminali; calycibus ventre hirsuto subciliato La Mart.
Det. Encycl. 4. p. 42.

papillosa Melastoma foliis subcordato-oblongis rugosis supra tuberculatis
subtus subtus villosis, thyso terminali

Melastoma papillosa; foliis ovalibus, subcordatis, crenulatis, septem
nerviis, rugoso-papillosis; paniculis terminalibus, vix bracteatis
Ro. Math. Diet. Encycl. 4. p. 40.

Habitat in Pem. Herb. Guisici

Rami inferne teretes, superne compresso-tetragoni, uti petioli;
nervi foliorum subtus, pedunculi calycisque rufo pulverulento
tomentosi. Folia petiolata, tripollicana, obtusa, crenata, quinque
nerviis, praeter nervos marginales, valde rugosa, subtus e villis son-
diida flavescensibus tomentosi. Petiolus alter sesquipollicia-
ris, alter semipollicaris. Thyrsus vel racemus decompositus
terminalis, erectus: pedicelli ultimi triflori, pulverulenti,
hispidi. Flores sessiles. Calycis parvi, tubinatis. Petala squae
subrotunda, extus flavescens tomentosa. Stigma capitatum.

larosa melastoma ^{complanata} foliis ovato-oblongis glabra ^{seus glabris} sup. denticulata glabra supra foveolata

Habitat herb. La Mart

Folia ovato-oblonga, quinque nervia, 4 pollicaria, glabra, foveolata nervi venis que perforatis, acuta denticulata

favosa Melastoma foliis ovatis-oblongis denticulatis glabris supra foveolatis,
corymbis sessilibus

Melastoma favosa; foliis ovatis, subdenticulatis, basi emarginatis,
subtus cellulosis, quinque nervis; panicula terminali corymbosa La
Math. Bot. Encycl. 4. p. 47.

Habitat in St. Domingo Herb. La Martii et Thourii 5.

Rami teretes, glabri. Solia petiolata, 3-4 pollicaria, interdum subcordata
oblonga, acuta, avenia, quinque nervia, nervi sonoque ~~appropinquat~~ fuscis
absque nervo marginali, supra bullata, nunquam scabra: Venella pulve
rulenta. Corymbi terminaliter, decompositi, ramis trichotomis, glabris,
tetragonis-compressis, patentibus. Flores pedunculati. Bractea
sub flore rotundata, angulata. Calyx truncatus

Senecio
Argentea Melastoma Senecio, foliis cordatis oblongis sessilibus integerrimis Thyrsi
terminali

Habitat ad Res Janensium Commerf. herb. Tuscani

Rami aculeati tetragoni, uti folia et calycis molliter ^{e flavo, pilis longis} florescentia tomentosi
^{adpressis} ^{subulatis} ^{& semiamplexicaulis} Senecii. Pteleo bi-³ / In pollicaria, quinque nervia quatuor proter & interna
que brevis pino, ⁴ ⁵ et quatuor in fra apicem sensu marginem evanescentes
obtusa. Racemus terminalis; pedunculi ^{bis} ^{duplex} triflori. Flos intermedius sessilis
Calycis ante ^{semi} ^{pollicis} ^{longis} explicationem pteleo ductus oblongi globis in volucribus,
oblongi: lacinae quinque ovato.

Melastoma argentea; foliis cordato-ovalibus, sessilibus integerrimis,
pinnis-argenteis; panicula terminali; calyce clavato La Mart
Det. Encycl. 4. p. 45

Senecio Melastoma Senecio, foliis cordatis oblongis sessilibus integerrimis
~~thyso terminali~~ racemo terminali, pedunculo bis dichotomo

Melastoma argentea: foliis cordato-ovalibus, sessilibus, integerrimis,
Senecio-argenteis; panicula terminali; calycis clavato. La Mark
Dict. Encycl. 4. p. 45.

Habitat ad Rio Janeiro Commerson Herb. Lusit. 5

Rami acuta tetragoni, subalati, uti folia calycis a pilis longis
adpressis mollibus flavescens Senecioi. folia semiamplexicau-
lia, bisive tripollicaria, quinque nervia, præter nervi duo mar-
ginales, nervi 4. laterales infra apicem versus marginem eva-
nescentes, obtusi. Racemus terminalis, pedunculi partiales bis
dichotomi; pedunculis triflori, flore intermediis sessili. Calyx
semipollicaris, ante expansionem foliatis duobus oblongis gla-
bris involvatis, oblongis: lacinis quinque ovatis
Inflor. cæca ut in granulosa.

infloresc.

+

involucrata Melastoma

Habitat in America herb La Marti

Rami, uti tota planta glabri, superne Verdes, fusci. Folia breviter petiolata
pollicaria, oblonga, trinervia, avenia, coracea, nitida, ^{semper} serrulata basi
integerrima obtusissima emarginata. Pedunculi ex alii supremi cum ramu-
lo alterius exescente, uniflori, pollicares. Involucrum penta phyllum
foliosum, sub calyce, ante explicationem glabro-angulosum, ^{foliosum} petiolatum, ^{oblongo} uniu-
⁴ ^{subtus} ^{pallidum} ^{nerve} - Calycis lacina oblonga, quinque, acuminata, magna.

semulata Melastoma foliis ovato-oblongis semulatis subtus subtus racemisque
simplicibus sed ferrugineo pulverulentis, spicis bipartitis

Habitat in Guana Richard &

Rami superne compressi, ^{uti petioli} ferrugineo pulverulenti. Solia petiolata

4. pollinaria, altero quadruplo minore, obtusiuscula cum mucrone, ⁴
4. basi saepe emarginata serratura obtusiuscula, fusciscentes, altera parum minoris versus

basi integerrima, sive nervia, praeter nervos marginales, supra
nervos ut transverse nervosa, subtus subcostata, juniora utraque
ad utriusque tantum subtus ferrugineo pulverulenta, supra glabra.

Pedunculus terminalis, solitarius, foliis brevior, angulatus. pedicel-
li oppositi, bractea subulata sub singulo pedicello, patens ungui-
culata, alia ovata acuta flores ante eorum expletionem spicem
tam involucenter, decidua.

Desandrea Richard.

Cinerea Melastoma foliis ovato-oblongis integerrimis supra glaucis subtus flavigi-
neis ^{flavescenti}

Habitat herb. Richardi Dupuis Capense

ramiter des, Anantoti, unani. Folia petiolata, ovato-oblonga, sequipolli-

cania, acuta, integerrima, trinervia, avenia, supra glauca, subtus fla-
vescenti cinerea, vellea vix conspicua. Pediculi terminales tetragonij
vescente cinerea, vellea vix conspicua. Pediculi inferiores trifidi, pediculi triflori. Germen
cylindricum, inermis. Petala 5 que. Stamina 10. Bractea oblonga-subglobu-
osa, uncinata, magnitudine pili calycis unicolata coronata

venis
transversis
ultra

globifera Melastoma foliis ovato-oblongis attenuatis serrulatis, rariis paniculatis, ramis ^{nodosis}
melastoma globulifera; nodosa, ramis tetragonis, glaber n. maj. foliis petiolatis, ovatis, acuminatis, serrulatis, quinque nervis; ramoso ab extrema dictotomia
~~Act. f. h. v. floribus pusillis, subglobosis~~ Act. Bor: hist. nat. Paris. t. p. 109.

Habitat Cayenas herb. Richardi 5

Rami tetragonis, glabri, venos, nodosi. Folia petiolata, pollicaria, ovata
~~oblonga, attenuata, serrulata, subtus pallidiora, venosa. Petioli unguis~~
laevi. Panicula terminali, racemosa. Pedicelli triflori. Flores pedicellati, albi, parvi, globulosi. Calyx 5que dentatus.

villosa Melastoma hirsuta, foliis ovatis integerrimis ^{sub}sessilibus, caule her-
baceo

Melastoma villosa, foliis sessilibus, ovatis, acutis, floribus corymbo-
si Aubl. - fl. Guian. p. 490. t. 168

Habitat in Guayaquil Casenna herb. La Martini O

Caulis tetragonus, uti tota planta hirsuta. Borde superne cinereo
laetis. Folia semipollicaria. Panicula terminalis: rami oppositi
dichotome divisi. Flores pedicellati. Bractea minuto superne in
pedicelli.

~~Villosa Melastoma hirsuta, foliis ovatis - sessilibus~~

myricoides - Metastoma foliis oblongis glabris serrulatis, racemi compositis, pedun-
culo ultimi ^{flor.} trinerviis

Habitat in America herb. Surin. no 733.

Rami tetragoni, glabri, ad folia nodosi, ciliati. Folia petiolata, opposita
lesquipollicaria, utrinque glabra, trinerviâ, ^{propter nervos marginales} supra laevia, attenuata. Pe-
dunculus communis angulatus, glaber. Panícula longitudine folii. Erectus magni
tudinis Conandri. an octandra?

nivea Melanoma foliis cordatis denticulatis puberis ramis calycibusque inaequalibus, racemo terminali simplici, pedicellis trifloris

† Habitat in Antillis herb. Guaf. Guisiori
miari

Rami teretes, uti petioli pedunculique calycisque inaequalibusque nigri apice glauco
Dulopi hospedi. Folia petiolata, 3-4 pollicaria, patentia, cordata, parum
acuminata, venosa, supra scabrae pila sive flavescens adpressis, puberis
tomentosa, quinque nervia, proter nervi marginales. Racemus terminalis.
Pedunculi pariter oppositi, distantes. Bractea subulata, parva, ad basin pedun-
culorum. Flores 3. laterales pedicellati, intermedius sessilis. Calycis laciniis
quinque subulata.

† Melanoma nivea; foliis cordatis, acuminatis, denticulatis, puberis tomento
so-niveis; panicula terminali; caule hispido La Mark Dist. Enigt. 4
pag. 42

La Mark Donny urper un 10
nitenti

ganocarpa Melastoma foliis oblongo-ovatis acuminatis crenatis ciliatis glabris, floribus ca-

^{pitatis racemosis}
Habitat in America herb. Biblioth. Lugd.

Rami tetragoni, glabri. Folia petiolata, bipollicaria, oblongo-ovata, acuminata un-
guiculari terminata, ciliato-fimbriata, quinque nervia, utrinque glabra, margine
velloso-ciliata, venis emarginatis, basi integerrima, levia. Pedunculis
terminalis, erectis, villosis, cili partialibus. Flores glomerati in capitulis. Capitula in
racemo composito. Pedunculi partialis et pedicelli distantes, patentes. Capitula pi-
so duplo majora. dimittit magnitudinis pisi, coerulea.

quadrupli
nerve Melastoma foliis lanceolata ellipticis villosis, racemis simplicibus, floribus
^{capitata;}
~~Tamouta~~ ~~herb. antiqu.~~ Biblioth. Lugd.

Habitata America. Tamouta in herb. antiquo Biblioth. Lugd. Batavorum &
Solia Tripollicana, lanceolata elliptica, petiolata, quinque nervia, omnes supra
basi, duo inferiores oppositi, villosi - ferruginea, uti rami superiores, supra villis mi-
nutis, pubes fovea canescentia. Racemus terminalis, simpliciter. Flores 3-5. sepales in
4 minuti. capitula. Calyces flava villosi. ~~Stamina~~.

Culcnifolia melastoma glabra, foliis cordato lanceolatis elongatis coriaceis integerrimis, pedunculis axillaribus aggregatis brevibus semis floribus

Habitat in Cochinchina, in colis Hoa Madela dicto De l'Herb. De l'esset 3

Tota glabra. Rami teretes. Folia brevissime petiolata, 4-5 pollicaria, semipollicem basi lata, sensim attenuata, acuta, trinervia, acuta, nervi transversim nulli. Pedunculi longitudine petioli, vix semiquinque angulati: pedicelli 3, longitudine pedunculi, uniflori basi breviter duo ovato, connato. Calyx cylindricus, medio parum coarctatus, truncatus. Petala 4, oblonga, acuta. Stamina 10

Chrysophylla Melastoma foliis ovato-oblongis, subtus flavis, subsenatis crenis seto-
Vermenatis, pedunculis axillaribus terminalibusque se trifloris

Habitat in Madagascar Herb. Truj. 5

Rami teretes, subarticulati, cicatricati, cortice unereo, juniores flavo-pur-
pures, tetragoni, glabri. Folia petiolato, bipollicaria, subovata, trinervia, sa-
pe absque nervo marginali, remote et obscure crenata, crenis setigeris,
subtus flavo-viridia, utrinque ad nervos punctata remote impressa cum
seta. Pedunculi axillares, solitarii, terminales terni, glabri. Flores
pedicellati. Calyx unicoloratus, glaber, fere unguicularis: lacinae 4,
ovatae, acutae, ciliatae. Stamina 8. Antherae croceae

Melastoma Chrysophylla; glabrum, foliis ovatis, acutis, trinerviis, integris,
subtus aureo-virentibus; panicula terminali. La Mark Dict. Encyclop.
4. p. 50.

glomerata Melastoma foliis ovato-lanceolatis subciliatis subtus ramis que villosis
sunt, & lobis axillaribus glomeratis subsessilibus

Habitat in Antillis herb. Desf. & Martini †

Rami tenues, tetragoni, villosi, scabri. Folia petiolata, bipollicaria, acuta,
trinerviâ, absque nervo marginali, prope basin semipollicem lata, supra gla-
bra, transversim remota nervosa, subtus pallidiora, venosa. Petioli semi-
pollicares, villosi. Flores plures in axillis, parvi. Calycis quadridentati. Stamina 8.

Strigosa
articulata melastoma foliis elliptico-lanceolatis integerrimis nervis ramisque super
ne strigosis

Habitat in India orientali hab. Gus. p. 5

Rami tetragoni, articulati, punctati, cortice griseo, superne et circa articulo strigosi. Folia petiolata, 3-6 pollicana, attenuata, trinervia, proter nervos marginales, supra glabra, lœvia, subtus in nervis et costis strigis remotis. Pedunculi axillares, solitarii, terminalis terni, pollicares, triflori? Calyx glaber, tubo duplo major: lobis rotundatis, 4or, ciliatis, uti petioli glabra.

Juniperus Melastome foliis laniceo latis integerrimis supra glabris nitidis, subtus ramis super-
ne. calycibusque pulverulento niveis, pedunculis lateralibus
Habitat in Tora herb. Gus. et la markii 5

Rami teretes, glabri, grisei, dichotomi, superne subtetragoni, uti folia, ^{subtus} petioli, pedun-
culi et calyces e pulvere niveo tomentosi. Folia petiolata, bi / tri pollicaria, tri-
nervia, absque nervo marginali, supra lano, arenia, subtus transversi nervos
venosa. Pedunculi infra foliacei, plures, semiumguicularibus, quadringidi, unifo-
ri pedicelli calyx 4fidus.

Barmentosa Melastoma folus ovato oblongis acutis nitidis glabris integerrimis
raccemis compositis, caule scandente

Habitat Cajano Auhari

Rami inferne Variales, cortice cinereo, ^{folis, ~~pa~~ nodoso ciliatis} Superne tetragonis, purpurascens, aculeis
armato pulvere minutissimo adspersi. Stipulae petiolatae, 1-2. pollicariae, remotae,
pendentes, acutae, trinerviae, laevissima, subtus remote transversim adro-
sitate nervosa. Racemi terminales et ex ultimis axillis, 1-2 pollicares
patentes. Podunculi ope lentis subpulverulentis oppositi, pedicelli
^{im} inferiores interdum terni; pedicelli oppositi distantes, uniflori. Floris
parvi. Calyx tuberculatus pulverulentus; truncatus. Petalis oblongis. Stamina 8.
Stylus apicem versus sensim parum crassior. Stigmatis magnitudine Coriandri

Melastoma

Habitat Puerto Rico herb. Guaf.

Caulis herbaceus, tetragonus. Rami oppositi, pedales.

Herbo

Cinerea Melastoma foliis ovato-oblongis ⁱⁿ contingentibus, supra glaucis sub
tus racemisque cinereo-flavescentibus

Habitat in Capena Dupuis 5

Rami teretes, tomentosi, viciarii. Folia petiolata, sesqui-pollicaria et
parum ultra, acuta, trinervia, nervi transversa nulli; axillaria, subtus
et sellata vix conspicua cinereo-flavescentia. Pedunculis termina
tis, tetragonis: parvales inferiores trifidi, pedicellis trifloris.
Calycis subglobosius angustus Germea cylindrica Germea cylin
dricum angustum. Fructus oblongus subglobosus, incanus, magni
tudine pisi, calyce unicolato coronatus.

~~*Cinerea* Melastoma foliis ovato-oblongis contingentibus supra glaucis~~

~~Chrysophylla Melast. foliis petiolatis lanicolatis longe angustiore acumi
natis cretate crispis subtus nervis subtus lucida glabris panicula
terminali minuti flora Act. Soc. Hort. Nat. Par. 1. pag. 109
Habitat in Amer. merid.~~

Diversa a Chrysophylla La Martii cui pedunculata termi
natis termi tota flori

Cinsada

Stellata Melastome foliis cordato-oblongis subtus rariusque superne tomentosis, flori-
bus micranosis

Habitat in Antillis her. Desfontainii

Rami dichotomi, inferius teretes, glabri, superne compressi, fuscae ferrugineo, uti folia
subtus tomentosi. ^{reticulata} folia sesquipedalana, obtusiuscula, tri-nervia absque nervis la-
teralibus, secundum nervos longitudinaliter et transversales supra lineata, venella
utrinque pili ferruginei stellati uti calycis tomentosi. Pedunculi in dichotomii
et apice, vix semipollicares, ^{8 line} racemosi: pedicelli quinque, infimi triflori
reliqui triflori. Calycis laciniis quatuor

^{mentum}
Canceolata Mimosa foliis ovato-canceolatis, ^{glandulosa + denticulatis} subtus ramis rarisque compositis ferrugineo pulverulentis tomentosi

Habitat in Centellis herb. Guisani

Rami tetragoni. Scaeva spithamea, attenuata, pollicem longa, triplinervia, nervis marginalibus nullis, remote glandulose denticulata, opposito more plerumque minore, viridi-flavescentia. Panicula supra ferrugineo pulverulenta, statura nuda. Petioli pollicares. Paniculae partiales oppositi, triflori. Clavante ex pliationem bractearum nonnulli linearibus involuati. Calycis denticibus 4. apice purpureis.

Melastoma Canceolata; foliis angustis lanceolatis, triplinervis; margine denticulato-scabris, subtus ferrugineis; paniculis terminalibus La Marti Dict Encycl. 4. p. 43

multiflora Melastoma glaberrima, foliis lanceolatis dentatis, racemis in profolia
eis geminatis subsimplicibus.

Habitat in Antillis herb. Tussac 5

Rami inferne teretes, cortice griseo, superne tetragoni purpurascentes, uti tota plan-
ta glabra, oppositi, ascendentes, venos. folia superne, pollicaria, opposita
triplinervia, proter nervos marginales, obtusa, remote denticulata, basi
versus integerrima. Pedunculi frequentes, plerumque infra foliacei, raro
axillares, utrinque gemini, alter parum longior et magis compositus sequi
pollicari: pedunculi pariter inferiores terni, duo longiores subperflori alter
triflorus. Pedicelli triflori. Flores sessilei parvi. Calyx truncatus, margine
parum si anisus. Petala 4, parva. Stamina 8.

Melastoma multiflorum; glabra foliis lanceolatis, serratis, triples-
vis; paniculis lateralibus, calyce turbinato, subtriplesnervio. La
mark Det. Enycl. 4. p. 35

crotonifolia Melastoma foliis cordato-lanceolatis sessilibus denticulatis subtus to-
mentosis, pedunculis terminalibus trifloris

Melastoma crotonifolia; foliis sessilibus, cordato-lanceolatis, denticulatis
subtus tomentosis; paniculis terminalibus paucifloris La Mart. Det.
Encycl. 4. p. 43

Habitat in St Domingo Herb. Thourin &

Rami teretes, glabri, superne subtriangoni hispidi. Folia perlliania, tripli-
nervia, absque nervo marginali, ovata, versus marginem punctato-clava-
ta, & calviuscula, supra glabra, subtus incana, nervis flavescantibus,
acuta. Pedicelli vix unguiculares. Calyx mucronatus: lacinis quatuor
acuta, margine villosis, ceterum glabra.

Canagoua ~~*Montana*~~ caule superiore ~~villosa~~ foliis floralibus petalisque
oblongis villosis.

Habitat in America boreali herb. Richardi

Caulis prothamnosus, inferne glaber, superne villosus. Squamae inferiores ap-
proximate, minores; superiores parum remotiores oblongae, floralia villosa.

Racemus ante florescentiam nutans. Calycis foliola lineari-lanceolata
8 laciniae inferiores cernuae. Petala oblonga, utrinque villosa

Trichotoma Melastoma foliis ovato oblongis integerrimis, panicula ramis trichotomis

Habitat in America herb. Guss.

Rami dichotomi, inferne glabri, teretes, superne tetragoni, compressi, pulverulenti. Folia petiolata, peltata, utraque glabra, tri nervia, proter nervos marginales, secundum nervos transversales supra lineata, subtus obscure venosa, acuminata. Petiolus alter pollicaris, alter brevior uti folio. Pediculi terminalis ramis patentibus, trichotomis, pulverulenti. Calca magnitudine Bonandi. Stamina 8.

Heterophylla Melastoma hispida, folio altero cordato subrotundo altero oblongo alte
nuato crenatis basi inflato crenatis

Habitat in Peru herb. Fuspei 5

Rami teretes, scabri, e fetis patentibus femineis, uti folia utrinque hispida.
Solum alterum petiolatum, spithameum, valde attenuatum, crenatum
basi versus integerrimum, trinerve, proter nervi marginales altero latera
bases convexiore utrinque coarctata in vesiculo oblongo utrinque: alterum
sessile, pollicare, acuminatum, subquaque nerve; omnia feti ciliata.
Racemuli laterales, brevissimi. Calycis parvi, oblongi, angulati: dentes
4or subulati subpulverulenti.

Melastoma heterophylla; pilosa, foliis oppositis disparibus; petiolis super
ni vesiculososis; paniculis brevissimis lateralibus La Mark. Dict. Encycl.
4. pag 34.

oblongis
plumosa Melastoma foliis cordatis denticulatis villosis, ramis racemisque hirsutissimis

Habitat in Domingo herb. frugosus 5
Rami tetragonis, et pilis densis hirsutissimi. Folia petiolata, inferiora spithamea
super cordato oblonga, quinque nervia, superiora sensim minor tri-nervia,
cordata, attenuata, aequaliter obtuse que denticulata: dentibus bifidis, supra
pilis rufis, subtus griseis, hirsuta, rugosa. Petioli vix pollicares hirsutissimi.
stermi naler Racemi axillares, subcomperti, foliis multo brevioribus. Pedunculi partiales
inferiores spatulati, superiores oppositi, utriusque communis hirsutissimi
bifidi. Calyx parvus, hirsutissimus, pilis inferioribus flavis, superioribus pur-
pureis, quadridentatus (5 quidentatus La Mark sed falso) dentibus subulatis
setaceo hirsutis

Melastoma plumosa: lanuginosa, foliis cordato-ovalibus, acuminatis
crenulatis, calycium villosis bractorum laciniis plumosis La Mark. Det.
bot. 4. p. 31

Catifolia Melastoma foliis ovatis attenuatis verticillatis ferrugineo hirsutis, racemis axillaribus geminis

Habitat in antillis Herb. Fuscoi 7

Rami tetragoni. Folio petiolata, 5-6 pollicaria, opposita minore, patentis prima; quinque nervia (excepto nervo marginali) subtus pallidiora. Petioli sesqui pollicares. Racemi gemini, folio breviores: pedunculus alter longior, compositus, alter brevior simplex: pedicelli triflori. Calyx 4 dentatus. Petala quatuor.

Diversa a *Catifolia la Martii*. Sequens synonymam speciem mihi addidit *aral*, *lat. amer. viti. Dubrosum*.

Grossularia fructu non spinoso, mala bathni foliis longa et nuda lanugine hirsutis et Sloan hist. 2. p. 85. t. 177. fig. 2. 3

an hista ha confer danna adhuc cum umbra

reperi Melastoma ^{glabra} foliis ovatis crenatis, pedunculis ^{ternis} trifloris, caule repente herbaceo

Habitat in India orientali herb. 4 usq.

Caulis herbaceus, subdichotomi, tetragonus, strigis raris adpressis. Folia petiolata, semi-
pollicaria, obtusissima, trinerviâ, proter nervi marginales, obtusa, obplata cre-
nata, supra versus marginem et in nervis subtus strigis rarissimis, coeterum
glabra. Petioli semiunguiculares, strigosi. Pedunculi tres, terminalis uniflo-
ri, intermedius longior primum florens. Calyx unicoloris, strigosus, quin-
que partitus: dentibus subulatis ciliatis. Petala ciliata

Annulata Melastoma folius cordato-oblongis integerrimis glabris, pedunculis
axillaribus trifloris

Habitat in Java? herb. Gussonei 5

Rami subtetragoni, superne griseo pulverulentis, ad insertionem petiolorum
annulo nodosi. folia petiolata, bipollicaria et ultra, cordata oblonga, integerrima,
trinerviâ, absque nervo marginali, utrinque glabra, supra vix transversim
venosa, subtus pallidiora, acuminata, juncea utrinque tomentosa. Petioli se-
miunguiculares. Pedunculi axillares, pollicares, triflori, inani. Flores pedi-
cellati, bractea linearis ad basin singuli calycis. Calyx oblongus, subhispidus.
Laciniae 4 or lineares. Anthera 4 or.

Caciat *Melastoma*

Habitat in Guana herb. la mark

Solia petiolata, sesquipedalia, ovato-lanceolata, subtriplexis, proter nervis
super marginaler, supra loria, remote nervis venosa, subtus reflexantia, sub
venosa, utrinque glabra, integerrima. Flores non vidi

~~Etiam~~ flores et inflorescentia non sunt cognita. *Melastoma*

L. m

^{offinis}
farruca Melastoma herb. Lus.

India orientalis

Rami superne pubescenti, rursi. Folia ovata, acuminata, integerrima, trinerviâ, subtinerviâ, nervi marginales nulli, venosa, utrinque glabra. Pedunculi axillares, plures, breves, incani, uniflori. Bractea dentata 4. coccinata, magnitudine pisi, ut videtur uniloculari, polysperma, seminibus irregulanibus
ex potius Myrtus in Diction. bot. La Mart. descriptus, non vero sub Melastoma.

Spinosifima Colletii Guss. gen. pag. 300
~~Habitat in Brasilia~~

non vidi.