

Melastoma

Secundum sive nervosa

M. striata non differre videtur a pyramidal. Eriyel. Peduncul. et calyce
res. videntur uti nervi et costae

M. farrago. L. Madri
an potius myrti species

Melastoma Seyron herb. no 704. diversa ab altera, Petala 4^{or} cum umbra a
la. Manibus confunditur

~~brachyanta~~

Mollispermum M. foliis ovatis acutis integerrimis villosis, ramis teretibus, floribus terminalibus caputatis involucriatis ~~capitatis~~

Habitat in India orientali. In Dahl 5 uti petali

Rami inferne teretes apice subtetragoni & stygi densissimi ad presis
Cane femineas canescentes

Folia petiolata opposita bipolliciana quinquenerviâ proster
neris marginales utraque & villis adpresis mollia,

Petali femiunguiculari

Flores terminales subsessiles teroni majori quam in omnibus reliquis
speciebus. Involucra hexaphylla folioli lanceolatis longitudi-
ne calycis villis densis ad presis gressis nitentibus uti calyx
secta.

Calyx polliciani lacinis quinque lanceolatis utraque tenere
gressi pili ciliis villis longioribus

Petala 5 calycis duplo longiora obovata margine ciliato
stamina 10 petalis breviora

~~annulata~~
~~involucrata~~

Mel. foliis ovatis acutis integerrimis subtus molliter villosis capitulis
lateralibus in involucrio caule erecto subalato

Habitat in Insula Francie Thoury

herpetis

Rami tetragoni, angulis protuberantibus ~~pilosissimis~~. Folia petio lato
sesqui vel quadripollicaria, quinque nervia supra pilis adpressis
subtus pallidiora magis villosa mollia. Petioli herpetis. Stomi ex axilla
ramulorum in Capitulum involucrio collecti sespites. Involucrum
tetraphyllum: foliolis sessili amplexantibus ovatis acuminatis
pilosius duobus minoribus, Calyx annulo tribus pilosis cinctus cor-
num glaber. Petala 5 cuneolata

Scabrosa Mel. foliis denticulatis quinque nervis cordatis scabris subtus tomentosis, ramis
tomentosis villosis Lin. L.V. p. 403.

Melastoma puberula, foliis cordatis scabris minutis sine denticulatis reti-
culatis, ramis minoribus alantibus Brown. Jam. 219. t. 24. fig. 3.

Habitat in Jamaica,

spicata

nervosa

~~sericea~~ Melastoma foliis lanceolato-ellipticis ^{subterni} subtus molliter villosa ^{integerrima}
ramis nervis ~~subtus~~ ped. racemoque terminali villosa sericeis
Habitat in America;

Rami teretes terti. pilis flaviscentibus, mollibus adpressis nitidis uti
petioli, nervi subtus pedunculique calycis que, quinque nervis
nervis oppositis supra basin, supra ^{racemum} ~~racemum~~ villosa nervis sericeis
subtus molliter villosa, nervis ~~in~~ longitudinalibus et trans-
versalibus densius villosa. Racemi terminales. flores inferiores
terni, superiores solitarii sessiles

fragilis Melastoma foliis reticulatis, racemis glomeratis secundis saepe hinc

Suppl. pag. 236 + S. V. 404

Habitat in Sumnato

Eructus rigidulus. Folia opposita, breviter petiolata ovata, quinque-
nervia laevia, serrata, ciliata reticulata, fragilissima. Racemus
terminalis, bracteatus: racemulis trifidis et basi floriferis. Flores
superi secundis. Eructus majoris globosus, pappiformis, glabris, umbri-
licis excavato. minores umbilico clauso squamis saepe.

Secandro, quinque nervis

Melastoma fragile, foliis ovatis reticulatis serratis, racemis bracteatis terminalibus,
pedunculis inferioribus trifidis, pedicellis subtifloris.

Poa ghijsijs Marsye hist. plant. pag. 59. Piso de Ind. utriusque re natur.
pag. 217. fide herbarii Marsyavii huc pertinet nomen ad Melast. Stri-

^{gosam}
Texta uatl. Hernand. hist. pag. 414

Melastoma fragile: foliis quinque nervis reticulatis, racemis floribus
secundis oppositis Lin. Suppl. pag. 236.

Synonymum Sloanii, a Linno huc allatum

(Prosularis fructu non fructu Sloan. hist. 2. tab. 196. fig. 1. a Linno huc
allata, ad aliam plantam pertinere jam dudum recte monuit Ceib.
Swartz. in obs. bot. pag. 178)

Melastoma elegans, (Cecandro) hispida, foliis cordatis ~~quaque nervis~~ inaequaliter
crenato-dentatis, racemis dichotomis terminalibusque paucifloris.

Melastoma elegans: foliis cordatis, pelosis, elegantiter crenatis, floribus
corymbosis. Cubbot. fl. Guain. pag 427. Tab. 164.

In Cayenna legit von Rohr &c.

Rami teretes, dichotomi, cortice fusco, uti petioli, folia utrinque, pedunculi
et calyces et flos longis distinctis hispidi; ^{setae} ~~petioli~~ ramorum basi crassiores referen-
tes; ^{nautescunt} foliorum et reliquorum partium pallide flavescentes.

Folia petiolato, opposita, bi- sive tri-pollicaria, cordata, acuminata, obtusius-
cula, obtuse dentata: dentibus emarginati cum seta, alternis parum majoribus,
quinque nervis, praeter marginales, nervi interiores infra acumen concurrer-
tes, inter nervos simpliciter subvenosa.

Petioli pollicares, supra sulco exarati

Pedunculi in dichotomis ramorum ~~et terminis~~ apice, solitarii, interdum gemini,
sesqui-pollicares; ^{oppositi} pedicelli plerumque quatuor, versus florem parum cras-
siores, ^{nautescunt} unguiculares: infemi saepe triflori: flore intermedio sessile.

Calyx: laciniis quinque, setaceis; fructiferus subovatus

Petala quinque, oblonga, vix unguiculana.

Stamina decem longitudine petalorum. Anthera marginata pallida, undu-
lata, subulata, basi incurva, ~~et~~ filamentis parum longioribus.
magitudine Piperis nigri parum minores.

Litr. M.
pag. 46.

8

Baud

~~Melastoma aliger, ² ~~hispidifolium~~ ~~var. ² ~~cond~~~~~~

Frigulosa Mel. folus subdentidulatis subcordatis acuminatis, superne fringosa pilos
subtus tomentosi. Racemi axillaribus flombus pedicellatis confertis
Schw. p. 107^{p. 71}
Habitat in India occidentali
Folia & nervia. Racemi solitarii

pymifolia Melastoma foliis ^{acutis} subdenticulatis cordato ovatis acuminatis supra strigosis

subtus nudis glabris

Habitat in Ranchois

Rami obscure tetragoni inferne superne cinereo pulverulenti tomentosi

Folia petiolata bipollicaria et ultra tri nervia vel quinquenervia

subtus ^{seguet et cetera} nuda supra pilis ~~paucis~~ purpurascensibus strigosa

et novella ~~in~~ subtus uniana

flores non vidi affinis strigosa Sw

argentea Mel. foliis ~~ovato~~ oblongis ^{integris} supra nervis nitidis subtus tomentosis ^{candidis} albicantibus
paniculis terminalibus floribus sessilibus

Melastoma argentea foliis quinque nervis sub denticulatis ovatis glabris
inferne tomentosis candidis: paniculis terminalibus patentibus Schum.
Prodr. p. 70.

Habitat in India occidentali.

Rami uti folia subtus, petioli pedunculique tomentosis candidis, superne
compressi. Folia petiolata palmata acuta vel subacuminata
nervi transversi utrinque elevati interstitiis depressis.
Petiolus supra sulcis exarata. Panicula terminalis patens
specie duobus. Oculis globosis magnitudine seminis coradi
obscure denticulatis.

Arbor racemosa Brasiliensis, folio malabathri Breyn. Cent. p. 3.
t. 4. 2. omnino eadem cum nostra

hoc nomen
ad holosericeam
non pertinet

brochati

Secundum specimen in herb. Lin: ² nostra non holosericea est neque. ³ cum descripta
et Char. Her. spec: minime convenit

impetolae M

Aublodii
~~Aublodii~~
~~Melastoma~~

Melastoma foliis lato lanceolatis serrulata nudo pelosi, ramis ramulusque hispidis
tis, denticulis caule et ramis hispidis Aubl. Fl. Gu. 1. p. 402. Tab. 154.

Habitat ad rivas fluviorum Guiana 4

Caule quadrangulare erecto, superne ramosi. Folia petiolata attenuata
viridibus quinque nervia. Racemi terminalis ^{sub} et compositi
racemulis inferioribus bipartitis pedicellis triflori. Calyx fructus magni
tudine seminis corandri bilobulatis

Aublodii

Flavescens Mel. foliis oblongis utrinque acutis integerrimis subtus cinereis, ramis floriferis
Melastoma flavescens; foliis ovatis quinque nervis, subtus cinereis Aub.
Fl. Gu. 1. p. 423. t. 164.

Habitat quare in sylvis. & sicute

Arbor decem pedalis in cunctis tetragonis, superne ramosis. Ramis ramuleque
quadranquli superne foliosi. folia petiolata basi attenuata superne
latiora, superne glabra flavescens, subtus cinerea, quinque nerva
nervi oppositi supra basin. ~~Comitibus infra folia~~ Pedunculi laterales
infra folii oppositi quadrifidis, pedicellis bifloris. ^{ala} folia plura parva
ad basin pedunculorum partialium et duo opposita ad basin pedicellorum
Stamina 10. Pentagonum 5 loculare

Grossea Melastoma foliis integerrimis quinque nervis subcordatis scabris Lin. Suppl.
pag. 236* N. 404

Habitat in nova Granada;

Arbor ramis nigrescens, teretibus, hispidis. Folia cordata, ovata, hirsute rigida,
laevissima, quasi tomentosa. Flores in apice ramorum, subsiles, grossi.
Calyx validus, pilis fringosis. Corolla extus parum pilosa Lin. l. c.

non vidi

Crispata Mel. foliis integerrimis quinque nervis quadratis, ramis crispatis Len. L.V.
pag 404

Tunis mersonarim Rumph. amb. s. p. 66. t. 35.

Habitat in Amboina

~~Populus~~
~~holosericea~~ Mel. foliis integerrimis trinerviis oblongo ovatis ^{sesquibus villosis lenicis} subtus tomentosis, racemis bra
sericea ~~cheati, fructu bipartito Lin. Spec. pl. pag 559 & H. pag 404~~
Mei & Margrav. Bras. 117.

~~Arundinaceum americanum, ampliore folio trinervi, inferius alba lanugine
unicano maximo utrinque glabro Pluk. mant 4. t. 250. fig. 2.~~

~~Arbor racemosa Brasiliensis, folio malabathi Boey. Pant. 3. t. 2. 4.~~

~~Habitat in Brasilia, Jamaica, Surinamo &c.~~

~~Arbor ramis tomentosis. Folia petiolata, trinervia excepto marginali nervo, reticu
lata, subtus tomentosa uti petioli. Racemi terminalis & dichotomia brachiati
fructu lateralibus conjugatis, secundo floris Lin. Spec. l. c.~~

~~Melastoma holosericea foliis integerrimis trinerviis oblongo - ovatis ^{sesquibus}
subtus tomentosis, racemis brachiatis ^{fructu} bipartitis Lin. Spec. pl.
p. 559 & H. p. 404~~

~~Rami quadrangulati folia quinque nervia, acuta vel obtusa cum
aeumine. Racemi terminalis compositis, pedunculis trifloris
sic habet specimen in herbario Linaci sub nomine holosericea d. n. s.
ab illo in speciebus plantarum descripte~~

nifescens Mel. foliis cordato ovatis ^{nigosis} subsessilibus subtus nudo villosis ~~non floribus~~
capitulis racemosis floribus ~~longis~~ racemis termi capitulis racemosis
melastoma nifescens foliis crassis, rugosis, cordatis, subtus tomentosis sessi-
libus. Aubl. fl. Gu. 1. p. 40 p. t. 157.

Habitat in Campis Guand. h.

Caules pedales erecti gamofi, tetragoni nudo pilosis. Folia ut petiolata
acuta, subdentata, supra rugosa virentia subtus pilis flavescenti-
bus tecta, quinque nervia. Flores collecti in capitulis globosis
oppositis, racemosis, bracteis lanceolatis. Pericarpium villosum
triloculare

nuba Mel. folus cordato ovato ^{sub}sespibus, ^{subseparato} ^{semelatis} subtus tomentoso femineis flores ^{ibus} axillari
bus sespibus

Abutilon Jamaicaensis pentanervos, folus crispis, leviter dentatis, suprema
facie feminea prona candicante, et molli lanugine villosis Pluk. Alm
40. t. 264. fig. 3.

Melastoma nuba folis subcordatis, sespibus, floribus axillaribus Aub. Fl. Gu
1. p. 416. t. 161.

Habitat ad ripas fluviorum Guano ty
Oncoculus pedalis vel bipedalis caulis ^{villosi} tetragonis tomentosis inferne nudis ^{supreme}
in summitate ramosi foliosi. folia brevissime petiolata acuta, subsepara
ta, supra vixidia inferne feminea, quinque nerva bipollicana, cili
ta. Flores in ramulis vel axillares vel in ramis infra folis solitarii
interdum bini vel terni. Stamina 10. Pericarpium villosum quinquelob
Culani

agrestis Mel foliis ovato lanceolatis crenulatis ferrugineo villosis, Panicula axillares
 terminalesque hirsutissimis

Melastoma agrestis foliis ovato oblongis, floribus albis paniculatis Aubl. fl.

Cyn. t. p. 425. t. 166.

Habitat in muris antiquis et ripas fluviorum Cajennae. 4

Caulis b. f. tripedales, teretes pilosi, ramoşi. Folia petiolata tripedalia
 Crenulata g. spec. in herb. Banken, villosa ferruginea 9 ^{quibus nervis} _{micropilosis d. n. g. g. n.}

Truncatis nervis oppositis supra basi. Pediculi pedales bifidi, flores subsessile
 Calyx pilosus minute dentatus. Stamina 10. Fructus quinquelocularis

Folia 7 nervia papulosa, pilosa. Racemi axillares et terminales
 simpliciter herb. Aubl.

inflata Melastoma foliis oblongis serrulatis rufo pilosis basi inflatis floribus axillaribus
Meiota Guianensis Aubl. fl. Guian. 1. p. 443. 8. 1776 sessilibus

Habitat in sylvis Guianae

Caulis tripedales tetragoni, ramosi villosi. Folia ^{marginata} acuta serrulata, rufo pilis
la triplicinervis ⁱⁿ basi inflata in seipam ^{repentia} bilocularem. Flores soli
tani

Calycis descript

elata Mel. foliis serrato denticulatis oblongis coriaceis, subtus ferrugineo tomen-
tosis; paniculis terminalibus patentibus, floribus sessilibus. Chus. prodr.

p. 70.

Habitat in Jamaica,

Swan h. 2-t. 196. fig. 1.

Herodotus. folia ovalia quinquenervi.

albicans Mel. foliis integris ovatis acutis supra glabris, inferne tomentosis
albis femineis; racemis terminalibus erectis, floribus congestis sessili-
bus. Schreb. prod. p. 70.

Habitat in India occidentali.

Flores decandri. folia quinquenervia