

Melica

M. aurantiaca Raven. 4. s. pag 46. tab 472. fig. 1  
solata. ————— 47 ————— fig. 2.

*glabra melica*

Habitat in Florida Richard

*habeo*

Melica

pascuis annosa

Habitat in monte viduo Commerson Herb Musc.

Caulis pedalis vel sesquipedalis, ascendens, foliosus, erectus. Folia plana  
glabra, vaginis villosis, striata. Racemus terminalis. Pedunculi inferne  
saepe 2-3. simul, duo uniflori, tertius longior, capillaceus, triflorus. Spicula ma-  
tantes, semipolliniferas, valvula aequalibus, infera calycis magna, cuneato  
marginata membranacea, altera angustior. Corolla valvula exteriore striata  
minime ciliata.

*Aurantiaca Melica.*

Habitat Herb. Thourini

Vagina subtomentosa. Folia lanceolata, sesqui-pollucaria, supra glabra, subtus villosa  
panicula simplex, secundis. Flores magni, pallide nivescentes, glabri striati, stam.  
superne oculo armato transversim confecta annulati

montana Melica parvula fructo pinnato secundata, ramulis brevissimis  
vaginis ore mucosis La Mart. T. Car. pag. 179  
Habitat in Europa montibus umbrosis

~~an ead. em. ac Melica Brachoni~~ Melica montana La Mart.  
hest. Thouron.

Caxiflora M. racemis compositis, corollis <sup>florescens</sup> speculis valvulis calycinis exterioribus  
brevioribus, inferioribus <sup>un</sup> valvulis anterioribus ciliatis

melica Caxiflora. panicula divaricata: calycis exterioris valvula corollis  
longior: corollam altera ciliata Cavendish: pag 40. tab. 473. fig. 2.

Habitat Chili

Caulis bipedalis, teres, glaberrimus. Stipes angustus firmus, striatus. Ligula minima  
lanacea laciniata. Pedunculi <sup>diffracto: anteriori. posteriori. nuda</sup> pariter geminati: speculis racemosis  
superiores simpliciter uniflori. Specula nutantes. Calycis valvula oblonga  
bifida, striata, interior lanceolata, fusca apice fereana. Corolla valvula  
pallide fusca

rigida mita racemo sub composito secundo, calycis corollis longitudine calycis  
(valvulae exterioribus ciliatis <sup>floribus inferioribus</sup>)

melica rigida. panicula subpicata secunda: calice corollis ovato; corolla  
num altera ciliata Caran. v. 5. p. 47. tab 473. fig. 1

Habitat in monte video

Culmi erecti, octo pollicares, teretes, vaginis foliorum vestiti. Folia rigida, strata,  
superius panicula parvam brevior. Vaginae floratae, suprema spatulata  
formis. Pedicelli inferiores ramosi ramis indivisi <sup>uniflori</sup> <sup>chole</sup> simplicibus  
panicula multiter. Calycis valvula exterior oblonga, obtusa, quinque nervis  
interior angustior apice seorsum

aspera Melica panicula patente pyramidata, glumis imberbibus.  
foliis convolutis asperis Desfont. fl. Atl. pag 71.

Gramen avenaceum saxatile, panicula sparsa, locustis latini-  
bus condicantibus et nitidis Tournef. Inst. R. 4. 524.

Gramen avenaceum angustifolium paniculatum pyrami-  
dale Borel. Tab. 95. Fig. 1.

Habitat in foveis riparum monti Atlas.

non vid.

Recumbens ~~Alba~~, coloris hepatici, floribus micropis subsistentibus  
in ulmo recumbente Thunb. prodr. fl. Lapp. 21  
Habitat in Cap. l. p. r.

Michi ignota

coruleum *Ost. foliis pennatis pennis dentatis* Hort. Kew. 3. p. 273  
~~officinarum coruleum~~ *Paep. coll. 1. p. 70*  
~~officinarum pennatifidum~~ *L. Her.*

geminata Melica collis hirtis, parviflora ~~in~~ ~~montibus~~, cul  
mo decumbente Thunb. in tr. fl. alp. jug. ~~22~~  
4 abdit in Cap. 6 p. 1

non vid.

capensis Melica. collis glabris, panicula ped. erecta prima; foliis  
subfiliiformibus Thunb. prodr. Fl. cap. pag. 303.  
Habitat in Cap. 6 spec.

~~Parado. 9. foliorum cum abumina inermis subintegra Herb. Nov. 1. p. 169~~  
~~habitat in Madaga.~~  
D. m.

~~Tomentosa Scabida corollatis squifidis inaequalibus foliis tomentosis radice ali-~~  
~~bis pennatis fidis reliquis pennatis pennulis lanceatis Cavan. ii: pag~~  
86 tab. 103

memora Melica corollis hirsuta, racemis cernuis, caule erecto  
Shrub. prodr. pag 28.

Habitat in Cyp. b. p.

mihi lyroba

Thunbergii. Melica. caulis glabris, panicula coarctata, culmo terete  
Willd. - bei. fl. pag. 303

Melica ramosa Thunb. - prodr. - fl. cap. pag. 26

Arabidaria cap. - 6 bei. 24

non in di

Bauhini M. panicula sub <sup>ramosa patente ~~tergenda~~ <sup>ex tenoribus</sup></sup> simplici petalis scabris flosculi ~~alterius~~ <sup>inferioris</sup> margine villosi  
foliis involutis

Gramen avenaceum canescens, spicis raris Bauh.  
Theatr. p. 157.

Melica Bauhini spica ramosa unilaterali, festili floris  
petalo subulato All. Quert. p. 43.

Habitatio comitata niccesi

Caries melica nutantis Culmi flusis simplicibus pedales  
tenuis frutis, vaginis foliorum festi. Vagina subulata  
superiora altitudine culmi cycula membranacea, pedun-  
culi bi- l. triflori valvula pallida purpurea et flavescens.  
petala ex tenui strata e punctis minuti oculo armato  
videndi exasperata flosculi inferiori pulvis albis longis cilia  
ta.

confer cum nutante

pyramidalis <sup>lis</sup> M: panicula ramosa pedunculis <sup>pedic. floribus nutantibus</sup> remotis foliis ~~conodactis~~  
nvolutis  
melica pyramidalis: petalis imbricatis, panicula pyramidalis laxa, foliis  
involuto punctis Par. St. 2 p. 43.  
Legi in Barbana

Similis M. nutanti adwersa. Culmus bipedalis erectus glaber  
strictus ff tenax. Vagina ~~con~~ involuta <sup>reman</sup> patentia pubulata  
sepe spithamosa glabra ligula <sup>reman</sup> superiora altitudine  
sepe culmi. Pedunculi <sup>partiales</sup> remoti sili, clavis simul aggregati  
iniquales digitales vel unguiculares <sup>supremi uniflori</sup>  
pedicelli flexuosi pedicelli bi- / triflori secundis peduncu-  
li <sup>supremi uniflori</sup>

nativani M. pedalis imberbis, panicula nutante simpliciter. Lin LV  
Schreb. gram. 62. t. 6. fl. Don. Cavan. 42. 2. p. 506. 175. t. 2.  
Gramen montanum avenaceum locustis rubris Bauh. prodr. 20.  
pen. 16.

~~Gramen avenaceum locustis raris Bauh. pen. prodr. 20. pen.~~

10.  
Gramen montanum avenaceum, locustis rubris Bauh. pen.

10.  
Habitat in Europa frigida in rupibus.

Culmus pedalis aequaliter bif. trinodis erectus glaber.

Solae plana glanacea glabra. Panicula pauciflora  
secunda. Pediculi biinferos triflori superiores biflori super  
mi uniflori erecti stipuli flori nutantes. Caliculi  
calycino oblongo obtuso purpurascens altera corolla  
pauci brevior

Secunda - foliis planis

montane La Mant

aleata M. <sup>panicula coarctata</sup> flosculi inferioris petalo exteriore ciliato Lin. l. v. p.

Gramen avenaceum montanum Canadenseum Bauh prodrom. 20. pin. 10.

Gramen avenaceum, spica simplici, locustis densifloris Candian  
fibris et lanuginosis Scheuchz. gram. 174.

Habitat Europa collebus sterilibus siccis &

Culmibus sesquipedalis foliis striatis glaber. folia graminea  
longa striata glabra plana Paniculae pediculis interdum  
remotissima coarctata valvula calycinis lanceolata acuta  
pallida nitida petalum exteriore pilis longis copiosis  
ciliatum.

---

foliis planis

pedunculis approximatis  
Coerulea M. panicula coarctata floribus cylindricis

gramen paniculatum autumnale panicula ampliori et  
viridi nigricante Scheuchz. gram. 267.

Cera coerulea panicula coarctata, floribus pedunculatis muticis  
convolutis-subulatis, foliis planis spec. pl. 95 - fl. Dan. 4. 239  
de Juss. 674

gramen arundinaceum enode minus sylvaticum Bauh. pin. 7.  
theatr. 97. Scheuchz. gram. 209

gramen praderis sordidum, panicula rara purpurasciente  
Monf. hist. 4. p. 201. f. 1. 5. fig. 22.

Habitat in Europa posius aquisi 4

Culmi filiformes glabri erecti pedales et ultra. Folia  
fatto

panicula terminali ramisuprema coarctata coerulea variis  
pallida. pedunculi flectuosi. floris subis oblongo subcylindricis  
Dunci acuti flofili calyx duplo longioris valvula corollae  
lanceolata.

— panicula coarctata aequali

intercepta M. <sup>ramosa</sup> panicula compta interrupta, flosculis subulatis

Habitat <sup>in</sup> Europa australi ubi <sup>est</sup>

Similis melica coemula at ~~panicula~~ pedunculis per intervalla  
remotissima aggregatis; tota vixit nec coemula flosculi longis  
res pedicellus corollam superionem calycis longioris. Panicula  
spithame

uniflora M. panicula rara, calycibus bifloris; flosculo altero hermaphrodito  
altero neutro Act. off. Botan. 1. p. 10. East-fl. Lond.

Gramen avenaceum locustis varionibus Baah. p. 10

Gramen avenaceum spica ~~rara~~ mucosa variae glumae Monj  
herb. 3. t. 1. fig. 44

Melica nutans pedalis imberbis; panicula secunda nutante  
gluma uniflora Hudb. fl. angl. p. 37.

Habitat in sylvis Europa septentrionali <sup>pyrenaeis nudis</sup>  
Culmus filiformis sesquipedalis glaber. Folia lineari lanceolata  
plana glabra sive spithamea. Pedunculi parvales pauci  
inter <sup>6-7</sup> remoti patentissimi in inferne gemini alter uniflorus alter  
bi-<sup>3</sup> florus superioris uniflorus. Valvula calycina fissis fem-  
ginei. Corolla glabra fertili oblonga

Melica lobelii panicula ramosa, foliorum vagina acuminata oppositi  
folia, induere sepe Vall. fl. Delph. 2. p. 89. All. duob.  
pag. 44

nutans La Martia herb. Theres

maximum T.

minuta Melica Culmo ramoso, foliis setaceis, petalis imbricatis Mart. 32. \* p. 113.

Habitat in Italia

Caemi filiformes, angustissimi, semipedales, ramosissimi obtecti foliorum vagi-  
nis. Folia setacea angustissima, involuta, filiformia, basi patula.

racemi terminales, simplices, capillares, pauci flori. Calycis gluma  
bivalvis, biflora, ovata, lobulis dimidiis brevior. Lobuli oblongi, mu-  
tici, intermedio pedicellato, truncato, periti Len. Mart. l. c.

papilionacea M. calycis valvula inferiore maxima colorata, petalo  
exteriore subiliato Lin. Mant. 31. + L. V. p. 113

Gramen spica bina jugulari, locustis majoribus villosis prostratis  
siccibus Sloan herb. 1. p. 206. t. 64. fig. 1.

~~Gramen~~  
Medea breviflora petalo exteriore amplo vexillato Ait. spec.  
2. p. 17. t. 6. fig. 1-2.

Habitat in Brasilia.

Culmi erectus pedalis teris glaber. Folia Culmi involuta subulata  
Lesqui pollicaria panicula subsimplex secunda pedunculata  
commissis flexuosis radialiter inferiori 3 vel quatuor flori superioris  
res uniflori.

panicula subsimplex secunda

altissima m. petalis imberbibus, panicula ramosissima Lin. Sv

Gramen avenaceum, locustis ranonibus onutis virginianum major  
Mont. hist. 3. p. 216. f. o. t. 7. f. y. 5 r.

Habitat in Sibiria Canada. &

Caumis bipedali et ultra stnatus glaber. folia lanceolata striata  
plana spithamea unguem lata striata glabra attenuata. Ligula  
membranacea. Panicula spithamea contracta undique <sup>et</sup> floriferu  
Pedunculi et pedicelli <sup>pauciflori</sup> brevis flor. secundi basi calycis foliola basi  
purpureascentes oblonga nitida velvula corollina extenori oblongo  
lanceolata obtusa glaberrima nudentur testis oblongum

countata

