

Melissa

1. officinalis M. racemis axillaribus verticillatis: pedicellis simplicibus
2. grandiflora M. pedunculis axillaribus trifloris longitudine florum foliis lanceolata
3. calamita M. pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum,
foliis ovatis
^{to oblongis}
4. Nepeta M. pedunculis axillaribus dichotomis foliis longioribus, caule ascendente
5. hispida M. hispida forma, pedunculis axillaribus dichotomis, foliis longioribus
foliis ovatis sub serratis
^{hispida}
6. cretica M. racemis terminalibus, pedunculis solitariis brevissimis
7. fruticosa M. racemis pedunculis multifloris racemosis, foliis sub cordatis
subtus tomentosis, caule fruticoso virgato

Amelisa

Pluken tab. 163. fig. 4

Habitat herb. mus.

Salic. m. cretensis sed minus incana. Solia feratuni 2-3. oblongi. Flores parvi
Concedit cum Calamutka pulegii odore sive nepeta & marum Veneti folium in
canum speciatum crenatum Pulegii odore Hispanicum Boer. mus. 2. 61. tab. 50

officinalis M. racemis axillaribus verticillatis: pedicellis simplicibus
Lin. S. V

A. napalm f. meliophyllum Lobel. hist. 227.

Melisa hortenji Bauh. pin 229.

Habitat in montibus Genevensibus, Allobrogibus, Italiae &

Caulis cubitalis ramosissimus. Folia inferiora longius petiolata
subcordiformia acuminata, serrata supra hirsuta subtus glabra

Wittman.

folia oblonga ^{obtusis} serrata

folia oblonga acutis obtuse serrata

grandiflora M. pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum hinc
L. V. p. Gaier coll. 2. p. 134

Palamutka montana prostantior Best. Syst. 7. 4. 7. fig. 1. flore purpureo
Manet. 42. 378.

Palamutka magno flore Bauh. pin. 229.

Habitat in Aetruis montosis &

Caulis erectus pubescens pedalis subramosus. Folia petiolata ovata
acuta profunde serrata supra canaliculata oblonga pilis raris
adpressa. Pedunculi axillares oppositi folios breviores plerumque
triflori. Calycis ^{tubulato} angulati anguli villosi, unguis ciliati. Corolla
calycis duplo longior

Folia ovata acuta serrata

Calamintia m. pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum.

Lin. S. V.

Calamintia montana God. pempt. 90

Calamintia vulgaris et officinarum germanis Bauh. pin 220.

Habitat in Italia, Hispania, Gallia Livi Saxonia &

Caulis erectus. Folia petiolata ovata, acuminata subdentata
vellosa. Panicula laxa. Corol. purpurea, faucibus maculatis et
pilosis. Wittm. sumpt. 7. p. 452.

pedunculi superiores foliis longioribus

michx-hand note

Nepeta M. pedunculis axillaribus dichotomis folio longioribus; caule ascendente
et hirsuto Lin. S. V. pag. 542. +

Calamintha pulegi: odor f. *Nepeta* Bauh. pin. 220.

13. *Calamintha montana proalta*, *pulegi* odor Boiss. mus. 2. p. 45.
Tab. 40. et 30.

Habitat in Italia, Gallia, Anglia, Helvetia agris glareosis.

Caules durissimi ut tota planta hirsuta. Folia subcordata supra
glabra pilis parvis raris. Bractea subulata. Corallo sub ovato pala-
to albo, comaeque marginato; se albo.

superior quam *calamintha* Caulis ascendens

habeo ex herb. Tournes.

~~Urtica~~ Nepeta M. hirsutissima, pedunculis axillaribus dichotomis, foliis ovatis
sub serratis Schumacher
Habitat ^{tota}
Saxi mel. nepeto at hirsutissima. ^{foliis longioribus}

creta M. racemis terminalibus; pedunculis solitariis brevissimis L.S.V. p.

5434

Calamintha incana, ocyimifolia Bauh. pin. 220.

Calamintha, pulegi odore minor Barrel. ii. 1166

Habitat non spelti inque Hispania

similis M. nepeta. Caulis palmari, humilis rectus atropurpureus.

Folia ovata parte obtusiferrata. Verticilli plurimi a pedunculo
si uniflori, aphylli, inftar racemi ramos terminantis. Bractea
canaliculata. Calycis fusci. Corollo albo purpurascens.

non red.
Lyn. Pluk. Dubium

fruticosa M. ramis attenuatis rugatis, foliis subtus tomentosis, caule fruticoso
L. V

Calamentha montana incana minor Monf. hist. 3. p. 413. n. 6

Calamentha hispanica frutescens, multifolia Tournef. Inf. R. 4. 194.

Habitat in Hispania

Caules erecti ramosi semper paniculatus ramis tetragonis canescentibus. Folia petiolata ovata integerrima vel obscure utrinque crenata una alterave, obtusa subtus canescentia semperve circularia floralia pedunculis breviora. peduncululi oppositi supremi in ramulis tri vel quadriflori. Calyces striati. Flores albi parvi

nyofa m.

L. rugosa Louseno
rotundifolia Boottii