

Melochia

Andros folia Melochia foliis subcordatis attenuatis incanis, floribus terminalibus ag-
gregatis.

Ad St. Mathon Leyd An v. Rohr

Rami teretes, purpurascens, superne tomentosi, incani.

Stipula petiolata, alterna, subcordata, bipollicaria vel minor, inaequaliter
serrata, attenuata, acuta, utrinque incana, supra lineata, subtus
nervosa arenia: junctura plicata

Petiole pollicares, tomentosi. Squala parva, subulata.

Floris pedicellati, subumbellati.

Calycis laciniis subulatis.

rubra Melochia foliis subcordatis oblongis lineatis villosi inaequaliter serratis, floribus
aggregatis axillaribus sessilibus.

Habitat in America ^{Quaeque} meridionali An. v. Holz

Rami teretes, supra cinerei, subtomentosi, pilosi.

Folia petiolata, alterna, pollicaria, basi subcordata, oblonga, acuta, inaequaliter serrata, arenaria, nervosa, supra lineata, villosa: subtus nervi
exstantibus, canescentia, villosiora; rudimenta ramulorum in axillis

Petioles unguiculato, hirti. Stipulae lanceolatae, pilosae.

Flora in axillis superioribus et apice sessilis, plures, aggregati. Bractea
et laciniis calycis lanceolatae, attenuatae, hispidae

procumbens Melochia foliis oblongis serratis incanis; flenibus racemose capitatis
~~axillaribus~~; pedunculis ^{et} axillaribus foliis longioribus
Habitat Guiso In v. Rold.

Caulis cymosi; tenues, pilis purpureo canescentis.

Folia petiolata, alterna, oblonga, vix pollicaria, ^{remota,} acuta, serrata, su-
pra lineata, subtus nervosa, utroque tomento tenui canescentia;

Petioles feminaque utraque. Hilula lineari-lanceolata.

Pedunculi axillares, filiformes; folio duplo longiores incanis. Stem
plures conferti in apice pedunculorum, subcapitati, saepe capitulum
unicum vel alterum inferius in eodem pedunculo

Calycis lacini, ut in Bractea lanceolata, incanis.

lobata. Melochia foliis cordatis subtilobatis ⁵ subtus villosis mollissimis
inæqualiter serratis floribus paniculatis

Habitat in India orientali, herb. Biblioth. Christianiensi 5

Caulis fruticosus. Rami teretes superne a tomento terui incani
folia petiolata, sesquipedalmaria, ^{subtilata} acuta, basin versus integerrima
juniora utrinque incana, Venella ovata. Petioli longitudine
folii. Pedunculi axillares et terminalis, longitudine folii,
incani; pedicelli brevissimi subumbellati. Calyx campanula
tus, incanus. Petala calycis parva conjuga. Filamenta basi laxiter
coherentia. Capsula subglobosa, incana.

hirsuta Melochia

Habitat herb. Tusc.

Caulis teres, hirsutus, minime rigidus, folia sesqui-pollicaria, ovato-oblonga
nervosa, supra lineata, utrinque villosa arenis

non fallor eadem a Pohns habeo

nodiflora Melochia melochia floribus conglomeratis axillaribus, cæspitibus globosis, foliis ovatis
acuminatis glabris Schw. prodrom. pag. 97

Abrutylon fruticosum Sloan. herb. p. 219. t. 135. fig. 2.

Plantam In Insula Cantos legit Dr. Matfeld fruticam amaram et dicitur quæ
eam integramque Collectionem Amer. Hispanicæ Antiquariæ benignè
Dono obtulit.

Trinax ramis teretibus, alternis, glabris, purpureis, ramis flexuosis

Folia petiolata, bipollicaria et ultra, utrinque glabra, ~~versuta~~
supra nervos venosus subtus purpurascens serrata, acuminata, acuta.

Petiolus rubescens, ~~invenitur~~
Floris in axillis ~~congestis~~, ^{lanceolatis} ~~plumbeis~~

Bractea ~~ovata~~ glabra, longitudine florum, decidua
Stipula

♂ Floris in axillis conglomerati sespites, parvis.

Bractea ovata, longitudine florum.

Calycis laciniis ovatis acuminatis.

Corolla calycis longior.

Malva ulmi folia, floribus conglomeratis ad foliorum alas Plum
4c. credit

habitat quoque in insula franco herb. Mus.

concatenata M. racemis confertis terminalibus; capsulis globosis sessilibus
Linn. fl. reysl. 247*

Alicca indica foliis parvis, fasciculatis ramulis adpressis
Pluken. alm. 26. t. 9. fig. 5.

Habitat in India utraque. 2

Melochia concatenata foliis sulcatis ciliatis serratis, racemis
florum terminalibus numerosis Cavan. Desf. pag. 322.
Tab 175 fig 2.

Caules purpurascens, superne villosi. Ectia suprema ovata
bacciolata, angusta herb. Musf.

Venosa M. pedunculis distinctis terminalibus multifloris, foliis
ovatis serratis venosis subtus tomentosis, caule piloso Sw. prodr
pag. 97.

~~Sw.~~ Da 177. Mill.

Habitat in Jamaica &

odontata M. paniculis pedunculatis compositis, foliis ovatis subcordatis
sublobatis biferratis glabris Len. Suppl. p. 302. t. 5. v. pag
611 Caron. Desf. pag. 320. t. 173. fig. 2.

Habitat in Insula Tanna

Folia petiolata palmata et ultra glabra inaequaliter
ferrata pedunculi laterales et terminales. iniani
semipollucari pedunculati. Petioli apice flores nonnulli
subsemples calycis villosi iniani

Rami glabri. Folia inaequaliter ferrata, attenuata, simpliciter
venosa. Pedunculi laterales, iniani, et calycis. Flores in
panicula conferti herb. Mus. bot. spec. a Forst. in sum

Calyx videtur esse duplex exterior triphyllus folioli ovati

Cupulena M. racemis confertis axillaribus, calycibus inflatis mem-
branaceis, foliis ovato-cordatis incisiferratis subtus tomentosis

Sw. prodr. pag. 97.

Habitat in Jamaica

hispida M. folus vatis inaequaliter serratis, spicis florum Vermiculi-
bus densis hispida Raven. d. sp. pag 323. tab. 175. fig. 1.
Habitat.

perone h. coll. nebula

an eadem cum nea nebula

Tomentosa M. floribus umbellatis axillaribus, capsulis pyramidalis
pentagonis: angulis mucronatis, foliis tomentosis Lin. Spec. pl.
p. 943.

Abutilon herbaceum procumbens, betonicae folio, flore purpu
reo Sloan. hist. 1. p. 220. t. 139. fig. 1.

Habitat in America meridionali
Melochea tomentosa foliis ovatis serratis tomentosis, floribus umbella
tis axillaribus: stylo siccato Caran. d. s. l. p. 319. t. 172
fig. 2.

Rami teretes velosi pro canescentes folia petiolo ovato
oblonga polliciano utraque tomentosa ^{avena} molli in aena supra
lineata subtus nervosa serrata stipula lanceolata attenua
ta. Capsula tomentosa in aena

pyramidata M. floribus umbellatis capsula pyramidalis pentagonis,
angulis mucronatis, foliis nudis Loef. Bot. 354. Jacq. hort. t. 30
Althoa brasiliensis frutescens, incarnato flore, fagopyri semi-
ne Plukin. alm. 29. t. 131. fig. 3.

Habitat in Brasilia 24

Melochia pyramidata foliis ovato lanceolatis serratis glabris, flori-
bus umbellatis oppositifoliis Baro n. d. s. p. pag 319. t. 172.
fig. 1. excepto linea deicurrente villosa

Caulis teres, ramosus glaber folia petiolata 1-2 pollicum
ovato lanceolata inaequaliter serrata utraque glabra
nervosa, a venis attenuata, acuta, petioli ^{pauci villosi}
stipulae parvae subulatae glabrae pedunculatae ^{ad lorum pet. axill.}
et terminales petioli longitudo m. Pedicelli capillares
foetidi. Capsula glabra

ovato lanceolatis glabra

planta inter americanae descripta sub nomine Mel. pro. est spec.
waether

Supina M. *Centris capitatis*, foliis ovatis serratis, caulis prostratis
bentibus Linn. S. V.

Alcea supina pusilla, geranii exigui maritimi foliis & facie,
maderapratensis, fructu in summo caule glomerato, pericar-
pio duro Plukh. alm. 14. T. 132. fig. 4.

Habitat in Andria

ramuli in pagulis
a peltis bentibus
Caules plures diffusi palmari et ultra dentes superne adpressi
peltis nudi stellatis. folia petiolata quibusque glabra vix pelti-
cana; inaequaliter serrata. Petiolus ^{subrotundus vel ovatus} ^{stellatus} villosus longitudine folii
Stipula parva subulata. floris terminalibus sessilibus plures
capsula globosa depresso vase villosa.

Caracéana melochia foliis cordatis crenatis villosis, capitulis pedunculatis Coppelis
subrotundis conepicentibus

Melochia caracéana Jacq. coll. 2. p. 369

Habitat prope Caracéas

Caulis erectus, fusco nigrescens. Rami teretes villosi. Folia petiolata, cor-
data, acuta, crenata, venosa utraq; villosa mollia quoad n. pollicari.
Petiolus bipollicaris. Pedunculi breves. Flores in villosis ternis.
Demum oppositifoliis. Flores pedicellati in densis capitulis - bracteis sub-
latis parvis. Calyx villosus petals alba. Capsula subrotunda cinera
siccis Jacq.

corchorifolia M. floribus capitatis simplicibus, capsulis subrotundis, foliis sub
cordatis sublobatis. Len. fl. reysl. 246.

Therm-uren Rheed. mal. g. p. 143. t. 73.

Althoa peregrina, longioris betonicis foliis, floribus albis
perispermis, capitulis ante conglomeratis. Pluch. alm.
25. t. 44. fig. 5.

Melochia corchorifolia Willd. 221. t. 176. fig. 217.

Habitat in India ☉

Melochia corchorifolia foliis ovato-lanceolatis sublobatis
sessilibus glabris, floribus capitatis terminalibus. Cavan
Diss. pag. 321. tab. 174. fig. 2.

Caulis erectus, ramosus, teres, superne parum angulatus striatus
lus. nudum maculatum glabrum in axillis. Colica petiolata
remota ovata, acuta utraque glabra nervosa vel venosa una
equaliter serrata sesquipollicina petioli versus folium
narium vellosi. Stipulae subulatae parvae. Capitula
terminalia

— caule erecto

bobonici a M. foliis ovato-lanceolatis, acuminis producto dentatis,
floribus axillaribus glomeratis: fructibusque capsulari Cavan.
Vas. pag. 321. Tab. 174. fig. 1.

Habitat in insula Bobonis Tunicis et St. Dominici

Caule terpedales ramis virgatis. folia subserrata sive serris
utraque subserrata. stipula ovata. flores sesquiales: fructus
villosus globosus. Cavan.

eadem videtur ac nodiflora