

Melothria

Ob Genus totum ad monoeciam emendandum et forte cum Cucumera conjugendum

~~Totum putidum esse  
Lobis azetibus pedunculatis  
Lobis ovatis  
Caulis herbaceis scandentibus~~  
Caulis herbaceis scandentibus

Lin. bot. class. 490. Syst. veg. 83.

pendula 1. Melothria foliis ~~quia que lobis angulatis subdentulatis~~

Bryonia olivo fructu minor Plum. spec. 3. 2. 55. t. 66. f. 2

Cucumis minima, fructu ovali nigro lori Sloan. hist. 1. p. 227. t. 142. f. 1.

Cucumis parva repens virginiana fructu minimo. Pluken. alm. 123. t. 85. f. 5.

Habitat in Canada, Virginia, Jamaica. &

Radix tuberosa, fibrosaque, rubens. Caules scandentes, filiformes,  
scandentes, angulati. Folia petiolata, alterna, bipollicaria: lobis  
obtusis, mucronatis, subdentulatis vel integerrimis; intermediis in infe-  
rioribus ovatis; in superioribus lanceolatis; utrinque a squamis al-  
bis numerosissimis scabra, subavenia, nervi subtus substriati.  
Circhi axillares.

Pedunculi gemini plerumque gemini, alter uniflorus flore hermaphro-  
dito,\* alter multo brevior, serius florens, apice floribus fasciculo florum  
masculinorum gerens. M. Calyx maris leviter & deestriatus; striae

# fertili

alternis in totidem denticulos recurvos desinentes. Corpusculum carnosum viridulum, solidum, distinctum, in fundo corollae. Antherae tres: duae consimiles <sup>sub</sup> calyptrae: tertium loculum unius ad singulum latus filamenti: tertia angustior, lobata unilocularis ad alterum tantum latus filamenti. Calyx, corolla et Stamina floris hermaphroditi, ut in masculo. Corpusculum virescens, crassum, carnosum, cupulae instar excavatum, fundum calycis implens. Stylus in centro corpusculi, apicem versus incrassatum. Stigma inaequaliter tripartitum. Basia tri-locularis. Vix a Cucumere genera distincta. Richard Monoclam semper observavit Swartz.

indica 2. Melothria foliis triangularibus integris Lour. fl. cochinch. 35. 7

Cucumis muricatus viridis Rumph. amb.

Habitat in Cochinchina

Caulis tenuis. Folia denticulata. Baccis ovato-oblonga, levis.

Folia cordata subquaque-loba dentata Cucumis

*Difficilis Skulmoteret folioso, foliis diffusis subulatis confertis capitulo terminali  
oblongo*

*Premerea mantinea Aubl. fl. Gu. pag. 45 Tab. 16.*

*Habitat in Capenna mantini arenosi &*

*Radices longe repente teretes articulati striati. Culmi erecti*

*omni & quoniam  
viximus folium*

*palmasi vel semipedales erecti teretes infeme anhylli squamis*

*Pteris  
Pantura Pso*

*vaginati superne in ramos 3 vel 4 divisi foliosi. Folia conferta  
supra concava subtus convexa basi*

*Brof. secund.*

*difficilis patentia follicularia su infima longiora subulata can*

*Pursh*

*connata subulata rigida subpungentia glabra margine sic brevifolia*

*vaginae <sup>superioris</sup> <sup>inferioris</sup> <sup>teretibus</sup> Capitulum terminali sub sessile oblongum*

*foliis brevibus <sup>longioribus</sup> <sup>longioribus</sup> linearibus. Squama lanceolata striata gluma altera*

*longioribus  
vix semipollicar*

*longioribus*

*genus distinctum secundum Pursh.*