

Menispermum

1. canadense M. foliis subpeltatis cordatis subotundo angulatis integrisque glabris, racemis aphyllis.
2. virginicum M. foliis subpeltatis cordatis lobatis integrisque glabris, racemis aphyllis.
3. acutum M. foliis cordatis postice angulatis glabris
4. carolinum M. foliis ovatis cordatis sublobatis subtus villosi, racemis foliosis
5. trilobum M. foliis trilobis villosi, racemis axillaribus
6. japonicum M. foliis peltatis ovatis integris, umbellis axillaribus
7. ~~tomentosum~~ crispum M. foliis ex quibus cordatis, integra caule quadrangulo crispo.
8. periplozifolium M. foliis ovatis subtus subvillosi, pedunculis tomentosis racemis tomentosi
9. cocculus M. foliis cordatis retusis mucronatis, caule lacino.

10. paniculatum M. foliis cordatis subtus villosi, floribus racemoso panicu-
latis
11. molle M. foliis subpeltatis reniformis subrotundis veluti utraque molli-
ter villosi, corymbis axillaribus ternis
12. orbiculatum M. foliis orbiculatis subtus villosi, floribus
13. honigii M. foliis ovato-oblongis obtusi glabris, racemis axillaribus
pubescentibus
14. glabratum M. foliis ovatis obtusi glaberrimis, floribus subglomeratis
tomentosis
15. edule M. foliis ovato-oblongis glabris, floribus subglomeratis gla-
bris
16. hirsutum M. foliis ovato-oblongis obtusissimis emarginatis villo-
so-subtomentosis
17. myosotoides M. foliis linearilanceolatis hirsutis
- ~~18. cuneifolium M. foliis cuneatis glabris~~
- 19-14. simlacraum V. foliis ovatis utraque glabris acuminatis, racemis
axillaribus pubescentibus ^{quingeneris}

palmetum Menispermum

Habitat

herb. Thonini

Caulis retrosum hirtus. Folia petiolata, 3-4 pollucina, basi cordata, 5que lobaque
loba: lobi ovati acuminati, intermedii profunde cuneati. Flores non vidi.

Königiu Menispermum foliis ovato oblongis glabris, racemis axillaribus
pubescentibus

Habitat in India orientali König 5

Rami Erectior et ramosior quam reliqui

Rami teretes: ramuli patentissimi, simpliciter, spithamoi, pubescentes
ut petioli et pedunculi

Folia alterna, bipollicaria, mucronata, sinuata, v. mox, inde
gemina. Axilla tuberculo villosa

Racemi foliis brevior. Pedicelli uniflori. Bractea minor, villosa

Flores glabris, trigyni

Bractea 3: reniformes

Smilacinum ^{enipnerum} M. foliis ovatis acuminatis quinque nervis ~~racemis~~ ^{at} illa
nibus

Habitat in India orientali.

Textus scandens. Rami teretes striati.

Solia petiolata alterna, ut tripollucina, in tegerrima
utrinque glabra, undulata, tenuissime venosa, subtus
pallidiora obtusa.

Racemi axillares solitarii, vel gemini, foliis dimidio
brevioribus. Pedunculi communis et partiales pubescentes
cinerascetes. ~~Florae distantes; nectarea subulata ad basin~~
~~funguli.~~ Pedicelli biflori, distantes. Nectarea subulata

+ Ad basin funguli.

Calyx triphyllus; foliolis ovatis acutis petalis duplo triplo bre
vioribus, glabris

Corolla tripetala: petalis oblongis obtusis

Stamina filamenta 6. longitudine corollae, lineares. anthera
a latere interiore

+ Nectarium squama ad fungulum filamentum, corolla triplo brevior
obcordata.

humile Menispermum

Habitat

herb. Thouni

Rami filiformes, iniani. Folia petiolata, ovato-subrotunda, tenuissima venosa
unquiculata. juncea lanescens, State glabra.

Floris non vidi

Cordifolium menispermum

Habitat

herb. Roumii

Caulis tener, glabri. Folia petiolata, cordata, acuminata, venosa, squae nervi
subtus punctis, et glandulosis ad insertionem petioli, glabra spica axillari.

La Marche

Menispermum

Habitat in Zeylona King herb. Royeni 5

Lignum Citrinum. Ramis tomentosis. Petioli basi retorti. Folia subtus tomentosa
Racemi compositi. Flores in capitulis collecti

Momippermium

Grosgulana buccis albis, pediculis floriferis in summo ramo et ex alio foliorum
caudibus Razi hist. plant. 3. dendr. 7.

Habitat in China Finiarville herb. Mus.

Rami villosi, incani. Folia petiolata, ^{multa} pollicaria inferora bipollicaria cordata,
superiora pollicaria, oblensa, emarginata, mucronata, venosa, glabra,
binerviata, nervi incani, supra subarsenia. Umbello axillaribus, pedun-
culata, solitaria; terminales racemosi. Strobili parvi. Baccis orbiculatis,
centro depresso, rugose.

hastatum Menispermum

Habitat herb. tus.

rami teretes, iniani. Solum petiolatum, sesqui pollicaria, subcordato-hastata, 5-que
nervi, mucronata. lobi obtusi, integerrima, supra nudifida, subrenosi, nitida,
pubes villosa iniana

nitidum Menispermum

Habitat in Madagascar herb. fus.

Rami angulati, glabri, striati. Folia petiolata, alterna, spithamea, ovato-oblonga, acuminata, acuta, glaberrima, nitida, tenuis pime venosi, integerrima. Petioli six pollicares, fusco-purpurei. Pedunculi ex axillis supremis, spithamei, flexuosi, fusco-purpureo-antes. Flores paniculati, parvi.

ovale folium Meni spermum

Habitat in India Orientale herb. Musf.
Caulis scandens. Rami tomentosi, incani. Folia alterna, suprema opposita, petio-
lata, basi peltata, ovale-oblonga, mucronata, tri nervia, venosa, sub
emarginata, glabra, aculeo armato velis rari ad presens. Pediculi suprema
axillares, oppositi, terminales pedicelli racemosi, distantibus, subtriplici

9-10 Soula menispermum ^{Menispermum} foliis oblongis glabris, floribus hexandris:

Cebatha edulis Dorsh. descr. pag. 171

Tota glabra

Folia petiolata, oblonga, mucronata, inferiora emarginata.

Petiolis bilineari.

Stipulae uniuersae vix longitudine petolorum

Calyx hexaphyllus, Corollae hexapetala, ut in variis speciebus menispermum.

Radice reniformes, brevis tantummodo in freemine exsertato eque ac in Meni-
sp: hispidis, radicem tamen tertio obpresso. Speciei Menispermum ex India
plures vidi flaminibus b. Variis hujus generis sp. vallis tribus dant, jam
obpresso vit Celeb. Willd. vid. Obserr. Quod pag. 7. ~~Ex~~ his liquet Cebatham

Dorsh. genus ^{non} distinctum ~~non posse~~, sed jure vero Menispermis
associari. ^{potest} Accedit, quod habitu tam simile est Menisp: hispidis, ut limites
vix inveniuntur

9-10 ~~10-11~~

1 canadense m. foliis peltatis cordatis subrotunda angulatis. her. Spei. pl.
reg. 14604

Hedera monophylloï virginiana, convolvuli foliis Plukh. alm
101. t. 36. fig. 2.

Menispermum canadense scandens, umbilicato folio Tournef. art. 1705
p. 311.

Habitat in Virginia, Canada

Caules volubiles contra solem glabrescentes, striati. Folia cordato subrotunda
vel quinquangula vel integra, lamina nervosa venosa
integerrima mucronata bif. tripollicaria. Pedunculi parvi
supra axillis bif. flores racemosi racemi simplices vel
bif. ramosius alterni. petiolo brevior. bractea minuta
subpedicelli linearis

canadense m. foliis subpeltatis cordatis subrotundo angulatis integrisque
glabris, racemi aphylli

2 virginicum M. foliis peltatis cordatis lobatis Lin. S. V.

Menispermum foliis hederaceo Bill. Elth. 227. V. 178. fig. 219

Habitat in Virginia Carolina maritima. 5

• virg. M. foliis subpeltatis cordatis lobatis integrisque utrinque glabris, racemi
apophyllo

non vidi racemi apophylli dixi quoniam bracteae adfuerunt desuerunt vero folia petiolata
subtus villosa ut in sequente Carolina

3 acutum M. foliis cordatis postice angulatis acuminatis, caule tereti striato
Thunb. fl. jap. p. 193. & S. V. pag. 892.

Habitat in Japonia

Caulis volubilis simplex glaber totus. Folia alterna petiolata
profunde cordata, postice angulata, subrotunde ovata, longe
acuminata, integra, nervosa, subtenuolata, supra viridia, subtus
glauca, palmam lata et longa. Petioli folio longiores
flores non vidit Thunbergius

glabris

plant. non vidi

4 Carolinum M. foliis cordatis subtus villosi l. n. V

Habitat in Carolina

Caules densi striati vix villosi. Folii petiolata alterna
basi saepe transversa, acuminata, mucronata, integerrima
basi ^{puberula} utrinque dilatata sublobata, Innervia supra
oculo armato pilis aliquot subtus villositate mollia & n.
pollicaria. floralis ^{et} canaliculata ovata. Rami pedunculati
parum supra axillis foliorum inserti. St. lanato, pube
sente. & c. in axillis foliorum solitarii pedunculati
†

ovato cordatis ^{sublobatis} subtus villosi racemi foliosi †

4. *Antobum M. foliis trilobis Thunb. Fl. jap. p. 194. & L. v. pag. 892.*

Habitat in Japonia

Caulis flexuosus volubilis parum ramosus, uti tota planta hirsuta
et villosus. Folia alternata, petiolata, acuta cum acumi-
ne, integerrima, nervosa, subtus pallidiora, pollicaria
Petioli basi reflexi, unguiculares. Racemi axillares
pedicelli glabri

villosi, racemi axillaribus

6 japonicum M. foliis peltatis rotundato-oratis integris Thunb. fl. jap. p. 193 &
P. V. pag. 842.

Habitat in Japonia India
Caulis ~~volubilis~~ ^{in vasis} teretis glaber ^{in vasis} natus. folia integerrima supra glabra
subtus pallidiora villosa & nervia venosa tripollicaria minus
nata. Pedunculi axillares solitarii pollicares. Pedicelli
quingul. petioli ^{volubiles}. flores subsiles cuncti quatuor
Bacca duo obovata, compressa, latera utroque lacina
magna oblonga, extorsum lineis transversis elevatis
municata

----- oratis integris umbellae axillaribus

7

~~perplois~~ ^{leun} menispermum. ^{libtus subvillosi} foliis ovatis pedunculis tomentosis

Specimen incompletum ad huc usque tamen generis a Thunbergio
ex India orientali; floribus fere deficiente foliis tri-
nerviis rami villosi

^{leun} ~~lanceiforme~~ caule ~~lenticulato~~ foliis ~~curvatis~~ ~~subcarinatis~~ a Thunbergio
absque floribus

① *Empum m. foliis cordatis exquisitis, caule quadrangulo crispo* Linn. 1.

V. p.

Tunis quadrangulani Rumph. Amb. 5. p. 83. t. 44. fig. 1.

Habitat in Bengala.

4 *Cocculus M.* foliis cordatis retusis mucronatis, caule caesoso Lin. S. V. p.

Naspatam Rheed. M. 7. p. 1. t. 1. ?

Cocculus officinarum Bauh. pin. 511. Plukn. mant 52. t.

345. fig. 2.

Arbor aristolochia foliis naspatana, fructu parvo medico adin
star convoluto Plukn. mant alm. 43. t. 13. fig. 2.

Tuba baccifera Rumph. amb. 5. p. 35. t. 22.

Habitat in India.

non vidi

figura Pluknethi minime conveniunt cum Rheed & Rumph
flos micropi in Plukn. Rheed - forte ad molle meum

10 paniculatum M. foliis ^{subnatis} cordato serratis villosis floribus panicula
to racemosis

Habitat in India orientali Honig.
Caulis volubilis fructus pubescens. Corolla petiolata
integerrima mucronata bipollicaria supra glaberrima
venosa, subtus mollia trinervia. Pedunculi axillares
villosi cani. Pedunculi pedales oppositi filiformes
bis bifidi. pedicelli ultimi racemosi flores minuti
extus villosi

aliam a Compositis in Madagascara legitur
molle. M. foliis subrotundo venis nervibus subpeltatis nervis
nervis retusis, quibus tripollicaribus mucronatis
suttus supra utraque molliter villosis suttus
supra venosis pedunculis axillari

11 molle M. ^{subpeltatis} foliis reniformi-subrotundis veluti utrinque molliter villosis
Corymbis axillaribus ternis
Caulis Habitat in Madagascar

• Caulis solubilis utraque omnia villosa ^{grisea} sub~~ana~~ana. foliis
tripolliciana, novem nervia, integerrima subtus
venosa supra undiosa. pet. color longitudine folii
Pedunculi axillares terni filiformes bis bifidi
pedicelli ultimi racemosi

an orbiculatum ha. an varietas fontana paniculata
cum figura coriuli ^{haed} optime convenit an exitar haec
et alter profusus corbulum 2 debui me reddi vana
figura a ^{quasi} hanc utate uti et differentia

16 *Aspidium* M. foliis linearibus lanceolatis ^{ovatis villosis} ~~hirsutis~~ Lin. S. V.

Cocculi indicis altera species minor scandens, vena perveniens
foliis villosis Plukn. amalth. Pl. N. 304. fig. 7.

Habitat in India

Caulis pubescens teres. Rami villosi canescentes. Folia petio-
lata ovata obtusissima subtus villosa tomentosa anter-
dum utrinque, supra villosa sesquipolliciana superiora
oblonga utrinque latitudine aequalia. Flores in corymbis
parvis axillaribus interdum gemini uti reliqua plan-
ta villosa. Bractea dura glabra veniformis medio depre-
sa extus convexa cruris elevatis striata.

Plukn. s. huius forte Champsetat. an myopodeses diver-
sa

villosa subtomentosi mucronati
inferioribus

foliis ovato-oblongis obtusissimis emarginatis mu-
cronatis villosis subtomentosis superioribus oblongis

17 myosotoides M. foliis linear-lanceolatis hispitis Len. l. v

Poiculi indici species minima myosotidis hispitis foliis et saepe

Plukn. Tab. 304. fig. 3.

Habitat in Andra

non vidi

2 orbiculatum M. foliis orbiculatis subtus villosis Hen. P. V

Poticuli orientalis fructus convolvularius, orbiculatis foliis
proxa parte villosis Pluk. in amalth. 61. t. 3 p. 4. fig. 6.

Habitat in Insula Ceylone, Asia.

Caulis volubilis. Folia petiolata, subpeltata ovata cordatis
pubescentibus submarginata mucronata nervosa ut venosa bi-
trypocleana subtus villosa. Petioli foliis longiores ciliati
axillares simplices foliati raris gemini petiolo breviores
foliosi folia cordata et tripartita versus semper minora infera
semper unguiculata conferta

cordatis subpeltatis
axillaribus simplicibus foliosis

racemis

ex mea Len.

radicatum M.

Hab. et

Dedit la Monte

folia ovata-oblonga, subquinqve nerva

glabratum M. foliis ovatis obtusis glaberrimis floribus subglomeratis tomentosis
 Habitat in Cap. b. sp. i.

Caulis striatus glaber. Folia polliciana venosa integerrima
 mucrone minuto primo terminato. Flores minuti.

Es sampelas capensis. caule volubili, foliis ovatis obtusis
 petiolatis integris her. suppl. pag. 432

Rami teretes glabri, contorti, striati. Cineri. Folia petiolata
 semipolliciana, ovata obtusissima avenia subcoriacea, in-
 tegerrima. Pedunculi axillares, multiflori. Flores in ano
 tomentosi herb. Guaf.
 men sp. capensis herb. Guaf.

macrophyllum. M. foliis elliptico ovatis glabris integris racemis
axillaribus decompositis

Habitat in India orientali Honoy,
volubilis rami ferri inciani. folia petiolata alterna sive
pollicaria acuta utraque glabra Unnervia venose.
Peduncululi supra folia cili gemini filiformes sordide con-
tender flores minutissimi

macrophyllum M. folus elliptico-ovatis glabris integris, racemis axillaribus decompositis

Habitat in India orientali. Kunig 5

Volubilis. Rami teretes, inani. Folia petiolata, alternata sive pollicaria, acuta, utraque glabra, trinervi, venosa. Pedunculi gemini, supra folia, filiformes, sordide canescentes. Flores minuti

17 Edule m. foliis ovatis ^{oblongis} glabris, floribus axillaribus subglomeratis glabris

Cebatha edulis Torr. & W. def. p.

Menipp. ermun. Edule foliis oblongis glabris floribus tetrandris
^{Linn. b. Prod. l. 1. pag}
Habitat in Arabia

Caulis filiformis, subtilissime striatus, venosa, subretusa, mucronata
pallidiana vel parum ultra, superiora magis canaliculata. flores
masculi in corymbis parvis. femineorum peduncululi uniflori

fenestralium M.

Ministerium fenestralium Dni pa ovata pubescente inana solitanea
gesta de femine et fruit. Cent. 3. tab 46. fy. 5

michi ignotum

macro

hujus generis J. Aubertoni herb. mei folia 3-5 lobata. Carbona Comnes.
fructus magnitudine Cerasi dentur