

De Menthā vide / mutz
in Act. Soc. Len.

Mentha

1. aunculata M. specis Cylindrici, foliis oblongi petiolatis serratis, caule
hastis, staminibus corolla longioribus
2. cuneiflava M. specis intermixta, foliis ovato petiolatis dentato-⁶spinosis;
3. rugosa M. specis Cylindrici terminalibus, foliis oblongi petiolatis
subtus mollescens rugosi, caule puberulus
4. Hellata M. specis Cylindrici, foliis quaternis lanceolatis serratis glabris
staminibus corolla longioribus
5. nuda M. specis Cylindrici, foliis ovato lanceolatis ssp. lebari
^{tomentosa} tenuiora
6. sylvestris M. specis Cylindrici, foliis oblongi serratis subtus tomentosis
ssp. lebari, staminibus corolla longioribus
7. viridis M. specis Cylindrici, foliis lanceolatis nudis serratis ssp. lebari;
staminibus corolla longioribus
8. rotundifolia M. specis Cylindrici, foliis subrotundis rugosis serratis
ssp. lebari.

9. glabata M. floribus racemosis, foliis ovato-lanceolatis serratis petiolatis
verticillato
10. chenopis m. specie oblongis, foliis ovatis sessilibus pubescentibus villosi serratis,
glabri
staminibus corolla longioribus
11. coifra M. floribus capitatis, foliis cordatis dentatis undulatis sessilibus;
staminibus corollam squantibus
12. herpetia M. floribus capitatis, foliis ovatis serratis subsessilibus pubescenti-
bus, staminibus corolla longioribus
13. aquatica M. floribus capitatis subverticillatisque foliis ovatis serratis
petiolatis, staminibus corolla longioribus
14. pipenta M. floribus capitatis, foliis ovatis petiolatis inedulis fulvi, staminibus
corolla brevioribus
15. sativa M. floribus verticillatis, foliis ovatis acutis simplici serratis, staminibus
corolla longioribus
16. gentiles M. floribus verticillatis, foliis ovatis acutis serratis, staminibus
corolla brevioribus. Calyx inferna corolla acuta
17. arvensis M. floribus verticillatis, foliis ovatis acutis serratis, staminibus
corollam squantibus; calyx inferna corolla obtusa
18. austriaca M. floribus verticillatis, corolla calyx omnibus obtusa
staminibus puberulis villosi, staminibus corolla brevioribus

19. pulegium M. floribus vestiellatis, foliis ovatis obtusis puberulis,
caulinibus puberulis ramentibus, haminibus corolla longioribus
20. ex qua M. floribus vestiellatis, foliis lanceolato-ovatis glabris acuti
integerrimus
21. canaden sis M. floribus vestiellatis, foliis lanceolatis serratis petiolatis
pelosis, haminibus corollam opercularibus
22. corona M. floribus vestiellatis, bracteis palmatis, foliis lineariibus,
haminibus corolla longioribus

Mentha oxycedroides La Manth. forte Cym. menthae sicc.

nudata m. specie oblongis, foliis ovatis serratis vellosis fimbribus l. v. p. 532.

Gaequ. host. 3. v. 87.

Mentha

Habebat in Egypto

Caules semi-pedales erecti tetragonoi inferne glaber purpuratus
superne ut tota planta tomentosa incaha. Rami tetragoni
simplices. Solia pollicaria sursum minora nervosa extorquere
mollissima superne remota porata ^{attenuata} basi interdum integrer
rima. Specie Yerri plerumque Yerri e vertice illes remotiuscula
bi pollicares. calycis vellosi flamina corolla longiora

tomentoso inedina

foliis ovato lanceolatis fimbribus

4 folia. Mentha foliis inferioribus quaternis vesticillatis linearē lanceolatis
semilati

Habitat in India Orientali.

Pauli indicus? erectus; oblongus: rami 4, vesticillati; erecti;
concentrici. Dolia pétiolata; disquipollia aria, vellosa, supra lineata,
areoia, subbasis concentrica nervosa, subvenosa, acuta, basin verso
integerrima, fasciculi foliorum in axillis. Specie Verminalis, que
pétioles arcuatis, crassitibi pennō anserina, Teratas: flore copiosus bimini
confertus omni, parvi. Polygynous villosi. Stamina corolla longiora.

Herb. H. Havn

rugosa M. ? specie Cylindricis Vermena libus, foliis oblongis petiolatis pubes
molles pinnis rugosis caule fructuosa
Habitat in ~~Philippines~~ ^{Tava} ₃

Rami vellosi tomentosi; folia supra viridi subrugosa glabra
ra pubescentia minute pinnis molles pinnata crenata virid
pollicaria ferrata. Specie terminalis terrena cimicifolia
capitula penne cyaneo calyculis rugosis

mentha

an hucus generis corolla desiderantur

borealis Mentha

Habitat in America boreali herb. - Hutch.

Caulis herbaceus, erectus, angulis petiolis retroversis adspersi. Dolia petiolata, pollicaria, oblongo-lanceolata, utrinque acuta, serrata, basi leviter intumescens, glabra, utrinque punctata. Flores vesticellati, pleni, parvi brevissime pedunculati, villoso-pubescentes. Ramina ciliolla breviora stylis longior. Calyx dentes acuti, acut-

cervina^m florum verticillatis, bracteis palmatis, foliis lanceolatis, stamini
bus corolla longioribus. Lin. 1. V.

Pulegum an guttifolium Baeh. p. 222. Mon. Hist. 3. p. 371. f. 11.
V. 7. fig. 7.

Habitat monspelii et ad Rhodanum ⁱⁿ Hispania ^m

Caules glaberrimi ramos albi glabri. Flores unguiculati
lanceolati pubescentes punctata glabra. verticilli
globosi frequentes bracteis geminis trifidis involucratis

Cinnabriga Mentha spicis interruptis; foliis ovatis petiolatis dentato-bi-
ferratis.

Habitat in India orientali Honig

Facies Ozymi.

Panicis ramosis, pilosissimis.

Solia cibaria acuta, leoque pollivana, nervosa, lati basi
separatae exima, pile minutis diffusa, subbas pallidio-

ra.
Spicis axillares, flagrante et terminaliter elongata.

Vestiti illi remoti; multiflori.

Calyces pilosi

Planta genere dubia

~~prostrata. foliis reticatis simplicibusque foliis linearis oblongis
marginis lobatis crenatis prostratis glabris.~~

Habitat in India orientali.

~~Caviles plani subramosi vel simplices pini procumbentes
terrestris subtilissime striatis glutinosis. Dolia petiolata
inferiora ternata suprema simplicia, interdum ter-
nata oblonga virga unguiculata superiore angustiora
ramum longiora subspinea pili rufissimi albidis ad pressis
repido traxi, margine ramum majoribus et aliis exornato
ordendis. Reliqua pedunculata articulata in calycem spiculis
unguiculatis vel ramum ultra terrestres subtilissime striato
glabro linearis stylodacumenato. Pennina glabra minuta
tuberibus minutis et operata.~~

perfoliatus Mentha

ovata *Mentha* foliis ovatis serratis, racemo terminali; floribus
secondis Parva. in vol. 4. pag 36. tab. 360. fig. 1.

Habitat 6

norandi

auricularia. In spicis oblongis, foliis oblongis serratis pilosis hispidae, ramis
nibus corolla longioribus lata. L. S. pag. Mart. D. I. & S. V. pag. 532.
Mentha foetida

Burm. Ind. 126.

Veronica rugosa Cati folia Rey lancea aquatica Burm.

Zeyl. 220.

In agorona foetida Rumph. Am. 6. p. 41. t. 16.

Alopecturus veronica Linn. Zeyl. 411.

Habitat in Indis aquatis vel oceano uno altero ve
Paulis semper erectus herbas. Sola remota inferiora petiolata
et superiora sessilia, pollicina pilosa, inqualiter serratis
inqualibus frequentibus. Spita terminalis sequi pollicia
vis herbæ folio duos parva ad papillæ spicis

cylindricis

petiolatis

stellata M. specie cylindrica, foliis quadratis lanceolatis ferratis glabris
staminibus corolla longioribus.
Mentha stellata: fructu congestis Verminalibus. foliis stellatis
ferratis Lourero fl. Coch. p. 361
Habitat in humido Cochinehino 4
Caule herbarius erectus pedalis. folia obtusa. Lourero

herb. Barthfi

niliacea Mentha ^{Mentha} Tomentosana, fructus oblongi, foliis ovato-lanceolatis
ferratis scabibus.

mentha niliacea fructus oblongi, foliis ovatis ferratis vellosis scabibus.

Lin S. V pug. 532

Mentha longifolia Forsk. Cat. pl. Oy: puc no 289.

(Planta spontanea tota iniana mollissima foliis mollessimis, fructus
biplicatis verticillis confertis)

~~Habitat in Guadeloupe~~

~~Praes herbaceis plures, diffus, verticis, simpliciis; glabri~~

~~Folia alterna distantiæ bipinnata oblonga sibi in petiolam alterna
to, glabra, rorof, integerrima, gamora undulato-dentata~~

~~Pedunculi aër ilano foliari, folio I mido brevior. Flores racemosi~~

~~Bractea membranacea mutata ad usq fragili pedicelli~~

Scholleria Rokin ~~folia macrostachya~~

sylovestris in specie oblongi, foliis oblongis serratis lanceolatis les plicibus; flamen-
bus corolla longioribus luteis. fl. dan. v. 4 v. 24.

mentha sylovestris folio longiore Baub. p. 227.

Mentha sylvestris speciatum, folio longiore cuneato Baub. h. v. 3.

p. 227.

Habita in Europa 4

Caulis sequi pedali ramosus vellosus. Folia majora bipinnata
ana nervosa remote acutae serrata supra puberula pectinis
epilis densi incisa. Specie est apice caulis et ramorum
superiorum bipinnatae: bractea uti calyx vellosi

culta

vndeis M. spicis oblongis, foliis lanceolatis raddi ferratis squalibus, staminibus
corolla longioribus Lin. S. V

mentha Cam. epist. 477.

mentha III. IV Dod. pempt. 95.

mentha angustifolia spicata Bauh. p. 227.

Habitat in germania, Anglia, Gallica

Caules, per quipedales purpureae vallis ranonibus ad pressus ramosis
rami simplices. folia majora bi. triplicaria remote
acute ferratis glab utraque glabra attenuata subtus pallidiora
ad cerasum punetata. spicis terminalis triplicari etul
tra. sed in illis inferioribus remota non bracteo et calycis
subuloso

culta

rotundifolia M. Specie oblongis, foliis subrotundis nigrofusco crenatis per filibus. Linn.

P. V
mentha sylvestris, rotundore folio Baum. p. 227.

Mentha sylvestris, folio nigrofusco rotundore, spontaneum flore piceato
odore gravi Baum. hot 3. p. 219.

Habitat in Anglia aquosa & Hispania aquosa &

Paulis & viles copiose ^{abundant} herbarum copia pubescens herbarum. folia prolixa
na et ultra supra vellosa pubescentia tomentosa in iudea, parum
longiora quam lata pubescentia speciminebus minus tomentosa
punctata copiosa auro nitente adpressa. Specie ter monales
calycibus bracteisque pelosis. stamena corolla longiora

2-3 glabato Mentha glomeris racemofo verticillati; foliis petiolatis ovato lanceolatis ferratis glabris

Mentha Katica; foliis ovato lanceolatis acutis ferratis: ferratis dependentibus. Foschi. descr. pag. 213.

Habitat Katica.

Tota glabra, herbacea. ovule armato

Lolia sempervirens, ramosa, subtus punctata.

Pedunculus terminalis. Flores ^{umbellati} verticillati, pedicellati utrague verticilli 10 flori, qui singulo pedice ^{uniculo parvum} umbellati. Bractea linearis,

longitudine verticilli.

Stamina corolla breviora.

Stylus corolla longior.

211

197

~~Palmata V. foliis palmatis quinque lobo glabri laevis serrato cuspido
umbellulis racemosis~~

~~Habebat in Virginea t.~~

Rami purpureo ~~recto~~ glabri. Solia later bafi fromato.
Coccineo canicollato, attenuata lateralia estis dentibus.
Canicollati intermedii utrinque superne. pupula canicolla
et. Racemus prolians umbellulae approximata

Chenopis. Specie's oblongis, foliis ovatis, pectinibus ^{subtus vellosis}, serratis, ramulis
corolla longioribus
Habitat in China
Caulis ramosus vellosus pubescens, folia vix polliciana
Spica brevis plenumque terminalis

Dubia M. flonibus capite - capitatis, flaminibus corolla brevioribus
foliis crato - lanceolatis serratis acuminatis hispida Vill. fl.
Delph. 2. p. 350. n = 4

inope synoda

crispa M. floribus capitatis, foliis cordatis dentatis undulatis scaphis
staminibus corollam opercularibus den. 1. V

mentha crispa Danica f. germanica fructuosa Monj. Hort. B. p.

367. f. 11. t. 6. fez 5

Habitat in Siberia 4

Paulus pilosus. Tolia pollicaria dentata subcaerulea. Specie terminali
oblonga vix pollicis bractea et calyx villosa

herbata M. glomeris capitatis; foliis ovatis serratis subspatulatis pubescentibus,
flaminibus corolla longioribus Lin-Nant. Pl. & T. V. p. 532.

mentha aquatica herbata f. Sibymbrium hispidae Baum. p. 221 host
3. p. 224.

Sibymbium hispidum Raj ang. 3. p. 233.

M. Mentha Sibymbium hispida glomeris et foliis rotundioribus Raj ang.
3. p. 233 t. 10 fig. 1.

Habitat in aquosis anglis et Hollandia Scandia

Differentia M. aquatica foliis magis spatulatis hispido; calyxes ciliatis

non vidi.

aquatica M. floribus capitatis; foliis ovatis serratis petiolatis, ramulis cordatis longioribus leni. I. V. DC. Dan. v. 673. Spec. pl. pag. 803 &

Sympetrum sylvestre Dalech. nov. 677.

Mentha rotundifolia palustris f. aquatica major Benth. p. n.

p. 227.

Habitat in Europa ad aquas &

Planta non hirta. Verticilli terminali in capitulo fasciis obtusam conferti; &

Caulis in mea valde hirta. Sola pilosa proter capiti cum terminali verticillu et non in axilla ultima confert cum definiat Hall

peperita M: floribus capitatis, foliis ovatis petiolatis, flaminibus corolla bre
vronibus den. s. v.
mentha piperita brevronibus et habitionibus, foliis mentho lusco, fapore
ferrido peperi Ray angl. 3. p. 234. t. 10. fig. 2.

Habitat in Anglia

Caules petiis ransomis adpresso ut folia. folia argente serrata
fructuosa vestitae pectinati. Bractea petiis ransomis ciliatae calyces
glabri nisi ad dentes

fatua M florum verticillatis, foliis ovatis acutis apicis serratis, flammis
bus corolla longioribus l. v. p fl. dan. v. 794.

mentha Cniffo verticillata Baeh. p. n. 227.

mentha Cniffo verticillata folio rotundiore Baeh. hist. 3. p. 215.

Habitat in Europa australi?

mibi adhuc cynote

gentilis
arvensis in florum verticillatis, foliis ovatis acutis serratis, staminebus
corolla brevioribus Spec: pl. p. 80 ex fil. Dan. t. 736.

Mentha aquatica Dcuf. - her. 291

Mentha hortensis verticillata, ocymi odore Baeh. her. p. 227.
mentha verticillata minor acuta non Cypria, odore ocymi Baeh
her. t. 3. p. 216.

Habita in Europa australiori,

similis M. arvensi at minus hispa, caulebus rubris. stamnia
corolla tubo longiora. laetitia corolla inferna acuta. Polycer
ad presi p. n. notio Kepnope

arvensis M. floribus verticillatis, foliis ovatis acutis serratis, staminibus
corollam & petiolaribus spiculatis p. 369 pl. Dan. v. 51.

Mentha arvensis verticillata Baumg. p. 229

Mentha arvensis verticillata procumbens Monf. bot. 3. p. 369 f. 11.

f. 4. f. 5.

Habitat in Europa agni frequenter post messem 2

Caulis glaber ramosus. folia petiolata oblonga ~~follicinae~~
~~glaberrima ex~~ ~~spiculata~~ ferrata, acuta super sericea minima

rotundata Pedicelli capillares Calyces hirsuti

Caulis diffusa ^{ramosa} folia exsiccati vel ultra villosa siccari si posse ramosa.

Folia petiolata, abspiculata ferrata utrique villosa siccari
Ladinia infusa. Vetricilli subrotundi. filamenta corolla longiora
corolla obtusa lata. interdum breviora Pollici.

Calycis ^{for} conopeentes

oblongi petiolati glabri

gentelis M

auctnac'a m floriis verticillatis, corolla lacinia omnibus obtusis, foliis subo-
vatis vellosis, staminibus corolla brevioribus. L. V. p. 533. Gaegu.
auct. s. t. 430.

Habitat.

Specimen a Bell. sub hoc nomine misum
Paulis glaber, ramos. foliis petiolata oblonga, polliciana,
glaberrima, exborsum serrata, acutis, pergam. levigata mi-
nora. Pedicelli capillares. Palycies hirs.

pulegium in floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis puberulentis, caulis
subteretibus serpentibus, ramis in corolla longioribus. Lin. L. V.

Pulegium Euthypni host. 198.

Pulegium latifolium Baum. p. n. 222.

Habitat in Anglia, Gallia, Helvetia inundatis et
caulis ramosis pedatis. Sol glaber. Folia petiolata, oblonga
integerrima vel crenula una alterave rex unguiculata
glabra. verticilli globosi calycis vellosum pulvi ad centem.

estigua M. florum verticillatis, foliis lanceolato-ovatis glabris acutis in
separatis Lin. I. V. pag. Smith. 4c: pag. 30 tab. 30

Pelamotte aquatica belgiana et Mathéoli Lobel. ii 505.

Mentha aquatica estigua Rai angl. p. 232 ?

Habitat in Anglia ?

Paulis adspicendens pubescens; ramosis. Folia petiolata ^{ovalia} acuta
ferruginea utrinque duobus v. tubo venosa via pubescens
pubes pallidiora. Flores verticillati 12. 20 subfusiles. Calyx
pubescens Smith

non ordi

varietas fort e Palequin

canadensis M. florum vesti illatis, foliis lancolatis serratis petiolatis pubes-
centi minibus corollam squamibus hanc Specie: pl. pag. 206x

Habitat in Canada

Differat ex qua caule altiora non ramoso multum pubes. foliis
dimidiis angustioribus, acutioribus, profundiis serratis, obliquiori-
bus, pubes raro ad spissi, recti etiam calyces. Calyces subcylindri-
ci.

nos. vidi

m. caudata
lippymbrina
acuta

} Banks.