

Menyanthes

1. trifoliata M. foliis ternatis
2. ovata M. foliis oblongis, ^{subrotundis} raco paniculato.
3. nymphoi M. foliis cordatis integerrimis, corollis ciliatis
4. indica M. foliis cordato-subrotundis repandis, petiolis floriferis; corollis
interne pelosi lobis approximatis
5. minor M. foliis cordato-ovatis integerrimis, petiolis floriferis
6. reniformis M. foliis reniformibus: lobis distantibus, petiolis floriferis

- *Villosia gmelini* huius pedicet facies *menyanthes nymphoides* herb. Ven.

Cittorale *Hottonia* foliis ovato-oblongis oppositis integerrimis, fl. corymbis axilla-
ribus solitariis pedunculatis. L. fl. Cochinch. pag. 109.

Habitat in littoribus arenosis Cochinchinae.

Caulis sub simplex spinosus & pollicaris erectus. Folia glabra. Flores
nervi. Cal. tubulosus. Corolla hypocrateriformis. Anthera
contorta. Stigma truncato rotundum. Caps. 1 loculari bivalvi
polysperma.

orbiculata M. foliis orbiculatis crenatis peltatis centro floriferis flombus
congestis subsessilibus Ca. Mark. Enc.
Habitat in Africa interiore

non vidi

4 indica M. foliis cordatis subrenatis, petioli floriferis, corollis interne pelosi lin. fr. Rey l.
72. LV.
Nedel ambel Rheed. mal II. p. 55. T. 28.

~~Plu. N. 209 fig. 2.~~

Symphoa araneida Rumph. amb. 6. p. 173. T. 72. fig. 3.

Habitat in Malabaris et Keylono feris

~~Folia plera petiolata polliciana, latiora quam longa, basi
fere auriculata, subtus punctis numerosis fere, uti petioli ad
spira. Petioli saepe spithamoi. Pedunculi parum infra folium
plures inaequales pollicares.~~

Folia crassa arenia subtus punctata saepe spithamoi. Petioli
pedunculi versus folium plures, bi pollicares, flores candidi. Stamina
decem numerat Rheed.

indica M. foliis cordato, subrotundis repandis, petioli floriferis, corollis inter-
ne pelosi

→ nymphoides M. foliis cordatis integerrimis, corollis ciliatis Linn. f. V. p

fl. Dan.

V. 334.

Limnanthemum peltatum Gmel. Act. petrop. 1769. V. 14. p. 527. V. 17. fig. 2.

Nymphaea lutea minor, flore fimbriato Baud. pin. 194.

Habitat in Belgii, Anglia, Holjatis fossis majoribus 4

Folia petiolata nymphaea. cordato subrotunda magis magnitudine
rara a pollicari ad palmare, aevia enervia, majora
subrepanda minora integerrima. peduncululi plures ^{uniflori} at eodem
geniculo at folia plura, petioli parum ^{uniflori} conspicui breviores
Calycis lacinae lanceolatae.

— cordato subrotunda

ovata M. foliis ovatis, petiolatis, caule paniculato Lin. Suppl. p. 133. L. V. p. 194

Habitat in aquis cap. b. frei

Folia radicalia petiolata, pollicibus vel sesquipedibus integra
rima obtusa, avenia, enervia petioli teretes scapo crassiori
scapi erectus, altitudine foliorum. Pedunculi alterni pauci
ramosi remoti filiformes latti, folium lineare lanceolatum
seple unguiculare vel brevius sub singulo pedicello. Calycis
lacina lanceolata
variat scapo altero magis paniculato, foliis quadruplo
majoribus acutis

ovata m. foliis oblongis petiolatis, scapo ~~pauci~~ paniculato

1. *Trifoliata* M. *Solis ternatis* Lin. P. V

fl. Jun. Tab. 541.

Trifolium palustre Bauh. pin. 327

Habitat in Europa palustribus &

Caulis vaginis ^{foliorum} latis tri-ve quadripollicaribus nervosis glabri
scelus *spet hamous*. *folia* petiolata: foliolis *septibus* ellipti-
cis *tripollicaribus* obscuris nervosis, *integerrimis*. petioli
crassitie *per ha* *Columbina*. *scapus* floriferus inter folia
duo ultima, petioli *tenuior* *fractus* *erectus*. *flores* *superne*
altermi *brevissime* *pedicellati*. *Stigma* *oblonga* *ad basin*
singuli. *calycis* *laciniis* *ovato*

6 reniformis M. foliis reniformibus, ^{integerrimis} petiolis floriferis.

Habitat in aquis Insula Bourbonia

Folia plura, petiolata, pollicaria, latiora quam longa,
basi saepe divaricata, subtus punctis numerosis aspersa uti
folia petioli. Petioli saepe pithamosi. Peduncululi paucissimi
infra folia, plures, pollicares inaequales. bracteis ovatis
acuminatis parvis inter peduncululos

minor. Mer. foliis cordato ovatis integerrimis petiolis floriferis
Tjeroca-citambel Rheed. mat. 11. p. 57. tab. 29

Plukh. tab. 207. fig. 3.

Habitat in aquis India et in Insulis maris pacifici.
Similis reliquis folia modo tenuiora, magis oblonga, flores
minores pedunculati filiformes