

Mesembryanthemum

Eula m. foliis equilateris Inquadratis acutis fructis impunctatis conna

fi: canina pubescentis, caule acrijuti. Lin. Spec. pl. pag 695 &

Dicoides f. fides airoides africana major procumbens, triangulari

folio, fructu maximo Eula Herm. Leydb. 244 & 245. Monf. bot. 3.

pag. 506. f. 12. v. 7. fig. 1.

Mesembryanthemum falcatum major, flor. amplo luteo Bell. Elth. 203.

v. 212. fig. 272.

Habitat ad Cap. b. jui 47

glaucium M foliis Inquetis acutis punctatis distinctis, calycinis folio
lis ovatis cordatis. Lin. Spec. pl. pag. 6964

Dicoides f. Tricus airoides africana minor erecta, foliis trian-
gulari glauco, flore luteo Herm. Lugdb. 247. t. 240.

Dicoides africana frutescens, foliis triangulari brevior glauco
Monf. bot. 3. p. 507. f. 12. t. 6. fig. 3.

Dicoides agra, caule lignoso, erecta, foliis triangulari ensiformi
fiatis, flore luteo magno Bradl. juic. 4. p. 15. t. 37.

Mesembryanthemum Scabrum, flore sulphureo convexo Bell. Cat.
256. t. 196. fig. 240.

Habitat ad Cap. b. praetropice
articulatu ramifus glauco ^{ramis} ^{superne} ^{compressi} ^{dichotomi} ⁱⁿ
setae opposit. folia apice parum reflecta unguiculata
internodis breviora. flores et apice ramorum

Perradum M. foliis subulatis Iniquetis punctatis distinctis: angulo lanina
li retrosum serratis Lin. l. v.
Mesembryanthemum serratum flore acetabuliformi luteo Willd. Elth.
249. 8. 192. f. 230.
Habitat ad Cap. b. frei 5

non vid.

puzioni forme M. foliis alternis confectis subulatis Inguetris Longi
fimis impunitatis Len. Hot. Cliff. 216. 24. Mend. 390. S. V.

Sicus capensis caryophylli folio, flore aureo specioso Bradl. Succ.
2. p. 5. T. 14.

Mesembryanthemum folio puzioni formi, flore amplo flamineo Dill.
Eldh. 200. T. 210. Fig. 269.

Habitat ad Cap. b. Insi. Tropica
Caulis glaber. ^{et longis ramis} folia frequentia inferora saepe spithamea
ex opia inferora remotiora et aquia ramorum confecta
Pedunculis Longi. Ver. minale uniflor. Flores in huius
re maximi

molle M. foliis triquetris connatis erectis glaucis impunctatis, ramis
periteretibus, pedunculis axillaribus compressis Hort. Kew. 2. p. 194.
Habitat ad Q. b. freij

non v. d.

Cithenatum M. foliis oblongo-ovatis subtinetis quibus ramentales

hippido, laciniis calycinis foliiformibus Hort. New. 2. p. 194.

α flore luteo

β. flore albo

Habitat ad Cap b. p. 5

non vid.

Corniculatum in foliis Inquetro-semicylindricis scabrido-punctatis. super-
basia linea elevata connatis. Lin. S. V

Mesembryanthemum foliis corniculatis longioribus Dell. Elth.
262. t. 199. fig. 253. 254

Tricoides capensis, foliis Inangulani, flore luteo intus palli-
do Pet. gaz. t. 77. fig. 10

β. Tricoides africana reptans, foliis Inangulani crasso longioribus,
flore luteo intus luteo extus aurantiaco Broudl. succ. 4.
p. 10. t. 40.

Mesembryanthemum foliis corniculatis brevioribus Dell. Elth.
261. t. 198. fig. 252.

Habitat in Africa 4

veniculatum M. foliis Inguetro-cylindricis acutis connatis arcuatis
in punctatis distinctis Lin. Spec. pl. pag. 666

Mesembryanthemum foliis veniculi formibus, floribus mellensis umbel
latis Dill. Elth. 260. V. 203. fig. 259.

Habitat in Africa

micans M. foliis subcylindricis papulosis distinctis, caule scabro Hort.

Cliff. 220. n. 304

Tricoides capensis, tereti folio, flore croceo Pet. gar. 7. 7. fig. 9.

Tricoides capensis, folio tereti argenteo, petalis per pluri mi
aurantiacis Bradl. succ. 1. p. 9. 7. P.

Mesembryanthemum micans, flore phoeniceo: filamentis atris

Hell. Cl. 292. 7. 215. fig. 282.

Et abit ad C. b. p. 17

Ramifolifera Tenues. folia polluciana inferne patentis
lima obtusifolia: laciniis calycis ovata ped unculus
terminalis solitarius uniflorus

grosfum M. foliis subglandulis confertis papulosis, caudicibus basi micosis
Labo, ramis diffusis & labris Hort. Kew. 2. p. 191.
Habitat ad Cap. Spei

va n.:

brachiatum M. Caulebus foliisque cylindricis papulosis, ramis trichoto-
mis Hort. kew. 2. pag. 191.
Habitat ad Cap. b. frei 5

non vid.

bicolorum M. foliis subulatis punctatis lobis d. finitis, caule fru-
tescente, corollis bicoloribus. Lin. Spec. pl. p. 695 + Mill. Syst.

N. 177. fig. 1.

Tecoides f. *Tecus avroides* africana minor erecta, triangulari folio
virens, flore intus aureo, foris purpureo Herm. Lugdb. 250.

N. 249.

Tecoides capensis frutescens, foliis verti punctatis, petalis luteis
Vindl. Juss. 1. p. 977.

Mesembryanthemum venusifolium frutescens, flore croceo Dill.
Eltz. 267. T. 202. fig. 258.

Habitat ad C. b. spec. 5

Vothuopum in foliis planiusculis ovato-oblongis subpapulosis confertis
connatis, calycibus triphyllis bicornibus Lin. Spec. pl. pag. 6404
R. V. Hort. Cliff. 217 no 107

Trochoides capensis prostrans, oleo folio, flore albo medio croceo
15 adl. Jacq. 2. p. 7. t. 16.

Mesembryanthemum *Vothuopum*, foliis sempervivi congestis Dill.
Ceth. 233. v. 101. fy. 222.

Habitat ad Cap. b. Jacq. 2
Carli superne ^{res in} Dichotomii flori dichotomia et apice
pedunculati folia tria calycis ovata corolla longiora
2 cornuta

nomenclatum in foliis planiusculis lato-lanceolatis lobis subili-
atis distinctis, caule pedunculis germinibusque hirsutis Lin. dec.
25. t. 13. f. v. p. 4704 Lin. spec. pl. pag. 6904

Sicoides - species airoides africana major, flore flavo, foliis
plano latior Herm. Lugdb. 25. Seb. mus. 1. p. 29. t. 19. fig. 5.

Habitat ad Cap. bon. spei ☉

Caulis herbaceus palmari teres pelis patulis confertis albis
folia lanceolata - spatulati petiolo basi dilatato lobis
internodiis longior. Pedunculus terminalis caule longior
hirsutus. Calyx reliquis major basi albo villosus laciniis
lanceolato foliaceis corolla longioribus. Petala extensa
lineano

populosum M. foliis oppositis distinctis ovato-spathulatis; papulis subglo-
bosis; calycibus angulatis quinquefidis; ramis angulatis Hort. Kew. 2. 102
Mesembryanthemum populosum foliis oppositis spathulato-oblongis
papulosis; floribus pedunculatis, calycibus linearibus Lin. Suppl.
p. 254. & S. V. p. 470

Mesembryanthemum Aitonii Jacquin. hort. 3. T. 7.

Haec vivat ad Cap. 6 spec. C

Caulis et rami depressi teretes papulosi uti tota planta,
apice dichotomis. Folia amplexicaulia obtusiuscula
Flores ex dichotomia solitarii erecti pedunculati, pedun-
culis filiformibus deflectis. Calyx laciniis inaequalibus
linearibus subulatis. Corolla lactea calyce vix longior. Capsula
depresso nuda

Mesembryanth.

Sesylefloum M. foliis planis spatulatis caulebusque papulosis, ramis
divaricatis, floribus sessilibus Hort. kew. 2. p. 193.
Habitat ad Cap. b. frei ☉

non vidi

Helianthoides M. foliis spatulatis planis lobatis, pedunculis longissi-
mi, calycibus basi planis angulatis Hort. Kew. 2. p. 193.
Habitat ad Cap. b. Spei 5

non vid.

glabrum M. foliis amplexicaulis distinctis spatulatis glaberrimis,
pedunculis longitudine foliorum, calycibus hemisphaericis Hort.

Vew. 2. p. 193.

Habitat ad Cap. b. frei O

non vidi

pennatifidum M. foliis pennatifidis Lin. Suppl. p. 260. & L. V. p. 470.

Habitat ad Cap. b. p. 0

Caulis dichotomus depressus sanguineus. Folia opposita lyrata
vel pennatifida extorsum ^{basi didactyla} parum latiora lobi utraque
3. obtusi oblongi obtusi integerrimi: sinus obtusi. Flores pedun-
culati in dichotomia ^{flavis} foliari ^{capite pedunculati} prosequuntur. Petala
lanicolata. Tota planta adpersa micis vesicularibus
vegetis aut summam tota rubra

ringens M. acaule, foliis elliptico-dentatis punctatis Lin Hort. Cliff. 210

n. 124 Mill. Dict. ^{tab} 177. fig. 2.

caninum a Sidaoides capensis humilis, foliis triangulari prope summitate
tem dentato, flore luteo Brndl. Juss. 2. p. 0. V. 17

Mesembryanthemum rictum caninum referens Dill. Elth. 241.
t. 100. fig. 231.

Selenium B. Sidaoides aspera, foliis triangulari ensiformi crasso breviter
marginibus lateralibus multis majoribus spinis aculeato Mart.
cart. 30. & 30.

Mesembryanthemum rictum selenium representans Dill.
Elth. 240. & 107. fig. 230

Habitat ad Cap. b. Juss. t.

Planta ^{ad radicem confecta} Folia confecta Trigueta polliciana ultra pedunculis unis
pollicianis vel digitali ni planta longiora, superne uncinatis in B. flos
populi

Difforme m. ad caule, foliis difformibus punctatis connatis. Lin. t. V
pag. mill. Diet. Tab. 176. fig. 2.

Siccoides mesembryanthemum crispifolium et valde succulento folio
nigri punctis notato Plukh. alm. 14 p. 7. 325. fig. 4.

Mesembryanthemum foliis difformibus, flore lacteo Bell. l. l. th.
252. t. 144. fig. 241. 242.

Habitat ad C. b. p. 5

Dolabriforme M. caerulea, foliis dolabriformibus punctatis Lin. l. v
puz.

Dicoides capensis humilis, foliis cornua cervi representibus, petalis
luteis, noctiflora Broadl. Jour. l. p. 11. v. 10

Mesembryanthemum folio dolabriforme Dill. Herb. 252. v. 191
puz. 237.

Habitat ad Cap. b. puz. 4

rostratum M. acule, foliis semi-cylindricis externe tuberculatis
connatis Lin. S. V.

Mesembryanthemum rostrum Ares. referens Dill. Cat. 290. 7.

106. Jac. 229.

Habitat ad Cap. Jaci 4

linguiforme M. acule foliis linguiformibus altero margine duculo
nibus impunctatis Lin. S. V.

Mesembryanthemum folio scalpato Dell. Elth. 235. Tab. 103.

fig. 224.

β. Mesembryanthemum folio linguiformi latiore Dell. Elth. 236. γ.

104. fig. 224.

γ. Mesembryanthemum folio linguiformi angustiore Dell. Elth.

230. γ. 105. fig. 226.

δ. Mesembryanthemum folio linguiformi longiore Dell.

Elth. 230. γ. 105. fig. 227.

Habitat ad Cap. 6. spec. 4

flores decaryni; calycis quadrifido

albidum m. caule, foliis inquetis integerrimis Lin. l. v

Suaeda africana, foliis triangulari ensiformi glauco crasso,
flore amplo auro Bradl. juic. 4. p. 20. t. 43.

Mesembryanthemum foliis robustis albicantibus Dill. Elth. 243.
4. 109. fig. 232.

Habitat ad Cap. 6. juic. 4

non rd.

compactum M. acule, foliis connatis punctatis semiteretibus apice lingua
vni subreflexis acutis, floribus sessilibus, calyce sub limbo sic
fido Hort. New. 2. p. 191.
Habitat ad Cap. b. p. 17

non vid.

viridiflorum M. foliis semicylindricis papuloso-pulvis, calycibus
quinquefidis. hirsutis Hort. Kew. 2. p. 196.
Habitat ad Cap. b. p. 17

non vid.

capellare M. foliis contratis venetibus papulosis, caule erecto ramu-
li uniflori ~~uni~~ filiformibus glabris Lin. Suppl. p. 260. S. V.

pag. 470

Habitat ad Cap. 6 spec

non vid.

Lempidum M foliis oppositis spatulatis obtusis scabridis: papulis oblongis,
foliulis calycinis oblongis obtusis medio coarctatis Hort. kew. 2. p. 103.
Habitat ad Cap. b. p. 1. & 0

non vid: