

Mesembryanthemum

*Eleocharis M. foliis oppositis connatis semiteretibus, stipulis membranaceis reflexis laciniis ciliiformibus Hort. Kew. v. p. 179*  
Habitat ad Cap. b. p. 5

non. 9.

pallens M. foliis oppositis amplexicaulis distinctis oblongo-canicola  
si acutis obtuse cinnatis: populis minutis Hort. kew. 2. p. 182.  
Habitat in Cap. b. p. 182.

non vidi.



*Digitalis M. subcaule, foliis alternis verticillis obtusis, floribus axilla-  
ribus sesquibus Hort. Kew 2. p. 101.  
Habitat ad cap. b. p. 5*

non vidi



nodiflorum M. foliis alternis verticillatis obtusis basi ciliatis  
Linn. S. V.

Kali II. Alp. Egypt 125 & 127.

Kali crassula minoris foliis Bauh. pin. 209. Monf. h. 2.  
p. 610. f. 5. & 33. f. 24.

Kali neapolitanum acaulis repens Col. eiphr. 2. p. 72 & 73.

Habitat in Egypto, Barbaria, Neapoli locis arenosis editis  
quo ab aestu maris aperquatur ☉

Caulis teres diffusus alternatim ramosis rami superius  
raris oppositi. folia plerumque alterna flores in  
axillis vel a pice ramulorum sessile

*Crystallinum* M. foliis alternis ovatis papulosis, floribus sessilibus; calyci-  
bus late ovatis acutis retusis Lin. Suppl. p. 460. 239. f. v. 460.

*Tricoides africana*, foliis plantagini undulato micis argen-  
teis adpersis T. Brandt. succ. 5. 8. 15. fig. 40.

*Mesembryanthemum Crystallinum*, plantagini folio undula-  
to Dill. Elth. 231. 7. 100. fig. 21.

*Mesembryanthemum Crystallinum* foliis alternis ovatis pa-  
pulosi undulatis Lin. Spec. pl. pag. 6004

Habitat ad Cap. b. p. 0



Cerei folium Mesembryanthemum

Mesembryanth. cerei folium Gaeyh. coll. 2. p. 319

Habitat in Cap. b. p. p. C

Caulis teretes, ramosi, purpurei, semper alev procumbentes, papulosi.  
Folia lanceolato-cuneiformia, obtusula, opposita integerrima plana  
resilia basi angustata, quodn. pollicaria. Pedunculi aut illares foli-  
tari uniflori 3-4 pollicares. Calyx sedus: laciniis inaequalibus  
patentissimis duo breviora cucullata acuta 3 subprothulata. Petala  
nulla de purpurascantia utraque. Capsula depressa Gaeyh.



*Tripolium* M. foliis alternis lanceolatis planis impunctatis, caulebus laxis,  
simplicibus; calycibus pentagonis. Lin. S. V.

*Tricoides africanum mesembryanthemum* f. *ficus aizooides* major  
procumbens, *Tripolii* folio magis succulento denticulis fimbriato

Plukh. mant. 77. t. 329. fig. 4.

*Mesembryanthemum Tripolii* folio, flore argenteo Dell. Elth. 230.

fig. 179. fig. 226

Habitat ad Cap. 6. p. 8. 2

ex parvis M. foliis planis <sup>in</sup>sculis lanceolatis impunctatis patentibus  
distinctis oppositis alternisque remoto len. S. V  
Ticoidea capensis, folio lato acuto, flore albo intus luteo Pet. gar.  
t. 70. fig. 10

Ticoidea africana procumbens, foliis conjugatis planis lucidis  
Bradl. hist. 3. p. 7. t. 16.

Mesembryanthemum totuosum, foliis sempervivi ex aasis Dell  
Elth. 234. t. 102. fig. 223.

Habitat ad Cap. 6. mai 4

Caulis procumbens ramosis rami oppositi. Folia sessilia  
acuta bipollicaria. Pedunculi terminales caulis et  
ramorum solitarii uniflori.



apetalum M. foliis amplexiculis distinctis lineari-bus supra pla-  
nas internodiis longioribus papulosis: papulis oblongis, floribus  
pedunculatis, calycibus quinque fidi Hort. Kew. 2. p. 100  
mesembryanthemum apetalum: foliis lineari-sublancoatis  
subtus mucronatis, caulibus prostratis Len. Suppl. p. 250. + S. V. p.

<sup>460.</sup>  
mesembryanthemum conicum Jacq. hort. 3. t. 6.  
Habitat ad Cap. b. p. rei

non nisi



criniflorum M. foliis ovatis, capis unifloris Lin. Suppl. p. 254. +  
S. V. pag. 460.

Habitat ad C. b. p. m.

Planta digitalis folia radicalia oblonga in petiolum atten-  
nuata crystallino papulosa <sup>integerrima</sup>. Capis unifloris. Calyx pro-  
funde quinquefidus: laciniis oblongis obtusissimis. Petala 5que  
oblonga pedicellata, calyce longiora alba, stamina stamin-  
alba longissima

— oblongis pedicellatis

*Cordifolium* M. foliis oppositis petiolatis cordatis, calycibus quadripetalo  
caule tereti Hort. kew. 2. p. 102

*Mesembryanthemum cordifolium*: foliis cordatis obtusis, caulebus prostra-  
tis Lin. Suppl. p. 260. Gleason in obs. Bot. p. 22. Tab. 1. fig. a  
Walq. coll. 2. p. 294.

Habitat in Cap. b. nei t

Caulis cuneus glaber <sup>remotissimus</sup> dichotomus prostratus. folia opposita  
unguiculata acuta floes axillares brevissime pedun-  
culati



Rumifosum M. foliis amplexicaulis prothulatis carinatis. papulis  
coniciatis, petalis minutissimis Hort. Kew 2. p. 179.  
Habitat ad Cap. b. p. 179

non videt



Desfructula e m foliis quatuor deiusfatis supra planis Hort. kew. 2. p 181.  
Habitat ad Cap. b. per 5

non vid.

umbellatum M. foliis subulatis scabido-punctatis connatis apice petu-  
lo, caule erecto, corymbo trichotomo. Lin. t. v  
Siccoides africana erecta verticillata, floribus albis umbellatis  
Herm. parad. 166. t. 166. Pluk. p. 117. fig. 1. Bradl  
succ. 4. p. 12. t. 34.  
mesembryanthemum frutescens, floribus albis umbellatis Dill  
Eldh. 277. t. 200. fig. 266.  
Habitat ad Cap. b. pret



calamiforme M. caule, foliis subtentibus adscendentibus impuncta-  
tis connatis, floribus heterogynis. Lin. Spec. pl. pag. 690. & Mill. Dict.

176. fig. 1.

Eucoides capensis humilis, caespitosa, foliis, flore stramineo Bradl. Jour.

2. p. 10. fig. 14.

Mesembryanthemum calamiforme Dill. Elth. 239. v. 106. fig. 220.

Habitat ad Cap. b. p. 4.

non vid.

glaberrima m. foliis subtentibus impunctatis recurvis distinctis congestis <sup>in axillis</sup>  
calycibus digitiformibus terminalibus Lin. Spec. pl. p. 609 &  
Dioides capensis frutescens, foliis variegatis confertis glaucis, floe  
albo Bradl. juv. 1. p. 7. t. 6.

Mesembryanthemum foliis confertis splendens, floe pallido  
Dill. Clth. 270. t. 204. fig. 260

Habitat ad C. b. juv.

rami teretes glabri cortice cinereo punctis albis dispersis. Folia  
triquetra teretifolia apice petiula acuta et unguiculata  
subternodis longiora, axillaria incurva. Corolla flava seorsum  
albida. Calycis erecti digitiformes multii. Flores terminales



caducium M. foliis pliciformi-semiteretibus distinctis: papulis ovatis,  
floribus lateralibus sessilibus; terminalibus pan foliorum cinctis

Hort. Vind. 2. p. 179.

Habitat ad Cap. 6. p. 3.

non vid.

geniculi florum M. Loliis semiteretibus papulosis distinctis, floribus  
sessilibus axillaribus, calycibus quadrifidis An. 1. v.  
Ticoidea capense, foliis tereti, flore albo Pet. gar. 4. 70. fig. 3.  
Ticoidea neapolitana, flore quadrifida candido Bradl.  
succ. 4. 4. 17. fig. 34.

Mesembryanthemum capense geniculiflorum neapolita-  
num creditum Dill. Elth. 271. t. 263. fig. 261.

Habitat ad C. b. p. 7.

Calyx stylis et fructus ut in noctifloro.



capitulum M. foliis semiteretibus papulosis distinctis, floribus sessilibus  
astillanibus, calycibus quinque fideis Lin. Spec. pl. pag. 6884  
~~Faquet. herb. 276~~

Nali III. Alp. Egypt. 129. 7. 120

Nali aegyptiacum, foliis valde longis hirsutis Bauh. pin. 286.

Habitat in Aegypto ☉

Caulis tereti diffusus alternatim ramosis ramis raris  
oppositi folia alterna vel opposita. flores astilla  
res et terminales ramorum ~~subsess~~

Statua et magnitudine noniflori. Caulis trichotomis  
folia internodiis longioribus. flores sessiles in duan  
i adura ramorum. Capsula subrotata s' angulans an  
gulis dilatatis compressis

noctiflorum M. foliis semicyclorhizis impunctatis distinctis, floribus  
pedunculatis, calycibus quadrispidis

Mesembryanthemum noctiflorum flore intus candido extus  
stramineo phoeniceo odoratissimo Will. Elth. 273. t. 206.

Fig. 262.

13. Mesembryanthemum noctiflorum, flore intus candido extus  
stramineo odoratissimo Will. Elth. 274. t. 206. Fig. 263

Habitat ad C. b. p. s. t.

Calyx quadrispidus. Styli 4. fauces quadrispidulani  
Rami <sup>et</sup> cortice cinereo glabri folia vix pollicaria obtusa  
glabra internodiis longiora. Styli 4. fauces 4 loculani. r. d. m. e.  
ta ramulorum in axillis nullo. Flores terminales



*bellioifolium* M. caule foliis Inguetis lineariibus impunctatis; apice  
trifariam dectatis Lin. l. V  
*Mesembryanthemum bellidiflorum* Dill. Cat. 244. 189. fig. 233  
Habitat ad C. b. p. 2

non v.

deltoides M. foliis triquetris deltoidibus dentatis impunctatis distinctis  
Linn. Hort. Cliff. 210. n. 14. Spec. pl. pag. 6904

*Ficus aizoides africana erecta, foliis triangulari breviusculo  
pennatis, floribus roseis odoratis* Volk. hep. 223. t. 224.  
fig. 5.

*Mesembryanthemum deltoides* et dorso et lateribus mucronatis Dill.  
Eltz. 255. t. 195. fig. 246.

B. *Mesembryanthemum deltoides*, dorso et lateribus mucronatis  
magis Dill. Eltz. 254. t. 196. fig. 247.

V. *Mesembryanthemum deltoides* dorso non dorso sed lateribus  
mucronatis Dill. Eltz. 253. t. 195. fig. 243. 244.

Habitat ad Cap. b. pect.



repens M foliis triquetris acutis scabris, caule repente Hort. Kew. 2. p. 105.  
Habitat ad Cap. b. par. 5

non vidi.

Deflexum in foliis triquetris acutis glaucis: punctis obsolete striatis  
Stulis, laciniis calycinis internodiis membranaceis H. Kew.

2. p. 107.

Habitat ad Q. b. p. t.

non vult.



Sclamentosum M. foliis equilateris. Triquetris acutis subpunctatis connatis :  
angulis scabris, ramis hexagonis. Lin. Spci. pl. puz. 6947  
Mesembryanthemum foliatum majus, flore purpureo medicini Dill.  
Eltz. 205. T. 211. Fig. 273.  
Habitat ad Cap. b. p. 4

non ord.

*Stemmadium* M. foliis subtriangulis compressis incurvis punctatis  
diffinis corymbis, basi marginatis. Len. Spec. pl. pag. 6934  
*Mesembryanthemum frutescens*; flore purpureo ranois Lill. Clth.  
279. & 209. fig. 267. 268.  
Habitat ad Cap. b. spec.

non vidi



aureum M. foliis cylindricis Inquetis punctatis distinctis, pistillis atro-  
purpurascensibus Hort. kew. 2. p. 190. Syst. nat. ed. 10. p. 1060.

Habitat ad C. b. freit

Caulis teres puncto purpurascens punctis albis ramis folia  
apice patula pollicaria. Pedunculus elongatus uniflorus  
uti Calyx punctatus

referendum m.