

Mesembryanthemum

Deflexum

Mesembryanthemum folios triquetris acutis punctis obsolete & labiusculis,
laciniis calycinis interioribus membranaceis Hort. Kew. 2. p. 187. Haworth.
mesembr. n. 112.

Habitat in Cap. b. Spec. 3

Frutices vix semipedalis: Rami sparsi, teret adscendentes, teretes, laeves.

Folia in ramulis conferta, in ramis distantia, distincta, vix pollicaria,
basin versus angustata, dorso inferne convexa, superne acuta, glauco
virido, apice purpurascens, lucido punctata. Pedunculis terminalis,
solitarius, unguicularis, glaucus. Calyx turbinatus: lacinae lanceola
tae, mucrone minimo terminatae: tres maxy membrana superne
dilatata ferruginea marginatae. Corolla pallide purpurea; petalis
linearibus, exterioribus emarginatis. *

Cineani 4

~~Gracia Cineani Falgu. coll. 2. p. 103.~~

~~Habitat ad Cap. 6. p. 2.~~

~~affinis habitu et structura florum Gr. falcata. Tota glabra. Folia
cineana, strigula, angusta, altero margine basi vaginaria, disticha, exita
alterna. Scapus plus altior, 8 pollicari, flexuosus, floribus sessilibus. Tribus
quatuorve et secundis terminatus. Inflorescencia falcata petalis utraque albis.~~

an ab Gracia Cineani Thunb. diversa

Violaceum M. folius tetragonis, ^{oppositis} angulis inferioribus mucronatis
Habitat in Cap. bono spei ad fuscum
Caulis glaber teres ramis tam inferis oppositis alternis
superioribus oppositis patentissimis. folia subulato-tetra-
patisima ^{et} glandulosa. nectaria foliacea axillaria. flores ex axi-
lulis ^{et} ramorum et in dichotomia pedunculati

australe M. foliis subtinquetris punctulatis connatis obtusiusculis, caule
tereti repente, pedunculis obtuse angulatis solitariis Hort. Kew 2.
p. 107.

Habitat in nova Zelandia 4

Spinosum M. foliis tereti-triquetris punctatis distinctis, spinis ramis
Lin Hort. Cliff. 216. n. 34

Tricoides africana, aculeis longissimis et folioli nascentibus
ex foliorum alis Tournef. in Act. par. 1705: p. 346. Bradt.
Jurd. 41. 7. 39.

Mesembryanthemum fruticosum, ramis triaxanthis Dill. Elth.
276. 7. 20 p. 268.

Habitat ad C. b. p. 17

Rami teretes plures ramuli apice spinis tubis proliantibus
inferiora pollicari^{curvatis} ^{patentissimis} ^{intermedio} ^{erecto}, laterales saepe iterum
cam rudimenta ^{suprema} ternati. Folia parva ovata triquetra acuta. Flores ⁱⁿ ^o ^{altis} axillares.
in axillis ^{bracteis} ~~sub~~ pedunculati folitarii ^{parvi}

ms

rami et ramuli oppositi, plerumque ramuli duo in apice ramo

rem hab. Mus.

Crassifolium M. foliis semicylindricis impunctatis connatis apice trique-
tris, caule repente semicylindrico. Hort. Cliff. 217. n. 97

Sicoides africana reptans, foliis triangulari rinde, floe saturate
purpureo Bradl. succ. 4. p. 16. 8. 30.

Mesembryanthemum crassifolium repens, floe purpureo Coll. Clith.
266. t. 201. fig. 257.

Habitat ad Cap. 6. Jui 24

Loeum M. foliis semicyliad nris recurvis congestis basi intense gibbis con
natis : ~~caulis fruticosus, ca caule pendulo~~ Lin. spec: pl. pag 694
Mesembryanthemum Loeum Will. Ellh. 264. t. 200. fig. 255.
Habitat ad C. b. p. 4

hippidum m. foliis cylindricis papulosis divinis: caule hirsuto Lin
Speci: pl. rar. 6914

Mesembryanthemum pilosum micans, flore saturata purpureo Dell. Clth.
209. t. 214. fig. 278.

Mesembryanthemum caule hirsuto Hort. Clth. 217. n. 7. 4

B Mesembryanthemum pilosum micans, flore purpureo pallido
re Dell. Clth. 290. t. 214. fig. 280. 279.

V. Siccoides sicut aizoides africana, folio longo tenui
flore aurantia Bradl. Julc. 4. p. 137. 35.

Sicut aizoides verticillata, foliis oppositis rose elegantior
compressis, floribus dilute rosei Walb. h. sp. 221. t. 224
fig. 2.

Mesembryanthemum pilosum micans, flore purpureo
strato Dell. Clth. 291. t. 215. fig. 281.

Habetat ad Cap. 6. speci 5

Caulis cortice ramosis cortice albo adpressis uti pedunculis et rami
pulis albidis rigidis pilis. folia opposita pollicaria internodis longiora
Calyx muticus flores terminales

brevifolium M foliis cylindraceis obtusissimis, papulosis patentibus, ra-
mis diffusis Hort. kew. 2. p. 180.
Habitat ad Cap. b. pret

non vid.

Love M. foliis cylindricis obtusis amplexicaulis lobatis, calyci-
bus quinquefidis: laciniis oblongis obtusis Hort. kew. 2. p. 107
Habitat ad Cap. b. jnei 5

non vidi

glomeratum M. foliis teretibus compressis punctatis diffusis, cau-
le paniculato multiflora. Lin. spec. pl. pag. 694 &
Mesembryanthemum glaberrimum minor, flore carneo minore Willd
Eckh. 2 81. 7. 213. Fig. 274.
Habitat ad Cap. b. spec. 7

non id.

Suberosum M. foliis subulatis papulosis dissectis apice patulis, radice capi-
lata Hort. Cliff. 216. n. 4.

Mesembryanthemum frutescens, radice ingenti tuberosa Dill. Elth.
275. t. 207. fig. 264.

Habitat ad Cap. b. p. i. 5

Caulis ~~conditus~~ rami tortuosi glabri cinerei folia unguiculata approximated
purpureo lori ^{post infundibulum} apice reflexa. Pedunculi terminalis dichotomi: flos dichotomus
pedicellatus

^{triquetri}
Scabrum M. foliis subulatis distentis, subtus undique punctato-municia
tis, calycibus matidis. Hort. Cliff. 219. n. 20.
Meseembryanthemum purpureum scabrum, ramis collectis
Will. Cl. h. 260. t. 197. fig. 257.

Habitat ad C. b. p. 5

Caulis ramosus inferne glaucus per purpureus. Folia pallidiora
internodiis breviora, rudimenta ramorum in axillis. Peduncul
us terminalis uniflorus versus florem incrassatus

emarginatum M. foliis subulatis congestis subsaebris, calycibus perianthi,
petalis emarginatis Lin. 1. V

Tricoides capensis, triangulari folio acuto, flore purpureo Pet.
gar. 4. 77. fig. 3.

Mesembryanthemum purpureum scabrum, flaminibus collectis
et parvis Bull. Elth. 259. 4. 197. fig. 250.

Habitat ad Cap. b. p. i. 5

Venuifolium M. foliis subfili formibus glabris d. striatis inter nodos longis
nibus; caulebus procumbentibus Lin. l. V. p. 4694

Ticoides africana minor procumbens, foliis venis viridi; flore
coriaceo Monf. hist. 3. p. 507. f. 12. v. p. fig. 6.

Ticoides capensis humilis venis foliis, flore coriaceo Bradl. succ.
1. p. 13. t. 9.

Mesembryanthemum Venuifolium procumbens, foliis venis
viridi; flore coriaceo Dill. Clth. 264. v. 201. fig. 256.

Habitat ad C. b. p. 4

Caules lignosi procumbentes rami ex fragulis alis alter
ni superne oppositi. Folia glaberrima pollicaria et ultra
superiora internodiis breviora. Pedunculi terminales
solitarii uniflori lacinis calycis lanceolatae flo
res coriacei

falicatum M. foliis acinatifor mibus impunctatis connatis: angulo
carinali striatis, petalis lanceolatis. Lin G. Cliff. 219. 2194

Scioides agra folio triangulari ensiformi brevissimo, flore dilute
purpureo fente filamentoso B rad. pucc. 5. p. 9. 7. 92.

Mesembryanthemum falicatum minimum, flore purpureo parvo
Will. Ellh. 200. 4. 113. 4. 276.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Confectum m. foliis acinatis formibus obtusis impunctatis connatis; apice
spinosi, caule arceputi. Lin. Spec. pl. p. 694 Gaerq. hort. 1. 7. 26.
Habitat ad cap. b. sp. 4

non vidi

bracteatum M foliis subcinnaeiformibus punctatis apice recurvis,
bracteis amplexicaulis lato-oratis cinnatis Hort. kew. 2. p. 185
mesembryanthemum uncinatum fiabrum, petalis purpureis coriam acis
Dill. Elth. 250. t. 197. fig. 249
Habitat ad Cap. b. p. i. t.

barbatum m. foliis subovatis papulosis distinctis, apice barbato. Lin. Hort.

Cliff. 216. n. 54 Spec. pl. pag 69/4

Dicoides capensis varietati folio: apicibus hirsutis Dill. Pet. 902.

4. 77. fig. 6.

Dicoides capensis fructu pleno, folio humido est semitate stellata, floris
purpureis B. rad. succ. 1. p. 6. 7. 5. et 15.

Mesembryanthemum radiatum, ramuli prostrati recumbentibus.
Dill. Eth. 245. 7. 190. fig. 234.

β. Mesembryanthemum radiatum humile, foliis minoribus Dill.
Eth. 246. 7. 190. fig. 235.

γ. Mesembryanthemum radiatum humile, foliis majoribus Dill.
Eth. 248. 7. 190. fig. 236.

Habitat ad Q. b. spec. 5

Caulis glaber. Folia oblonga cylindrica ^{interioribus brevior} uti calycina apice
fitti 5-7 patentibus, unguiculata ramulorum approximata imbricata
pedunculis versus florem craspor. Petala interiora minima, exteriora alba
flores terminalis

villosum m. foliis pubescentibus cernatis impunctatis, caule piloso-his

Hort. Cliff. 217. n. 64 Spec: pl. pag. 692.

Habitat ad Cap. b. p. 5

non vid.

uncinatum M. articulis caulinis terminatis foliis connatis acuminatis
punctatis subtus dentatis. Lea L.V

Siccoides agra, foliis triangulari glauco perfoliato brevissimis
apice spinoso Bradl. succ. 3. p. 8. t. 27. f. 26. Burm afr.
t. 26. fig. 3.

Mesembryanthemum perfoliatum, foliis majoribus ^{tri-}angularibus Dill
Elth. 250. t. 193. fig. 239.

β. Siccoides africana frutescens perfoliata, foliis triangulari
glauco punctatis Bradl. succ. 5. p. 13. t. 46.
Mesembryanthemum perfoliatum, foliis majoribus trian-
gularibus Dill. Elth. 251. t. 193. fig. 240.

Habitat ad C. b. p. t.

Ramulis alternis ramis glabris cineris. folia frequentia
in pediculis internodiis longiora, triquetra punctata
floris apice ramorum lateralium pedunculatis brevis

canifolium M. folia lanceolata, cuneiformibus oppositis integerrimis planis
sessilibus cauleque ramisque purpureo papulosis Jacq. coll. 2. p. 319
w. var. 2. tab. 41.

non vidi

japonica T.

foliis subcordatis ovatis punctatis, floribus axilla-
ribus solitariis. Herb. fl. jap.

Habitat in Japonia

f. V. p. 467.