

Mespilus

~~hypo~~  
pyrifolia d ed et Desfon

mespilis: maxore anis, latifolius et axillaris dedit Thonin  
axillaris minus longo flexu

*Cuscuta Merpele*

Habitat herb. La Martini

Annis glabri. Spina patentissima, fere pollicaris. Folia sesquipollicaria, subinca-  
ta, subbiserrata, inferne integerrima, acuta, apice obtusiora, glabra, supra lu-  
cida

an eadem ac *Cratogeomys galli*

Mespilus orientalis, Tanacet. folio villosa, magno fructu pentago-  
no, e vidi flavescere Tournef. Bor. pag. 44.  
¶ habitat in Armenia herb. Tournef. 5  
Rami villosi, infero conescit. Eodem saepe plura ex eadem gemma

habes

Mespilus cretica, apii folio laevio, elegantius laciniato nondum patia  
gracorum recentiorum Tournef. Cor. p. 43.  
Habitat in Creta herb. Tournef.

habes

*circinata* et *quasi* Tournesf Cor. pag. 43  
Mespilus cretica folio cordiformi fructu nigro herb. Tournesf

Habitat in Creta herb. Tournesf.

ramosissimus: rami glabri, vana flexi. folia juniora subtus tomentosa,  
etate glabra.

De alp.

habes

Carolinensis Mespilus

Habitat in Carolina herb. la Martini.

Spino longo, recto, patentissimo. Totus glaber. Folia obovata, inaequaliter serrata, estrosum subangulata, tenuissime venosa, supra nitida, infra utrumque incisa unica lobata. Stipulae semicordato-falciatae, serratae, Pedunculi 3-4. unguiculares. Bractea lineares, glanduloso-serratae. Calycis laciniis serratis. Osmectus oblongus, luteus

prunifolia Mespilus

Habitat herb. La Martini  
glaber. Spino pollicari, patentissima. Folia oblongo-ovata, utrinque acuta  
inæqualiter serrata. Calycis et bracteo ut in Mesp. Candianis. Peduncul. plu-  
res, uniflori

*elegans* Mespilus

Habitat herb. La Martini

an varietas Crat. Oxyacantha. Folio trifida: lobus inter medius trifidus  
glabris. Lp. laterales pubescenti. Stylus 1 cur. Omentum pubescens



pauciflorus mespelus

Habitat herb. Ca. Mantini

Rami glabri. Folia aggregata, semipollucaria, oblonga, glabra, subtus venosa, semiloba. Pediculi terminalis, uniflori

*Inlobus Mespilus*

Habitat herb La Mantia

Rami glabri. Spinae patentes. Folia oblonga, unguicularia, margine villosula  
coetanea glabra, apice subtrifida. Coccinea ovata, mucronata, coetanea in  
tegerime. Pedunculi terminalis, uti calycis tomentosi.

*Covigata Mespilus*

Habitat herb. La Martini 4

Glaber. Spinae breves, rectae, unguiculatae. Folia pollicaria, obovata, apice  
subtriloba, obtuse serrata, serraturis mucronatis. Stipula lanceolata, falcata  
serrata. Pedunculi terminales 4-5. Calycis lobi ovati, integerrimi

*apicifolius Mespulus*

Habitat in America Boreali herb-Desfont. Michaux

Rami teretes, superne albido tomentosi. Spina semi pollicares. Folia plura  
ex apice rudimentum ramulorum, petiolata, ovata, incisa, anguiculata: lacini  
nido serrata: serratura angusta, basi acuta, junctura subtus villosa, albida.  
Petioli villosi, albidi longitudine foliorum. Stipula setacea, integerrima. Um-  
bello terminales gradate: radii pilosi semipollicares. Calycis lacini li-  
neari lanceolatis, serratis.

*Fraxinifolia Mespilus*

Habitat in America septentrionali herb Desfont.

Rami teretes, flexuosi, glabri, folia subserrata, aggregata, uncinata, interdum extrosum  
sinuata, obtusa, basi acuta, versus apicem serrata, utrinque glabra, subtus puberula, su-  
pra nitida. Corymbi terminales, compositi. Bractea linearis ad basin pedicellorum.  
Stipula foliata, parva, denticulo uno alterove. Calycis glabri. Spina non vidi

Japonica M. inermis foliis oblongis obtusis apice serratis subtus tomentosis  
Thunb. fl. jap. p. 11. N. pag. 466.

Habitat in Japonia

Rami cespitii penna angustis, tomentosis. Folia vesperis apices ramo  
rami, praethamnia et ultra, basi attenuata in petiolum apice acuta  
est versus serrata, supra vesperis integerrima, subtus tomentosa, junco  
ra utraque Thyris varminalis, tomentosis, compactus herb. Guss.

Lycemalis M. foliis subovatis angulatis serratis lobis petiolatis, floribus  
conymbofis Walt. fl. Car. pag. 440.

Habitat in Carolina herb. Desfont.

Cratogeomys corallina

Tolia sub cordata subquincqueloba lobo intermedio attenuata  
serrata, Est naque glabri flores conymbofi.

remedi

officinali Mepp. foliis angulatis serratis; floribus corymboseis Walt. fl. Car.

pag. 140.

Habitat in Carolina

non vid.



germanica M. inermis, foliis lanceolatis pubescentibus tomentosis, floribus soli-

tanis sessilibus. Lin. Spei: pl. pag. 684. x

Mespilus God. pempt. 801.

Mespilus germanica, foliis laevibus non serratis Bauh. pin. 453.

β. Mespilus, foliis laevibus, major Bauh. pin. 453.

Habitat in Europa australi,

Rami <sup>ut juniores</sup> teretes apice villosi inani. truncis villosi. Tota

externa brevissime petiolata quadripollicaria integerrima

apice <sup>prostrata</sup> <sup>super</sup> oculo armato villo rari villosi. Flores terminalis

Calycei tomentosi laciniis lanceolatis attenuatis

Drupe superne aperta polyperena

arbuti folia M. inermis, foliis lanceolatis crenatis subtus tomentosis Lin.  
S.V. 10.

Sorbus virginiana, folio arbuti Herm. Lycop. 570. V. 690.

Sorbus cui cuparia virginiana, foliis arbuti Brieyn. prodr. 1. p. 15

Protosyris virginiana, foliis arbuti T. Mill. Hist. V. 109

Habitat in Virginia &

Rami teretes glabri juniores tomentosi. folia pollicaria utraque  
acuta venis fine crenata subtus venos pubescens crenae apice  
fuso. Corymbi terminales pauciflori. pedicelli tomentosi argu  
lati. calycis glabriusculi

antrum supra apertum duplicatum sive lobulatae pericarpus ossis  
intus nidulantibus. Pyn speciem nonnulli credunt.

Protosyris longifolia La Moine

Amelanchier M. inermis, foliis ovalibus serratis subter hirsutis V. p. 466.

Gaëque. pl. austr. 3. t. 300 Spec. pl. pag. 685.

Amelanchier galloprovincialis Barr. c. 527.

Siti id est. Clus. hist. 1. p. 75.

Alni effigie, lanato folio, minor Bauh. pin. 452.

Habitat in Helvetia, Austria, G. provincia &

Rami teretes cortice fusco per purpureas & foliiferi  
et floriferi folia petiolata mucronata tenuissime  
perinde sicutis iniana. Rami terminali. Venella  
sola villosa tomentosa adulta fructifera glabra

antrum 10 loculare carnosum

floribus racematis

*Chamaemepulus* M. inermis, foliis ovalibus acute serratis glabris, caule  
floribus corymbofo capitati S.V. p. 466 & ~~Hort.~~ 390 Paqu.  
vrad. 243. Et austr. 3. 4. 231. Spec. pl. pag. 685 &

*Cotoneaster* forte *Genesi* Clus. hist. 1. p. 63.

*Cotoneaster* folio oblongo serrato Bauh. pin. 452.

Habitat in alpebus austriacis pyrenaeis &

Inter humilis ubitalis prostratus de fortis rami teretes

fusci. Folia alterna petiolata Venae ~~canaliculata~~

sempolliciana ~~canaliculata~~ <sup>adulterior</sup> subtus pallidior stipulae lineares  
arquite serratae deciduae. <sup>corymbosus</sup> ~~Rama~~ densa terminalis. Calyx incanus stam. glaber  
petala obovata. flor. digynus

*Potium* biloculare clausum

*Colonafter M. inermis*, foliis ovatis integerrimis acutiusculis subtus  
tomentosis, geminis glabris, bacis di- vel tripermis Hort. kew. 2  
pag. 174

*Chamomespulus Gesneri* Clus. hist. 1. p. 60.

*Chamomespulus cordi* Bauh. pin. 452.

*Chamomespulus folio rotundo non serrato* Bauh. pin.  
452.

~~Chamomespulus~~ *colonafter inermis*, foliis ovatis integerrimis  
se. juv. 4304 L. V. p. 466.

Habitat in Europa frigida in collibus apricis inque  
Pyrenaeis. arvensis

Rami teretes glabri fol. ramuli alterni frequentes breviter  
fimi foliiferi et floriferi folia plura una cum pedun-  
culo ex apice ramulorum <sup>periclytati</sup> oblonga vel ovata vix pollicis  
longa obtusa minus notata supra obscure lineata subtus  
subrenot. Pediculi 2-3. pler. unguiculares plerum  
que simpliciter interdum biflori. Bracteae lineares supra  
medium supra polygona superiore aperta

—oblongis

*Tomentosa M. inermis*, foliis ovatis integerrimis obtusis subtus tomentosis  
germinibus lanatis, bacis pentaspermis Hort kew. 2. p. 174

*Mespulus orientalis* Mill. Dict.

Habitat

5

non vidi

*pyracantha* M. spinosa, foliis lanceolato-ovatis crenatis, calycibus  
fructus obtusis Lin. l. V  
Uva usi Dalech. hist. 134.

*Oxyacantha* Dioscoridis f. Spina acuta, pyriformis Bauh. pin

454.

Habitat in q. provincia, et talis spinosus & apice villosi  
ramuli <sup>spiniferi</sup> glabri cortice fusi. Folia, ramulis apice  
villosi. Folia petiolata, alterna, e gemma pagula plura  
supra nitida obscure venosa ~~et~~ utrinque <sup>glabra</sup> acuta subtus  
paucis pallidiora glabra pollicana et ultra. Corymbi  
terminales compositi Calyces villosi.

*Drypa spirena* floicula vis supeme aperta

lacineata Mespilus foliis obovatis serratis subtus tomentosis, floribus  
solitariis: calycibus lacineatis Walt. fl. Carol. pag. 140  
Habitat in Carolina



canadensis M. inermis, foliis ovato-oblongis glabris serratis acutiusculis  
Lin. S. V.

Mespilus inermis, foliis subtus glabris obverse ovatis Gron. Verz. 54

Habitat in Virginia, Canada &

Rami alteri teretes glabri foliis petiolata alterna  
venosa sesquipedaliana acute serrata utrinque glabra  
acuta venis pum venosa. Rami terminales. Laxi glabri  
palmares pedicelli patentes filiformes uniflori calycis  
laciniis subulata petala cuneata

can. oblongo lanceolati

Syn. speciem nonnulli credunt