

Mesferchia

1. argyrea M. caule herbaceo, foliis sessilibus, corollis infundibuliformibus ^{antheris concisatis}
2. fruticosa M. caule fruticoso, foliis petiolatis, corollis hypocrateriformibus
3. angustifolia

angustifolia M. caule fruticosa, foliis petiolatis lanceo-lanceolatis an
guis la Marti ex
Habitat in Canariis.
similis precedenti sed foliis constantibus angustis an variatur

2 fructuosa M. caule fruticoso, foliis petiolatis, corollis hypocrateriformibus Lin. Suppl.
p. 132. + S.V. p. 190.

Habitat in septentrionalibus plagis Teneriffae

Erudex altus scaber hirtus, ramosus, ramis apice paniculatis. Folium
alterne longe petiolata, ovato-lanceolata, attenuata, integerrima

subtus venosa, supra punctis minutis scabra in spontanea hirta.

Inflo. terminaliter dichotoma, composita Jacq. Tournefortia. bractea
nulla. calyx minutus. corolla sinuanguiculans tubus superne inflatus.

globosus. laciniis limbis subulatis. bacca sicca depressa rotundata,

cineta dentibus 40 prominentibus in circulo longitudinaliter bipartita.
Semina duo in singula parte.

