

Micranthemum <sup>majoribus</sup>  
~~Pal. 4-partitus. Cor. subcampanulata: laciniis duobus inferioribus <sup>4-partitis</sup> superioribus minoribus. Capsula~~  
uniloculari, bivalvi, polysperma

20 Micranthemum. Pal. 4-partitus: laciniis duobus inferioribus majoribus.  
Cor. subcampanulata, 4-partita: lacinia superiore  
minore. Caps. 2-valvis, ~~1~~ loculari, polysperma.

~~prope guleola~~

orbiculatum / Micranthemum

Anonymous umbrosa, caule repente; foliis subrotundis, sessilibus integris oppositis; floribus axillaribus, sessilibus solitariis. Walt. fl. Car.  
63.

# Globigera umbrosa. Gmel. ed. Syst. Lin. Tom. 2. p. 1. p. 32.

Habitatio Carolina Bosc.  
Radices <sup>capillares</sup>

Caulis filiformis, repens, ramosus, glaber, uti tota planta. Folia sessilia, opposita, subrotunda, obsolete nervoso-venosa, patentia. Pedunculi axillares,

res, folio triplo brevioribus, solitariis, alternis

Calyx profunde <sup>quidam</sup> 4-partitus: laciniis spatulatis, duobus superioribus minoribus.

Corolla calycis subaequalis, sub campanulata. Tubus brevis & imus intus glaber, <sup>in</sup>aequaliter quadripartitus, inaequaliter quadripartitus

4-lacinia <sup>inferior majoribus</sup> superioribus <sup>duo</sup> majoribus: laterales parvulae, intermedia inferiorum ceteris majoribus, subovalis, planiuscula.

# Lacinia superior  
minor

Haminae duo, intra faucem insertae, inferiori lacinae corollae parum brevioribus. Filamenta basi appendiculo innata. Antherae didymae, basi leviter bifidae. Germen globosum. Stylus leviter declinatus. Stigma intortum, obliquatum,



depresso-capitata. Capsula calycis persistente vestita, subglobosa, bivalvis,  
unitotulana. Semina numerosa, ovata, striata. Receptaculum centrale, ovale  
Richard.

# Micranthemum orbiculatum; glaberrimum: caulibus filiformi-  
bus, repentibus: foliis orbiculatis, integris, flore longioribus Michaux  
flor. bor. Am. l. p. 10. t. 2.

*Subicflora*