

maritima l. Miegia

Paratropa Pis. nat. br. 238

Demirea maritima Aubl. fl. gu. 45. t. 16.

Habitat in Cajeno maritimo, in Guinea & Thonning &

Radices longe repentes, teretes, articulati, striati. Culmi ex  
articulis radicis, palmares vel semipedales, erecti, rigidi, glabri  
inferne basi foliorum persistenti tacti, superne in ramos  
trai vel quatuor divisi: Rami vagina foliorum tacti. Folia

conferta, disticha, patentia, pollicaria, inferna longiora, sub-  
ulata, rigida, subpergencia, supra canaliculata, subtus convexa  
supra canaliculata, marginibus scaberrima, basi striata.  
Vagina fusco ferruginea. Capitulum terminale, vix semi-  
pollicare, oblongum, subsessile, spiculis imbricatis, ob-  
liquis, foliis brevior. Spicula linear-lanceolata, valvula  
striata, albam ramis longior.

maura W. *Spicae floribus terminalibus spicatis*  
*Antholyza maura corollis regularibus - extus tomentosa* Lin. *Mant*  
*ney. 175*

*Habitat ad latera montium Cap. b. sp. 2*

*Caulis bipedalis, simplex anceps, vaginis foliorum vestitus*

*Folia alterna <sup>opposita</sup> approximata subspathulosa superiora caule*

*altiora fo. capsiformia, striata glabra. Spica terminali*

*folio basi com*

*duplicata intus*

*feruginea*

*composita e spiculis alternis imbricatis. Spatha lanis*

*lata feruginea sub biflora. Corolla tubus limbo luteo*

*extus tomentoso.*

*Thunb. us. gen. 2. p. 34 cum v.*

*Caulis simplicis, floribus terminalibus spicatis extus tomen-*  
*tosis*