

Milium

Milium[?] racemifera Cavan.

Paspalum racemifera Cavan. herb. Mus.

^{miliun}
juncea. *St. panicula simplicii floribus sessilibus lanicolatis attenuatis*

Folii convoluti

Habitat in Andia occidentali v. Pehr 22195

Palmis vixit foliorum tecti. Folia pubulata glabra erecta

in utroque subuloso rariore florenti lanicola pubulata pro valvula

pubulata Calyx brevior ad basin perigoni majoris quam in reliquis.

Valvula altera longior.

Milium nigricans floribus paniculatis confertis, valvula calycinis nitidis
nigriscentibus, foliis ensiformibus longioribus latis fl. Peruv. 1. pag. 47

Colitur in Peruvia

Radix fibrosa. Culmi plurimi, erecti, biogyales, teretes, fusti. Folia lata,
plana, nervosa, nitidiuscula, margine retrorsum serrulata. Panicula mem-
bra, composita, conferta, pedunculis cernuis. Glumae uniflora, sub singulo florculo
fertili alii florculi duo parvi steriles. Valvula nitida. Semen subrotundum, valvula
calycinis nigricantibus involutum fl. Peruv.

Hocci species

coenobifera Milium panicula lassa pedunculis capillanibus glumis
calycinis membranaceis corollina altera aristata Desfont
fl. Atl. pag. 66 tab. 12.
Habitat in fesuni rupum montis Atlas 4

non vido

Compressum M. Jucis subternis: flosculis alternis multatis rachi adpressis
culmo medio articulato compressis, pedunculis longissimis sive. pedis
pag. 24
Habitat in Jamaica

non vidi

effusum M floribus paniculatis dispersis muticis Lin. S. V.

Gramen sylvaticum, panicula miliacea fragra Bauh. pin. 8. Theatr. 1241. Monf
hist. 3. p. 10. 5 fig. 10 Picheux. gram. 133.

Habitat in Europae nemoribus nemorosis & ^{et ultra benedictum} magna subnigula
gramen bipedale ^{et ultra benedictum} erectum folia unquam lata glabra Panic
cula diffusissima pedunculis parvis ^{sextuosi} ^{gemum} saepe reflexis. Floscul.
ovati glabri

filiiforme

Asplenium m. specis digitatis subternis ^{sculis} filiiformibus, floribus ^{adpressis} seu undis glabris
foliis integerrimis villosis
Habitat in gramineis India orientali Konig.

Culmi debiles diffusi simplicissimi pedales, filiiformes glabri
geniculis fuscis. Folia linear-lanceolata ^{obovata} villosa pollicaria
patentia acuta vagina compressa. Spica tres aeri apice
filiiformes bipollicares; flosculi ab altero latere rachidis pedunculati
latere altero adpressi glabri rachis flexuosa glabra

Cimicifuga racemosa digitata, calycum valvula extenore ciliata hinc.

Mant. 184. 4. P. V. pag. 109.

Habitat in Malabano et oppidi Johannis plateis

Culmus pedalis ad sciendes vagini foliorum vertus. folia lanceolata
la acuta pollicaria margine denticulata ciliata. Vagina

foliorum ~~tot~~ punctis pluribus elevatis piliferis fusca racem.

Terminales capillares s. simplicis s. pini digitales pedunculi flexu
osi pericelli alterni uniflori. flosculi ovati Calycii val
vula exten^{altern} ovata ciliata interior^{altern} angustior nuda Petalum
exterior^{altern} angusta terminalis calyce longior

latifolium Melium ~~pana~~ sp. in micropis flopiulis bifanis umbriat;
Melium latifolium Cavan. &c. vol. 3. pag 37. Tab 273.
Habitat in Peru O

Species Paspali

non vidi

tenellum meliū foliis capellanibus, panicula subglobosa
Habitat in Hispania ©

paradoctum m floribus paniculatis aristatis Lin. Spec. pl. pag. 904

Agrosti panicula patente, petalorum aristis terminali recurva Ger.
prov. 81

Cyramen avenaceum paniculatum galloprovinciale, a quo legitur semine
Plukin. alm. 174. t. 32. fig. 2.

Habitat in Gallia meridionali, Barbaria

Culmus bipedalis et ultra, erectus simplicis formis vaginâ
et folia plana striata folia margine siculnuscule panicula
la diffusâ pedunculis flexuosis glomerulis subulatis ^{capis e. panicula panicula} semine nequiu
nitidum apice aristâ decidua calycis longior decidua

ventricosi

ad de syn. Scopul.

confertum Milium floribus paniculatis confertis Lin. S. V. p. 109
Gramen paniculatum alpinum latifolium, panicula melcaica sparsa
Scheuch. gram. 134.

Habitat in Helvetia sylvis

ex specimine a Richardo datum

non vidi.

glabrosum in panicula diffusa, glumis mutis, pedicellis cingulo luteo Thunb. fl.
jap. p. S. V. pag. 109.

Habitat in Japonia

Pulvis simplex exilis pedalis. Tolea vaginantis vaginae fauce
et marginibus ciliatis, canicula fenestrata fiabla integra
marginata, patula ut digitalis. Panicula patula subova-
ta pedicelli infra apicem cingulo luteo. flores ovati
obtusius muti glabri f. f. o. v. r. d. Thunb.

———— obtusius glabris, foliis plano vaginae ciliatis

annulatum Milium ^{panicula alternis panicula ramis propeccisimo} panicula ^{sub} contracta, glum floribus ^{nis} alternis gemisque ^{velo quasi pili} pubescentibus, pedicellatis
pedicellis apice annulo fusco, ^{glabris acutis} foliis ^{involuta} ~~involuta~~ vaginis glabris
Habitat in India Orientali ~~King~~ agri oryzae et ad eorum margines ~~King~~

Similis M. punctato ~~an~~ ~~an~~ ~~an~~

Culmus ^{apicatus} pedalis ^{in propeccisimo} simpliciter glaber. folia subulata ^{alternis simplicissimis} pithamoa remota, glabra,
involuta, collo vaginis ciliata. Pedunculi erecti ^{sesquipedlicares} sesquipedlicares: pedicelli
alterni apice ^{foliis an: apice geminis} ~~involuta~~ annulo latiore fusco acuto. Glum lanceolata
villosa glauculi mutui.

Onclium ramosum: culmo ramoso, glauculi paniculatis sub
binatis hirsutis Presl. obs. 6 pag. 22

Similis punctato ut fere esse se varietas videtur rami paniculi paucis
vel glauculi minus villosi.

~~M. globosum~~ ~~Thunb. adiffis~~ ^{Differentia emendanda} sub nom. Agrost. India misa a Koenig

punctatum M paniculo ramis simplicissimis, floribus alternis geminis
Secundo Am. acad. s. p. 3924

Habitat in Tamaia et India orientali.

Culmi plures simplicissimi erecti glabri corymbi foliorum tecti
folia involuta glabra ramis panicula palmari et ultra
ramis alternis frequentes bipollicares angulati pedicelli gemini
apice dilatati folioli basi annulo fusco lanicolati villosi villos
adpressi mutici

acuti
villosi, pedicelli annulati
corymbis glabris

Cyperus Milium panicula capillari, calycibus acuminatis, corollis aristis terminali
curva Mart. 105 * S. V. p. 109.

Habitat ad Q. bono prei.

Pulmi palmares, laves, teneriores. Folia angusta, subtus sparse pilosa,
fauce barbata. Panicula undique dispersa. Pedicelli pilo teneriores.
Calyx valvulis ovatis, subventricosis, acuminatis, longit. d. ine aequalibus.
Semen longitudine calycis; arista terminali, curvata, flore longior
Len. M. C. C.

non vidi

Digitatum *M. spicis*, digitatis subquaternis, subsimplex, flosculis muticis
adpressis secundis, foliis margine cartilagineo serratis in prodr. par.

274.

habitat in Jamaica

non vidi

Panicum ^{sp.} in subdigitatis alternis approximatis filiformibus; flosculis
secundis muticis adpressis trigonis Sw. prodr. pag. 24.
Habitat in Jamaica.

non vidi

capillare M. panicula diffusissima capillari, glomerulis minutis glabris
nutantibus foliis villosis

Milium capillare panicula diffusissima, pedunculi longissimi
capillaribus; floribus nutantibus Rottb. Diss. pl. Surin. pag 3.

Habitat Surinami

Culmus Vesic exilis altissimus geniculo nigricanti. Folium
lanceolata semper unguem longa 3 pollicaria vel ultra
sternata villosa vagina glabra ore barbata. Panicula
pedalis ramosissima rami capillari flexuosi pedicelli
unquiculari. flores minuti oblongi semina flavum nitidum

ramosum ~~Melium~~, Culmo ramoso foliis paniculatis subbinatis hirsutis Retz. off.

G. p. 2.

Habitat in India orientali.

radicosum Melium? racemo simplicis pro flosculis obovatis seminibus antheris
elongata flexuosa

Habitat in Bononia Rommeson dedit Dr. Thaurin

Caumi plures filiformes palmari vel ultra simplicis pro
glabri bracte. folia filiformi glabra culmo dimidio
minora. vagina suprema laxa subspathacea Racemus
terminalis simplicis pro pedicelli gemini, flori alter parte
longior. flosculi crassi et subrotundo obovati arandi purpurea
scanti valvula calycis ovata acuminata concava semen tam
pressum orbiculatum infra a basi calycis triplo longior
flexuosa

an hujus generis stamina non vidi flosculi omnes fertiles

vellosum ~~in~~ panicula laxa floculis muticis, calycibus lanatis. Sw. prodr
p. 24.

~~Andropogon furcatus~~

Anfulare A. panicula laxa glabra, flosculis geminis muticis, pedicello altero
brevis, calycibus lanatis Lin. Am. ac ad 1400 s. p. 412. W. of. p. 383
Eragrostis arenaceum, panicula minus sparsa, glumis alba
senesca lanugine obductis Sloan bot. 1. p. 43. t. 14. fig. 2.
Panicum lanatum panicula raris coarctata, floribus binatis, loba appressa
heris Rottb. Dis. pl. Linn. pag. 1. Tab. 1. fig. 2.

Habitat in Jamaica

Culmus gracilis, basi ramosus, nodis superioribus remotissimis. Folia
lanicolato-linearia, striata, Panicula terminalis, rami erecti
inquieti angulis scabris. ~~Panicula~~ ^{calyx} ~~subgemini~~ flosculi gemini
alter pedicellatus, alter sessilis, interdum solitarii extra lanuginosi
testi. Valvula calycina tripartita (secundum Rottb.) valvula lanicolata
exterior minor.

villosum Melum panicula laxa flosculis muticis, calycibus lana-
tis Sw. prodr. pag. 24

~~alio forte generis.~~

~~Roos t. 14. fig. 2.~~

Schoenus fabri Rottb. est varietas non prope
hujus