

Millena

Coublandia Miller

Coublandia Aubl.

Mullena

Habitat in Peru

Caulis teres, erectus, levis, glaber uti tota planta. Rami oppositi, caule altis
ves. Solia petiolata, opposita, sesquipedicaria, ^{tripartita} lanceolata, extus & un-
leviter serrata, obscure venosa, trinervia, subtus glauca centia. Petio-
li connati. Pedunculi axillares, solitarii, terminales saepe quatuor, semi-
pedicarias, inaequales. Flores fasciculati 3-10, parvi, flavi. Calyx triphyl-
lus: foliola lanceolata, extus convexa, intus concava, obtusa, aequalia. Flores
quatuor, infundibuliformis unicus ligulatus, foemineus: lamina oblonga sub-
rotunda, ^{indistincta} ~~conspicua~~, dorso convexa, tubo brevissimo, reliqui infundibuli formae, dimi-
to quinque fito, tubos longitudine calycis, hermaphroditi. Ladum involutis
hermaphroditi. Hermaphroditi stigma subbifidum, semen emartidum
foemineorum cuneatum, sulcatum, nigrum. Pappus nullus. Receptaculum
nudum

et calycis involu-
to

angustifolia Millena folis linearibus acutis connatis. Invenitur ab
late scripto Edwin Her. vol. 3. pag. 12. tab. 223.
Habitat in nova Hispania O.

non vidi.

quinqueflora M foliis cordatis, pedunculis dichotomis Hort. Clif. 425 Mart. 470

Mullena annua erecta, floribus fricatis luteis Mart. Cent 47. 41.

β. Mullena annua ramifica, foliis maculatis profundius serratis Mart. Cent
47. 1. 47. 42.

Habitat in Panama, Vera Cruz &

Caulis striatus glaber. Rami axillares juniores apice tomentosi
incani. Folia petiolata, opposita, trinervia, ovato cordatis, serratis
substrigata, venis renotis, pedunculi.

~~pubescenti~~ ^{et axillares juniores una cum foliis, floribus}
ex apice caulis et ramorum folia duo petiolata lanceo

~~et tomentosi incani~~ ^{late} sub dichotomia pedunculi pubescentes

— ovato cordatis

biflora *Mulleria foliosoratis*, pedunculis simplicissimis Hort. Cliff. 425. t. 25. & Loepl. t. 239.
Mulleria annua erecta minor, foliis parietanis, floribus ex foliorum alis Mart. Cent. 47.

t. 47. f. 1.

Habitat in Campuchia O

Folii sub inflorescentia lanceolata & utroque armato pili raris
pilis adpressis

Contrajerba Melleria caule sulcato ramis oppositi decussatis, fo-
liis lanceolatis serratis, floribus glomeratis Cav. vi. 1. pag. 2.

Tab. 4. 4

Eupatonoides foliis folio Vriinervi, flore luteo vulgo con-
trajerba Sewall. at pag. 10 Tab. 14

Habitat in Pem O

Caulis angulatus sulcatus folia opposita petio late
glabra pedunculis axillares folio breviori filiformes
ad basim florum folia duo.

— foliis lanceolatis serratis, floribus glomeratis