

Mimosa

Falis bigemina

Linguis cati M. spinosa, foliis trigeminis obtusis. Lin. S. V.

Acacia quodammodo accedens s. Ceratonia et Acacia, media jamai-
censis spinosa, trigeminatis foliis Plum. Phys. 1. fig. 6

Habitat in Jamaica Barbis ramuli angulati glabri.

Rami teretes punctati flexuosi uneresi teres. Colicis trigeminis petiolis
bipartitis singulo terminatus foliis geminis rarius 4. Soleola obova
ta obtusa ^{emina} ~~interna~~ venosa, glaberrima pollicaria. glandulas ad
divisuram interpinnae spina scabra brevis valida utrinque.
Peduncululi axillares et ter minales laterales solitarii termi-
nales racemosi. Flores capitati. Legumen compressum horum
vorsum flexu ^{torum} s. 6. spernum. Semina atra membrana colici-
nea adnata

Acacia quadrifolia siliquis circinatis Plum. u. 4

foliis trigeminis obtusis aculeis rectis

Plum. Syn. ^{u. 4.} quod idem cum circinali Aubl. vix huc pertinet

mellifera

7. Soph. halmica ~~Mimosa~~ Mimosa spinosa, foliis brevibus obtusis, aculeis recurvis.

Mimosa unguis cati Torr. Defr. pag. 176

Similis omnino quoad folia M. unguis cati at stipulo minore, Legumina
ensiformia compressa nec cirinata, Flores in speciminibus ^{Torrill.} non
adsunt ~~adsunt~~ glandula ad basin petioli nec inter folia. Flores in
speciminibus herb. Torrill. non adsunt

Mimosa foliis by amenis: folioli ^{oblongis} obtusis, capitulis racemosis, racemis elongatis
flexuosis

Acacia Lusit. Vastia Chamotitl Camelli &c.

Habitat in India Orientali Herb. Fusioi

Rami angulati, cinerei, glabri, folia petiolata: foliola pollicaria, glabra, ^{oblonga,}
venosa, subtus pallida, altero latere ~~pallidiora~~ ^{angustiora} Petiolus aequalis, supra
canaliculatus: glandula sessilis parva inter panam et in apice petioli
communis. Spinae duo, parvae, erectae. Racemi spithamei. Pedunculus
angulatus, striatus, superne tomentosus. Capitula sparsa: juncea septem
adulterum pedicellata, multiflora. Flores parvi, Calyx canescentes:
Legumina in annulo cincta, linearia, vix unguem lata, acuminata
glabra, compressa.

bractifolia memosa folio trigemino: folioli obovatis mucronatis, spicis capitatis pedunculatis, pedunculis elongatis.

Habitat herb. Tusf. forte Ind. Occid.

Rami angulati, flexuosi, glabri. Folii sparsi: foliola unguiculata, glaberrima supra nitida, altero latere basin versus sensim angustata, venosa, venis exstantibus, subtus pallidiora, subsessilia, obtusa, saepe emarginata. Petioli aequales, supra canaliculatus; glandula cava in apice petioli communis, nulla in partialibus. Spinae duae erectae. Pedunculus folio longior, angulatus, glaber. Flores circiter 20 in capitulo collecti conferti. Calyx dentatus. Stamina longissima

Великолистная Mimosa foliis byzantinis obovatis mucronatis, pappi capitulo pedic.

Saporana Memora inermis, folio bigemini pennatisque, panicula terminali
Ei Cour. fl. coch. pag 653.

Cortex saporanus Rumph. amb. l. 6. (t. 72. tab. 66.

Habitat in fylis Cochinchina

Frutex arboreus. Folia impari pennata vel bigemina. foliola
ovata, acuminata, petiolata.

an bigemina her

non vidi

octophylla Mimosa villosa, foliis quaternato geminatis, spicis subcapitatis.

Habitat. herb. Tuss

Inermis. Rami teretes, villosi, cinerei. Folia petiolata, una oblonga, altera late
re angustiora obtusa, villosa, venosa, duo foliola ^{intermedia} ad ~~latera~~ apicem singuli petio-
nalis, altera ^{sem} semiunguiculari, altera ^{quadruplo} quadruplo minoribus, duo in petioli partiali-
bus subqualiter, fere unguicularia. Petiolus aequalis. Glandula nulla. Spini-
cula foliacea in apice petiolorum partialium. Bipulo lanceolata striata. Pedun-
culi tripollicares, teretes, axillares, villosi. Flores ad apicem pedunculi
in capitulo oblongo, sessiles conferti. Bractea lineares, angustae. Calyces
colorati, uti bractea villosi, squidentati. Corolla versus apicem subnigra.
Stamina corolla longiora.

Vergemina M. inermis, foliis Vergeminiis Lin. Spec. pl. p. 1499, Jacq.

Alia fructificans non aculeata, flore purpurascente Plum. spec.
17. t. 10. fig. 1.

Habitat in America meridionali: h. herb. Surson

Petiolus bifidus: pedicello singolo terminato foliis duobus p. d.
in super foliola duo opposita ad divanationes petioli communis
Lin. Legumen compressum, acuminatum, uniloculare, bivalve. Semi
na subovata, at sa nitida Jacq.

Rami teretes glabri, cortice cineres. Foliola oblonga, altero latere angu
stiori, obtusa, mucronata terminata, venosa, glabri, semipollicaria
duo ad basin petiolonum partium minorum, duo in apice petioli se
toli

~~michiganota~~