

# Mimulus

1. rugens M. erectus, foliis lanceolato-oblongis serratis
2. alatus M. erectus, foliis ovato-lanceolatis petiolatis caule alato
3. luteus M. repens, foliis ovatis

Cubens M. repens foliis ovatis Lea L.V

Gratiola foliis subrotundis nervosis, floribus luteis Jacq. peruv. 2 p 747  
74 s. 8. 34.

Habitat in Peruv herb Thonum. et hinc f.

Caulis repens, et tota planta glaber. Folia spatulata, lamina  
ovata, inaequaliter dentato serrata, <sup>intendum nullum</sup> <sup>arsenium</sup> semipollucaria. Pedunculi  
axillares solitarii, uniflori, folio breviores. Calycis dentes ovati.  
Flores parvi

nuyens: M. erectus, foliis oblongis linearibus sessilibus Hort. Act. upf. 1741.

p. 82. Hort. Upf. 176. t. 2.

*Digitalis perfoliata* glabra Monf. hist. 2. p. 479. f. 5. t. 0. fig. 6.

*Euphrasia floridana*, *Lysimachia* glabra fleguosa foliis, quadra  
to caule ramosis Plut. in amal. 03. t. 393. fig. 3.

Habitat in Virginia, Canada &

caulis erectus tetragonus glaber. foliis <sup>opposita</sup> subsessilia lanceolata  
extremum serrata venosa glabra basi attenuata. <sup>bi</sup> tripollicaria  
pedunculis axillaribus solitariis unifloris bipollicaribus.

lanceolatis ell lanceolatis

alatus Mimulus <sup>Mimulus</sup> erectus, foliis ovatis petiolatis, caule tetragono Hort. Kew 2. p. 361.

Habitat in America septentrionali

Caules <sup>caules m. nongenti</sup> et membranis quatuor a basi petiolorum decurrentibus alatus, simplex,  
ubi tota planta glabra, superne ramulo uno alterove

Folia petiolata, bipollicaria, ovato-lanceolata, venosa, inaequaliter serrata

Pedunculi axillares, solitarii, oppositi, unguiculati, tetragoni, superne  
cras inerstati

Calyx longitudine pedunculi; laciniis rotundatis, mucronatis.

Corolla calyce parum longior.

elliptico <sup>ovato</sup> lanceolato