

Minuaria

Campetris M. floribus Verminalibus alternis, bractea longioribus

det. Holm 1750. fig. 3. L. S. 1224

Habitat in Hispania collibus planis.

Folia subulata rigida, glabra. Caulis simplicis spines
breves spinos mediis anguis, teres foliis testu. Folia opposita
ferrata. Flores terminales in capitulo compactum fastigia-
tum inaequales, spiculis in aliis foliis summosa subcristo-
mina

non vid.
in Arenaria Testacea

montana M. glombris lateralebus alternis tracta brevioribus Alt. Holm
1750. t. 1. fig. 4. Mant. 320. 1. V. p. 130 + Leyd. 17. 122. Tab. 1.

fig. 4.

Habitat in Hispania collibus altis.

Ramulis sope vs pollicaris interdum digitalis e rectis bafi
ramosus; percurrentes velloides folia subula ^{ramosa} ferruginea
culana glabra. Flores axillares solitari operculi vel plures conniv.
fructulati

fructus fructuosa

Dichotoma M. floribus confertis Dichotomis Act. holm 1750. t. 1. fig. 4.

Linn Spec. pl. p. 227

Munuscula foliis planis, caule simplici erecto, floribus spathulis confer
Vira Dichotomis loc. cit. t. 121. fig. 5.

Habitat in Hispania

Caules plante plurimi erecti digitales simplices sumi adreducuntur
Tereti vellosum foliis secum vestit. Quatuor radicum semipedalis
Globose ramosque rami alterni distantes
folia opposita subulate angustiulae capi coronatae
gratae. Caulis per partem opere flore primum in capitulo collectus
deinde in ramis duobus confertim dichotomis longitudine caulis
floris insanguula dichotomia sessiles vellosum conato subulati