

Mollugo

nudis caulibus Mollugo foliis radicalibus oblongis confertis for-
mis trichotomo-paniculatis decumbentibus nudis.

Alpine foliis ad radicem poritis Burm. Zeyl. 14 t. 87. 2.
hab. Ind. orient.

Radix simplex perpendicularis

Folia radicalia glauco-viridia oblonga obtusa basi
in petiolum attenuata integerrima obsolete venosa
utrinque glabra.

Scapi radicales decumbentes nudis summi glabri
trichotomo-paniculati.

Bractea parva membranacea ad paniculae divisiones
oppositae oblongae.

Semina subrotunda nigra, sub lente maturis
elevatis obsita.

Stipularia Mollugo foliis quinis subuncatis glabris, pedunculis lateralibus,
terminalibusque ^{sub} diu holornis

Habitata in Guinea Test.

Caules decumbentes, tenues, ope lentis villosi, varicosi. Folia subpeltata
semipollicaria, inequalia, acuta, basi angustata. Stipulae hyalinae, breves

Pedunculi 1.2.3. trifidi. Flores parvi, sessiles, aequae ac in Dichotomia.

Bractes duae hyalinae ad basin singuli floris. Calycis foliola lanceolata,
marginibus hyalina. Folia dicta ad singulam dichotomiam.

Dichotoma Mollugo foliis quaternis lanceolato subcuneatis glabris, pedunculis
unifloris, caule procumbente
Habitat in Guinea West

Caules herbaei, elongati, dichotome divisi, inferne radicales, superne oculo
armato villosuli. Folia petiolata, basi attenuata, apice acuta, vix polli-
cena, arena, inaequalia. Pedunculi axillares, plures, fructi sex ve
flecti, longitudine foliorum

Facies Pharnaci: mollugini hinc ulterius conferendi non dubito quia eadem
sit ac ut Thonmayeri hinc Ph. moll.

Mollugo radicata caulibus procumbentibus radiatis, foliis obovatis acumina-
ti. fl. Peruv. 1. pag 48.

Habitat in inundatis Chili

Caulis plerumque herbacei, radiatum periti procumbentes, fruticatosi; dichotomi-
ter pubescentes. Folia opposita, petiolata, integerrima, nonnulla
axillaria multo breviora. Flores axillares, sessile conferti. Calyx clausus,
fl. Peruv

racemosa mollis. foliis subquaternis lanceolatis, floribus racemosis, caule
angulata Lamour. T. Enc. 228
Habitat in India orientali
an m. stricte h.

hinc hinc sub nota

triphylla Mollejo foliis ternis. Concoloratis, pedunculis dichotomis nervis
fl. cort. pag. 62.

Habitat Cantone Guzman

Caulis herbaceus diffusus tetragonus semipedalis. folia glabra cute
gerrima sessilia. pedunculi laterales et terminales dichotomi
apice tricorni. Stigmata 3. sessilia subovata. Capsula ovata, globa
lobulata trivalvis.

non vid.

Stenota m. foliis subquaternis lanceolatis, floribus paniculatis mu-
scantibus, caule erecto angulato *Her. t. v. p. 129* *Spec. pl. reg. 1318*
Alfisi multiflora glombunda glabra benzalepsi Plukh.

tab. 256. fig. 2

Alfise erecta pentaphylla, flore albo *Burm. Zeyl. 31. t. 5. fig. 3.*

Habitat in Asia \odot

Caules plures erecti siculi pili formes - glabri *Superna*
panum ramosi palmari. folia sessilia 35-45. *Suprema*
interdum foliola linear lanceolata utraque acuta
glabra avenia integerrima pollicari inaequalia pan-
culo laterales et terminales pedunculis capellanti

utroque acuta

pentaphylla M. Folis quinis obovatis aequalibus, floribus paniculatis
Linn. fl. Zeyl. 51. t. V.

Alfene ramosa procumbens quadrifolia, ad radicem polyphylla Burm
Zeyl. 13. t. 3. fig. 12.

Habitat in Zeylona

~~Caules~~ Caules procumbentes & diffusi plures subramosi
Folia ^{subsessile} quae inferne quina ^{avenae} caeterum 7. superne 2 vel 3 unci
folia q' pollicina ^{caetera folia et} inaequalia glabra integerrima
mucronata. Panicula terminalis dichotoma pedunculata
et capillares. bracteis duobus minutis ad ramificationem

subquincunariis fortiter ^{obtusis} mucronatis

vesticillata M. foliis vesticillatis cuneiformibus acutis, caule subdini-
fo decumbente, pedunculis unifloris Linn. S. V

Alfene spurgula mariana, latiori folio, floribus ad nodos pediculis curvis
circa caulem infidentibus, calycibus eleganter punctatis Plukenet
g. T. 432. fig. 8.

Habitat in Virginia O

Alfene procumbens, galii facie Ehrh. part. 6. fig. 3.

Habitat in Virginia O

Caulis dichotome ramosus Diffusus glaber uti tota
planta. folia petiolata 3-5-6. polliciana inaequa
ter basif lanceolata basi attenuata apice acuta avena
interiora pedunculi axillares 4-5 vesticillati uni-
flori folia breviores

oppositifolia M. foliis oppositis lancicollatis, ramis alternis, pedunculis
tabularibus confertis unifloris. An fl. Zeyl. 524

Alpine Spargula facie bengalensi foliis angustis Planch. alm. 21.

8. 25. 6. fig 25. fig. 6

Habitat in Zeylona C

Rami longe diffusi glabri alterni. Folia opposita lancicollata
glabra in petiolum depresso. Pedunculi plures oppositi
capillares uniflori axillares. Calyces 5 phylli stamina 9.

Lin.

non vid.