

# Momordica

1. Balsamina M. pomis angulatis tuberculatis, foliis glabris patenti palmatis
2. Charantia M. pomis angulatis tuberculatis, foliis villosi longiitudinaliter palmatis
3. Operculata M. pomis angulatis tuberculatis, apice dei duo operculatis, foliis lobatis
4. Cuffia M. pomis oblongis: foliis catenulatis, foliis incisivi
5. Cylindrica M. pomis cylindricis longispinis, foliis angulatis acutis
6. Trifolia M. pomis ovatis mucronatis, foliis ternatis dentatis
7. pedata M. pomis striatis, foliis pedatis serratis
8. elatenum M. pomis hispida, cinctis nullis

Plantam a Canariis dedit Le Dou an hujus generis

foetida Momordica foliis cordatis denticulatis glabris

Habitat in Guinea Thomson

carpinifolia Grewia foliis <sup>sub</sup> cordato-oblongis peltatis glabris serrulatis, pedunculis  
axillaribus terminalibus, solitariis brevissimis subtriplois

Habitatio Guinæa p. 25

Rami scabri, superni sordide cinerei. Folia bipollicaria, utrinque glabra,  
<sup>oppositis</sup> obtusiuscula. Stipulae setaceae. Flores ante explicationem cylindrici,

hastata Momordia folio sagittato-hastato, <sup>8 lobis</sup> auriculis divinis catis, postice angulatis  
8 lobis

Habitat in Guinea. F. Bert.

Caules filiformes. Folio fere triangulari, supra punctata, pubes. Corolla  
lobi acuti, postice in inferioribus dente angulati, 8-avenia.

Momordica

Momordica luffa Commeson

Habitat in Insula Francia herb. Hasl.

Caules angulati, <sup>remati</sup> superne villosi. Folia palmata, basi cordata, dentata quin  
queangulata, pedicellata, supra scabra, subtus minus, juniora villosa. Circhi  
trifidi. Racemi axillares, multiflori, foliis longiores. Flores foemineus pedun  
culatus ad basin racemi. Pedicelli alterni basi, uti et ad basin floris foemi  
nei glandula fusca. Peromen cylindricum & incanum

pedata Momordica

herb 4 usf.

Caulis angulatus, glaber. Folia petiolata, squerata-pedata: Lacinis lato-lan-  
ceolata, bis. tripollicares, laterales minores bifido, remote mucronato-dentato  
basi attenuato, glabro, utrinque punctato, ut scabra. Circhi compositi.  
Petioli longitudine foliorum. Pedunculi semipollicares. Flores subijmofi

*Cryptophylla Memaria*

Habitat in Masagasar herb. Guoj

Frutex facie myrti. Rami oppositi, glabri, teretes, axillares. Folia petiolata  
ovata, attenuata, breviter petiolata, pollicaria, integerrima, acuta, utrius  
que glabra. Pedunculi gemini, capillares. Fructus similis Phyllanti.

ni fallor nosse

Momordica? foliis quinque lobis scabri, lobis ovatis subterangimis; intermediis elongato.

Habitat in India orientali herb. 4usf.

Paulis foliatus, scabriusculus. Stipula petiolata, palmata, basi sine rotundato cordata, utrinque punctis exasperata quibus insident setae minuto, renosa. ~~Cinctus compositus, tenuis, pallidus. Petioli folio triplo breviores. Lobi laterales 1-2 angulati, remota glandulosa denticulati. Perichus compositus, tenuis, villosus.~~ Petiolus folio triplo longior. Peduncululi petioli crassiores, gemini; alter foemineus brevior, crassior, unis-florus, alter longior multiflorus, Flores cymosi estus, ubi pedicelli villosi.

confer Pumph. 5. 1. 143. Ver. Vomen credo



*Balfamina* <sup>m</sup> pomis angulatis tuberculatis, foliis glabris patenti palmatis  
Linn. S.V.

*Charantia* Dod. Pempt. 670

*Balfamina* rotundaefolia repens: mas Bauh. Pin. 306.

Habitat in India ☉

Caules teres filiformis frutuosus. Folia glabra lobi inaequalis  
acutis dentata dentibus remotis paucis magnis

~~an meo potius charantia cum asclepiade sit genus~~

Charantia M. pomis angulatis tuberculatis, foliis villosis Conguedinaliter  
palmatis Lin. Spec. p. 1433. & Cl. Zussl. 351. N. pag.

Pardipavel Rheed. Mal. D. p. 17. tab. 9

Balsamina Cucumerina indica, fructu majore flavescente. Com. hort. 1. p.  
103. tab. 54.

amara indica Rumph. Amb. 5. p. 410. tab. 151.

B. Paval Rheed. Mal. D. p. 10. tab. 10

Habitat in India

Caulis pelosus felleformis folia integra 4loba vel quinque  
loba foliis oblongi denticulo uno alterove, mucronatis

Folia squesida: lacinis lanceolatis, dentato subserratis, acutis,  
mucronatis: exterioribus biplo. Pedunculus elongatus basi bracteas  
reniformis. e Rio Janeiro herb. Guss.

Cucurbita 12

formis oblongis: sulcis catenulatis, foliis incisis Rec. pl. pag. 1433. x  
D. Cor. 2cyl. 352.

Cucumis aegyptius reticulatus f. Cucurbita arabum Vess. aegypt. 199. t. 50.  
59. Monf. hist. 1. p. 35. f. 7. 7. fig. 1. 2.

Petola Rumph. amb. 5. p. 465. t. 140.

Habitat in Zeylona hab. Mus.

Semina alba. Pericarpium quasi umbellatum ex plurimis  
membris cinctis

Caules angulati, sulcati, scabri, ope lentis villosi. Folia sepe pal-  
maria cordata, quinqueloba: lobi oblongi vel ovati, intermedium longior  
lateralis brevior, extimi bilobi, utrinque scabri, remote denticulati  
sulcus mucronuli minutis. Pericarpium trifidum. Pedunculi brevissimi, par-  
tibus efflori. Flores incani. glandula fusca ad basin pedicellorum. Caly-  
cis laciniis lanceolatis. Pomum quasi sphaerum

Convenit cum fig. 149 Rumph. minima vero cum 140. an alytus dicitur  
sic

~~noti cypta~~

operculata M. promis angulata <sup>perculata</sup> tuberculata <sup>apice deciduo operculatis,</sup>  
foliis lobatis. Lin. Spec. pl. pag. 1433. & L.V.  
Momordica americana, fructu reticulato succo Com. rar. 22. Tab. 22.

Habitat in America

Emittit vinidii apice maturo deiciendo, tanquam operculatus  
interius absque pulpa fibrillis repletus fibris reticulatis val  
de implexis, triloculari. Semina compressa nigra in  
Caulis angulatus glaber, angulis albis. Folia 2-3 pollicaria  
reticulata, utrinque apertis et fere minute scabra, proseta  
supra, angulato sublobata, basi acuta. Lobi remote subdentula  
ti. Pomum junioribus tuberculatis nigricantibus, interjectis lineis  
villosis quiescit. Cernitur composita herb. 4. 1/2.

operculata M pomis cylindricis longis finis

Cylindrica M. pennis cylindricis longis pennis, foliis angulatis acutis Lin. Sp. pl.  
pag. 11433 x. L.V.

Pepo indicus reticulatus, seminibus nigris Herm. Lugd. B. 402.  
Pepo reticulatus et sulcatus, semine nigro Herm. Par. app. II. Raj. suppl.  
pag. 932.

Habitat in Deylona, China &

Caulis quinqueangulatus. Folia cumenna angulata, basi serrato  
dentata, angulis acutis: intermedia productiore, sinibus  
non utrinque procedente amplexati, sed angulis rectis instructis  
Poma pedalea subullosa cylindrica. Semina nigra. S.  
res lutei. Corti ex axillis

trifolia. M. pomis ovatis mucronatis, foliis ternatis dentatis lin. l. v

*Pappya sylvestris* Rumph. amb. 5. p. 414. Tab. 152. fig. 2.

Habitat in India

pedata M<sup>o</sup> pomis striatis, foliis pedatis serratis Lin. l. V.

Momordica fructu striato Lorr. Pers. Penus. 1. p. 754. Tab. 41.

Habitat in Penus. herb. La Mart.

Caulis glaber. Folio septempartita sulcata: lacinis lanceolatis  
oblongis, grossis et inaequaliter serratis: serraturis mucronatis extrema  
bus bifidis. Pedunculi axillares breves. Flores masculi mucronati  
foeminei simpliciter.



cordifolia

M. ? foliis cordatis <sup>remote</sup> mucronato dentatis  
Erima Parcel Rhed. Mal. P. noy. 23 Feb. 12

Habitat in India orientali Kunberg

Caulis angulatus glaber. Folia petiolata remotissima bis/tripollicia  
veo venos utrinque glabris mucronata. Cymis simplicibus  
Corymbi axillares,

an hujus generis.

elatenum in pomis hispida, cirrhis nullis Lin. L. V.

Cucumis sylvestris Lam. epit. 946.

Cucumis sylvestris spinosus Ductus Bauh. Pin. 314

Habitat in Europa Australi &

Caulis prostratus hispida uti petioli. Folia cordata

Lobi profunde angulati. Peduncululi multiflori longitudi-  
ne foliorum

β Cucumis sylvestris folio serrato dissecto

Folia cordata, serrata lobata: lobis ovatis obtusis calicibus serrata  
uno alterove obtuso, supra callosa punctata, subtus canescentia  
petioli uti calyces piloso hispida Dedit Auzpau