

Monnea

umbellata M. erecta, foliis lanceolato-ovatis, pedunculis confertis
arborescens M. erecta, foliis lanceolato-ellipticis, pedunculis solitariis, receptaculis globo-

^{fis}
ciliatigolia M. erecta, foliis ellipticis, pedunculis solitariis, receptaculis ovatis.

Prostrate M. decumbens, receptaculis subrotundis

cuneifolia M. foliis obovatis, pedunculis solitariis compliciti

parviflora Morinda foliis elliptico-ovatis, pedunculis att. lani bus geminis

Habitat in Guinea. 9 Berl 5

Tota glabra. Rami inferna Vestitus, Superiora apice compressa. Solia petio
late, Subspiculata, parum acuminata, Supra obsoleta oblique rauosa
Pubes subvenosa. Petiolis semi-angustulatis. Ripulo evanescentes. Pedunculi
filiformes, 8 es qui pollucuntur. Flores 5-6 in capitulo, parvi.

~~guaneensi~~ ~~Globorphia~~

Habitat Pojenna Le Blond herb. la Martinique.

Rami cinesariantes, erectos, liores. Sola petiolata, ^{brevior}, ^{lauria}, obtusifolia, utinque nitida, conica, subtus ^{fusca} venusta, venosa, ex tunc par ferulata. Racemi terminalis, erecti, composti. Pedicelli 2-3 flor. Calyx
galloca ^{lanceolata} lanceolata. Petala calycis parum longiora. oblongata stamina
pulchra de nussime verspo ^{interne} pedicelli triflori apice florae
Racemus terminalis basi rams uno alterius versus apicem obscurae
remota serrata

Coriaceo Morinda

Habitat in Madagascar (Commerçon herb. fus).

Rami teretis, superne reticulati, costatis cinereis, glabri. Dolia petiolata, opposita, bipinnatis, vel parum ultra, ellipticas, obtusas, coriaceas, nitidas, obsoleta remota nervosa, supra secundum nervis et costa levigata, pubescentes venisimile venosis int. crenimata, glabra. Petioli unguicularis, purpurei. Pedunculi fascioper purei, astillares, solitarii, longitudine foliorum. Capitulum magnitudine guglandis, orato-subrotundum.

Roxo Morunda procumbens Lin. S. V. Gaugu hort v. 1. 8. 16

Roxo humifusum, fructu caprifloris Plum. spec. 11

Periclymenum americanum a Léys radice fit atramentum Pluteo. alm.
287. & 212. fig. 4.

Habitat in America calidiori
fructu debili: a fructibus vicinis sustentatus. Cortex cuneatus. Ramigini
nuces quadrangulares. Folia opposta obtusa vel lanciolata elliptica
basi attenuata petiolata, obliqua cum acumine beri vel acuta neti-
do integerrima. Receptaculum irregulariter puberulum. Corolla nivis
Gaugu

umbellata Morinda erecta foliis lanceolato-ovatis, pedunculis confertis Lin. 8c.

Zeyl. 81* S. V. p. 217.

Baneodus angustifolia Rumph. Amb. 3. p. 157. t. 98.

Habitat in Indiis.

Autor foliis Cephalanthi, oppositis, lanceolato-ovatis, pedicellatis, integerrimi.

Umbella fasciis sive pedunculi planes aequali, iam oblongo vermiferis
8c; quibus singulis capitula aggregatae incident. Lin. 8c.

non vnde

arborea florinda foliis lanceolato ellipticis pedunculis solitariis, receptaculis globosis
Habitat in nemoribus ad margines horum, hony n. s. sub nomine M. umbellata
Rami fusci articulati, oppositi patentia superne alternatione compressi, glabri.
Folia petiolata, opposita lato-lanceolata utrinque acuminata glabra venosa
triplicaria. Pedunculi at illares solitarii petculo duplo longiores
Receptaculum ex lobosam magnitudine congl. flores receptaculo duplo
~~longiori~~ triplo longiores pollicares
Differt a cetrifolia figura receptaculi foliis membranis angustioribus
receptaculum foliis irregulare

Citnifolia Morinda foliis ellipticis, pedunculis solitariis, receptaculis ovatis

Poda pulava Rheed. Mal. 1. p. 97. t. 92. Rajahst. 1442.

Bancudus latifolius Kumpf. Amb. 3. p. 158. t. 99.

Morinda citnifolia arborea, pedunculis solitariis Linn. S. V. p. 216.

Habitu in India nemoreso;

glaberrimo, rami teres. Folia opposita remota, petiolata late ovato lanceolata cum acuminere parvo, & magno sepe semipedalia integerrima venosa subtus pallidiora. Stipulae ovatae adpresso utrinque inter petiolas petiolis semipeltierianis. Pedunculi axillares solitarii, longi. Sudore petiolis receptaculum commare ovalum magnitudine conigli basi foliolo uno alterius obvato contorta. Flores longitudine receptaculi fructui ovatus magnitudine nucis juglandis

folia
~~Cuneata~~ folia obvoluta, pedunculus compositus
Habitat in Madagascari Conney 5
Rami teretes glabri. Folia petiolata opposita obvoluta oblique ^{obtusipina} crenata
acuminata breviflora mucronata utriques glabra oblique nervosa rata
gerrima. Stipula membranacea interfoliacea folia connectens per pedunculum
li axillare foliolum folio parum longiori pedicellis non multifloris
receptaculum mucronatum flores parvi

an hyper generis

~~renunciam & folio opposito ellipticis conacis glabris apice pungente~~