

# Menis

1. alba M. foliis oblique cordatis lobis integris laciniatisque
2. nigra M. foliis cordatis scabris integris laciniatisque
3. papyrifera M. foliis palmatis integrisque scaberrimis, fructibus hispida
4. rubra M. foliis cordatis subtus villosis, amentis cylindricis integris laciniatisque
5. Falanca M. foliis ovato-oblongis utrinque aequalibus, aequaliter fenatis
6. indica M. foliis ovatis attenuatis glabris aequalibus inaequaliter fenatis
7. tinctoria M. foliis ovato-lanceolatis utrinque glabris lobis profunde fenatis
8. villosa M. foliis ovato-lanceolatis crenato-fenatis supra scabris subtus villosis

Menis? ex insula Francis Romae subtetrazoni Dedit. Thonini

ellipticus Monn. foliis subellipticis venis obtusissimis glabris scabriusculis.

Habitat in insula Francia Comneson herb. Guss. 7

Rami teretes, glabri, pallide virides. Folia petiolata, integerrima, basi versus apicem  
sensim angustata et obtusa, 3-4 pollicaria, subtus venis exstantibus. Petiolus pol-  
licaris. Amenta foeminea axillaria, pedunculata, solitaria, cylindrica, polli-  
cari. Styli duo, villosi.

*Alepis Monis*

an nigra Ex Europa allata?

Habitat in Angula Botonica Pommerf. herb Guss.

Folia cordata, oblonga, loricata, integra vel triloba, grossa serrata, glabra nisi subtus ad  
venas majores

*pauciflora* Monn.

Habitat in Insula Bobonia Commes. herb. Aug. 3

Folia 12 pollicaria, ovata, glabra, grosse obtusiuscula serrata, serraturis mucronatis ut  
in indica, in acumine semipollicari definentia. Stipula subulata, unguiculata.

amentum magnitudine peperis  
an varietas Monn. Indica

Monis

Habitat in insula Borkum Siguer Blanci herb. Gussf. sub Dico

Folia squesida: laciniis lanceolatis, in ipso subpennatifidis, grosse serratis, utrinque scaberrimis, ac uncinatis. Stipula ovata. Rami villosi scaberrimi

Laciniata M.

Fructus minor, foliis elegantibus laciniatis Tournef. 9. v. h.

Habitat

hab. fus.

Folia ovata, quinqueloba, grosse serrata, acuta. Ament. masculina  
pedunculata, semipollicina

Sandra

Tuberculatus

Habitat

Hort. panf. herb. Guss.

Proxi tuberculati glabri. Solum infida, incipit sub pinnatifida laciniis  
lanceolatis, attenuatis, supra glabri



alba in foliis oblique cordatis lobatis L. S. V.

moris candida God. pempt. 110.

Moris fructu albo Bauh. pin. 459

Habitatio China

Rami glabri folia grosse serrata interdum <sup>lobis utrinque 2. oblongis acuta</sup> ~~acuminata~~  
sepe inaequalibus <sup>divisa ut in miro nigro.</sup> amenta axillaria pedunculata  
masculina brevia cylindrica foeminea globosa

Folia ovata oblonga, acuminata, grosse obtuseque serrata glabra  
amenta foeminea oblonga, unguiculata. Pedunculi perispermici.

aliam ex hort. par. pro ~~Confat. Anspoli crepans foliis cordatis~~  
~~majonibus firmioribus an specie diversa~~

~~integris serratisque petiolis glabris~~

macrophylla Moni foliis cordatis lobatis reticulis pubescentibus

Habitata in oriente <sup>in</sup> horto Parisiensi Constantinopoli allata;

an varietas Moni ~~Rosa~~ alba

Folia magna utraque glabra nisi ad costam et nervi lora subtus  
pallidiora obtuse serrata

Paris

negra M. foliis cordatis pinnatis Lin. S. 1. 11

Monis Dod. pempt. 810.

Monis fructu nigro Bauh. pin. 459

Rami glabri foliis petiolata <sup>lympha</sup> ~~foliis~~ interdum lobata

lobis <sup>interioribus</sup> ~~interioribus~~ <sup>lanceolatis</sup> ~~interioribus~~ interdum pinnatis

sed v. lobi acuminato laterales obtusi <sup>acuti</sup> ?

varietate laciniata differt lobis serratis paucis profun-  
dis latis laciniis 6

rubra m. foliis cordatis subtus villosis, amentis cylindricis hinc Spec. pl.  
p. 1399 \*

Montis virginianensis arbor, Corti arboris instar ramosa, foliis amplis  
simis Plukh-alm. 253. t. 246. fig. 4.

Habitat in Virginia;

amentis longitudine Betula alba. Folia recentia subtus maxi-  
me tomentosa; saepe etiam palmata sunt folia, saepe sine  
loba

vel parum majora

folia in meae palmarum supra scabra rugosula altero  
sepe sine utroque interdum triloba

— Cordato oblongi

*papyrifera* M. foliis palmatis <sup>integris, quae</sup> fructibus hispida L. l. V.  
Thunb. fl. Jap. pag. 72.

Monis Jap. in, foliis utrisque motus, cortice papyrifera Komph  
am. Enc. t. 471. t. 472.

Monis papyrifera <sup>cap.</sup> Lab. Thest. p. 44. t. 20. fig. 3.

Habitat in Japonia <sup>hinc</sup> ad ultimos glabri <sup>si abrupsi</sup> folii  
Rami <sup>hinc</sup> pilosi <sup>reser.</sup> . Solea petiolo <sup>sa</sup> super ne <sup>fope</sup>

folia <sup>ad</sup> <sup>urfa</sup> <sup>altes</sup> <sup>erposita</sup> <sup>palmaria</sup> <sup>et</sup> <sup>ultra</sup> <sup>ovate</sup> <sup>altis</sup> <sup>latere</sup> <sup>obliqua</sup>  
latere <sup>basos</sup> <sup>ad</sup> <sup>super</sup> <sup>ne</sup> <sup>si</sup> <sup>aberrantia</sup> <sup>subtus</sup> <sup>villosa</sup>, <sup>ternaria</sup> <sup>perata</sup>  
usa <sup>sciantia</sup> <sup>margine</sup> <sup>incana</sup> <sup>fope</sup> <sup>triloba</sup> <sup>lobis</sup> <sup>ovatis</sup>. <sup>Stipula</sup>

Petoli <sup>pubescenti</sup> <sup>vel</sup> <sup>4.</sup> <sup>ovato</sup> <sup>lanicolato</sup> <sup>pollicares</sup> <sup>membranacea</sup>  
pinnosa <sup>pubes</sup> <sup>laevia</sup> <sup>incana</sup>, <sup>foeminea</sup> <sup>globosa</sup> <sup>magnitudine</sup> <sup>nervi</sup>  
incana <sup>coyli</sup>

cum <sup>tenetore</sup> <sup>proprium</sup> <sup>genus</sup> <sup>constituant</sup> <sup>Botanici</sup> <sup>Pancisa</sup>  
sub nomine <sup>Novus</sup> <sup>fontina</sup>

tatarica M. foliis ovato-oblongis utrinque aequalibus aequaliter serratis  
Lin. Spec. pl. pag. 1399+

Habitat ad asport

affinis india, sed pedunculis et petioli longioribus, serraturis folio-  
rum magis distinctis. fructus M. nigra. Lin.

indica m. foliis ovato oblongis utroque opealibus inaequaliter serratis

Lin Fl. Reyl. 337\*

Tunda pance Rheed. malab. 1. p. 87. t. 49.

Morus indica Rumph. amb. 7. p. 8. tab. 5.

Habitat in India &

Rami teretes glabri. Folia petiolata ovata <sup>in acumine longo</sup> attenuata <sup>integerrimo</sup> glabra

suppollinaria profunde <sup>Rabrisinula</sup> inaequaliter serrata <sup>ternatus mucronatus</sup> venosa

acumine <sup>folitari</sup> integerrimo. Stipula linearis lanceolata attenuata decidua. Pedunculi axillares filiformes <sup>folitari</sup> semunquiculares

Amenta feminea oblonga, frax semunquiculana

Habitat in China culta in Anpela Proborio herb. 4. p.

Folia cordata, integro trilobaque, acuminata, grosse serrata: serratione obtusius  
glabra supra & abro, subtus lora, 2-4 pollicaria, acumen pollicare, integerrimum  
acutum. Amenta feminea subglobosa, pedunculata, bemi pollicaria. Suctio ruber  
Rami teretes glabri acuminati

Arctostaphylos? herb. Royenii

Bdellifera Pluken. 145. fig. 2.

Arbustula spinosa post onit. cop. foliis quercinis  
Sine suo axillari.

Arctostaphylos? ex copula H. C. herb. Mus.

Arbor lactes. ens aculeata foliis quercinis etc. Pluken. 145. fig. 2

Quercus foliis arbustula spinosa, lactes. post. recep. P. 13.

Rami teretes, spina recta unguiculari ad extremum ramulorum  
Folia lanceolata, basi ovata, attenuata, inaequaliter incisae serrata  
Subtus pallidiora

an potius ad villosum



unctonum. foliis oblongis hinc productionibus, spinis axillaribus Farqu.  
amer. 247. tab. 100. spec. pl. 1399.

Tataiba Margr. Bras. 119.

Xanthoxylum aculeatum, carpinifolium, americanum

Monis <sup>nosy</sup> ~~han~~ <sup>nosy</sup> cortex cinereo Plum. alm. 596. t. 239. fig. 3.  
Gacq' Monis fructu viridi, ligno sulphureo tinctore Roan. her. t. 2. p. 3. t. 150. fig. 1.

Monis ~~epid~~ Tataiba Plum. ec. 899. t. 204.

Habitat in Jamaica, Brasilia ~~et~~

Rami <sup>interne</sup> ~~veretes~~ <sup>interdum</sup> ~~superne~~ <sup>canescentes</sup>

~~interdum~~ <sup>vellosa</sup> ~~subtus~~ <sup>superne</sup> ~~et~~ <sup>abundantia</sup> ~~delata~~ <sup>germina</sup> ~~duo~~ <sup>fracti</sup>  
Duplici stipulacea. folia ovato lanceolata subcordata  
utroque glabra, <sup>axillari</sup> ~~petiolata <sup>tripollicaria</sup> ~~profunde~~ serrata, venosa attenuata  
supra lineata secundum nervos folia ramorum inferiorum  
pinnatifida. <sup>lobis</sup> ~~amentis~~ pedunculata axillaria, masculina  
Cylindrica sesquipollicaria canescentia, foeminea globosa  
foliis ovato lanceolatis utraque glabris spinis axillaribus~~

Pluk. Diversa spec. Miller potius Jamien hinc perit nec videtur  
quam ad villosam nostram  
verte

<sup>subintegerrima</sup>  
villosa M. foliis ovato lanceolatis crenato serratis supra glabris pilis subtus  
lobatis villosis

Habitat in Anpula s. Oculis de West 5

Rami teretes, glabri, superne canescentes (in mea inermes) foliis  
ovato-lanceolata bypolliana et ultra supra ad centem base  
villosa subtus villosa molliscula <sup>paucis</sup> basi veris in tegerrima  
exteriorum crenis <sup>perisperm</sup> serratis, acuminatis, petioli canescentes. Amen-  
ta masculina axillaria, pedunculata. pollinaria

~~est~~ in variis a more tritoria differe videtur, ~~differe~~ an modo  
varietas

mauritanica Monw

Monw mauritiana Jacq. coll. 3. pag. 206

Habitat in insula Mauritania

Rami juniori punctati. folia lanceolata-oblonga ceteris  
acuta, integerrima, parum undulata, alterna, utraque scabru  
subtus pallida vincta. Stipula parva lanceolata acuminata  
pedunculi  $\delta$  axillares, solitarii, brevissimi. Amenta fasciculata  
cylindrica calamo crassior. Cal. foliola 4 oblonga obtusa pilata  
filamentata 4. Germen 4gonum. Stylus et stigma 0. In arbore foemi  
neo pedunculi axillares breves. Cal. foliolis 4. subrotundis obtusis  
duo interora germen occultant. Styli 2. subulati. Jacq.

non vidi