

Muisonda

- 1 frondosa M. foliis ramorum et panicula villosi
- 2 glabri M. foliis ramorum et panicula glabri

*Grondosa* M panicula foliis coloratis Lin. 1. V

Helicella Rheid. mal. 2. p. 27. t. 10.

Tolium principis Rumph. amb. 4. p. 111. t. 51.

Musfonda reylanica, flore rubro, folio ex florum thyso prodeunte albo  
Burm. 2. cycl. 165. t. 76.

*Rondeletia leucophylla* Hoff.

Habitat in India <sup>subtropicali</sup>

Rami teretes, superne <sup>villosi</sup>. Folia petiolata <sup>opposita</sup> <sup>veq.</sup> oblonga ovata <sup>longa</sup> <sup>acumina</sup>  
sa integerrima <sup>sa</sup> tripallicana, <sup>ve</sup> oblique nervosa, utrinque  
villosa, mag. subtus pallidiora villosiora propositum in costa - <sup>st</sup>  
nula <sup>utrinque</sup> ovata acuminata. <sup>petiolata</sup> Folium <sup>ovatum</sup> <sup>acutum</sup>  
integerrimum venosum subtus molliter villosum, sesqui  
pallidius petiolus villosus. Corymbis terminalibus bracteis  
villosis trifidis. <sup>caudis</sup> fructus oblongus umbilicatus. Calycis  
lacina subulata. Bractea sub calyce lineari lanceolata

*Grondosa* foliis panicum <sup>et</sup> paniculorum villosis.

Musfonda

frondosa Musfonda ramis foliisque ramorum et panicula villosis

+ musfonda frondosa panicula foliis coloratis Lin. S. V. pag. 210.

+ Musfonda reylanica, flore rubro, solum et florum thyso praecedente  
albo Burm. zeyl. pag. 165 tab. 76

parviflorus Convolvulus <sup>indivulofus</sup>, foliis lanceolatis <sup>petiolatis villosis</sup>, ~~villosis~~, pedunculis solitariis unisporis  
calycibus lanceolatis ~~villosis~~

habitat in monte rideo Brasiliae & Thonin

Indivulus palmaris, ramis tenuibus, simplicibus superne villosis <sup>floribus</sup>  
foliis <sup>tristibus</sup> petiolata lanceolata, villosa, subserrata, semiunguiculata. <sup>pedunculis axillaribus</sup>  
res, solitariis, <sup>a basi nervorum usque ad apicem</sup> foliis brevioribus. foliola calycina obovata lanceolata acuminata  
subserrata. Corolla calycis parvam longior extus villosa, ferrata.

Convolvulus rectus minor foliis angusto cordicatis Sloan h. h. f. Tom. 1. p.  
tab. 99. fig. 3. satis convenit

2 glabra M. <sup>usenda</sup> ~~ramis~~ ramis foliis, ramorum et panicula glaberrimis

Habitat in India orientali

Rami teretes, perperascentes, albido punctati, glabri.

Solia petiolata, ~~ovata~~ <sup>in polliciana, attenuata,</sup> opposita, ~~ovata~~ <sup>acuminata,</sup> integerrima, utrinque glabra nisi subtus in costa, oblique alternatim nervosa, obscure venosa.

~~Stipula~~ oblitterata. Panicula ~~terminalis~~ <sup>terminalis</sup>

Panicula terminata, corymbosa, ~~pedunculata~~ <sup>pedunculis</sup> opposita

~~ter dichotomi~~, <sup>ter dichotomi</sup>, floribus pedicellatis in singula dichotomia.

Colorem p. n. n.  
4080 Rumph  
amb. 4. p. 111.  
t. 51

Bractea subramificationibus, trifida ut in frondosa, decidua, at  
s. p. l. o. m. i. n. o. r. i. s. : l. a. c. i. n. i. a l. a. n. c. e. o. l. a. t. a, glabra, Bractea subpedicellis  
ultimis lacinolata, integerrima, interdum superne denticulo uncinata.

~~vel rugosa.~~  
Flores pedicellati: pedicelli angulati, longitudine germinis.

Calycis lacinia lacinolata, pilis minutis ceteris pilosa.

Corolla tubus corollae pubescens, pallidior, medio crasior. lacinia limbi  
lacinolata, in piceamine sicco <sup>super</sup> fulvi. ~~fructus glaber oblongus umbilicatus~~

Fructus glaber, ~~oblongus~~ <sup>oblongus</sup> ~~umbilicatus~~ <sup>umbilicatus</sup> ~~obtusus~~ <sup>obtusus</sup> ~~lineatus~~ <sup>lineatus</sup>. Solium panicula triplo maior  
quam in frondosa, ovatum, obtusum, nervosum, utrinque  
cylabrum, subtus in sicco flavescens, supra virescens, basi panam  
per petiolum decurrens. Nervis quatuor alternis majoribus  
~~velis quatuor alternis majoribus~~

procedente

Quae omnis mihi videtur diversa, glaberrima, calycibus et bracteis  
et laciniis calycinis minoribus, <sup>foliis</sup> magnitudine, consistencia et colore  
floribus glaucis auratis. <sup>folii</sup> panicula. Rumph. syn. huc refer

folia enim in frondosa subtus  
laciniis incana

rufa Mussaenda hirta, foliis ovato-oblongis, panicula oblongis attenuatis,  
utroque acutis, corollis ~~exterioribus~~ tuberculatis

Habitat ad Senegal herb. Richardii 7

Rami, uti petioli, costa et vena foliorum pubes, pilis rufis  
hirti. Folia breviter petiolata, 3-4 pollicaria, margini, uti ger-  
mina sua et tubus corollae extus scabra, supra pilis sparsis,  
avenia, adnata subnervosa, acuminata. Germen oblongum  
Calyce lacinis subulata, unica in folium petiolatum, pellicula  
re, utroque ~~oblongo~~, nervosum coloratum desinens.

~~Convolvulus japonicus foliis hastatis lanceolatis: Calice lobato  
tubo  
obovato, lobis unguiculatis, caulis reticulato. Murab. Pl. Jap.  
p. 50.~~  
5  
japonicus Convolvulus foliis lanceolatis hastatis: Calice auriculato peltato unguiculato

plicatis *C. tomentosus*, foliis cordatis acutis angulato-ternatis rugosis

~~plicatis, pedunculis subfloris corymb.~~

Habitat in Cap. b. p. p.

~~affinis eros. pedunculi interdem 1 flori. Stigmata duo elongate~~

non vidi



arcuata Mussaenda foliis elliptico ovatis glabris, corymbis dichotomis, corolla limbo  
extus glabro.

Mussaenda arcuata foliis ovato-oblongis, acuminatis, ramulis arcuatis,  
corollam limbo externa glabro La Mart. Dict. Bot. 4. p. 393.

Habitat in insula Tmaicis Com merson Thonin 3

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, tripollucaria, utrinque acuta, ner-  
vosa, pubes pallidiora, transversim simpliciter venosa. Pediculi axi-  
llemis axillis et terminalis, longitudine foliorum: parvales adscendentes.  
Corymbi bini dichotomi; flores in dichotomia et apice pedicellati. Bracteae  
pubulatae utrinque ad basin ramificationum. Calyx quinque partitus:  
laciniis linearibus, tubo corollae triplo brevioribus. Corolla hypocrateriformis  
tubum plenumque basi linearibus lineata, purpurascens, superne dilatata  
viridiglaber. Limbi laciniis sulphureis, extus vallis nuda brevibus sive  
densis et speso, versis faucem saturatus colorata. Antherae et stylus longitu-  
dine tubi. Stigma emarginatum.

<sup>e</sup>  
# vellis floris vel  
albidis hirsutis

Landia Mussonda foliis ovatis <sup>natis</sup> attenuatis, corolla limbo exteriori hirsuto. La  
mark. Dict. Bot. 4. p. 392. t. 157. fig. 2.

Habitat in Insula Francia herb. Mussoni?

Rami subtrianguli, glabri. Folia petiolata, spithamea, remote oblique  
nervosa, venis 8 ime venosa, utraque glabra. Stipula bifida, hirsuta.

Corymbi primarii trifidi, dein dichotomi. Corolla <sup>cutanea</sup> semipollicari  
tubus sensim amplior. limbi laciniis attenuatis. Structus oblongus,  
glaber, est semipollicaris.

biflora

Uvaria foliis ellipticis obtusis, pedunculis bifloris, petalis subrotundis

Habitat in Guinea 4 set 3

Rami teretes, glabri, fusci. Folia petiolata, tripollicaria, membranacea,  
utrinque glabra, tenuis pime venosa, supra nitidiuscula, vix emarginata.  
Petiolus brevis. Pedunculi axillares, brevissimi: pedicelli longiores  
in medio bractea<sup>ob</sup> ovato subrotunda. Calycis foliola rotundata, extru-  
tomentosa, uti corolla

*Longiflora* Mussaenda folius ovatis <sup>acuminatis</sup> attenuatis subtus mollissimis, corymbis terminalibus dichotomis, crollis longissimis extus hirsutis

Habitat in insula Borbonia Commeson Herb. Thaurini

Rami vellis densis tecti, teretes. Folia petiolata, opposita, quadripolliciana, a cumine longo terminata, oblique nervosa, supra pilis minutis adpressis, praesertim in costa nervis margineque, subtus nervis est. Volutis subvenosus frequentia villosa praesertim in nervis et senescente canescentia. Petioli villosi tomentosi. Stipulae utraque geminae, unguis alares, valde attenuatae, saepe duae. Corymbis terminalis: pedunculi parvuli oppositi, hi vel ter dichotomi, villosi. Bractea parva, acuminata, ovata, uti calycis et corollae extus hirsutis dense subsericeo tecta. Calycis laciniis brevibus, subovatis acutis, extus hirsutis. Corolla fere tripolliciana: laciniis limbi attenuatis, mucronatis, marginis extus et supra intus vellis tenuissimis tomentoso. Tubus intus hirsutus. Germen oblongum antheris 5que, lineari, sessilibus in tubo corollae. Germen oblongum. Stylus linearis, crassus, hirsutus. Stigmata duo, alterum parum longius.

~~plicatus~~ Convolvulus

Habitat herb. Gusf.

Caulis angulatus, prostratus, villosus. Folia petiolata, semipollicaria, cordata, acuta, inaequaliter serrata, utrinque villosa, supra lineata, subtus nervosa, subinde sp. Radia-  
culi axillares, uniflori, semipollicares, incani; Calycis lacinia oblonga, acuta,  
villosa  
an varietas althovidis?

Cupensis Burmanni

~~plicatus~~ La Mart

hirsuta Mussaenda <sup>ramis</sup> paniculatis foliis ovatis foliisque <sup>ramorum & panicula utrinque</sup> subtus villosa subdomato  
bis, floribus pedunculisque hirsutis

Habitat in Guinea Thonning

Inermis. Ramis teretibus, villosis, bordida canescentes. Folia petiolata, 3-4 polli-  
cibus, elliptico ovata, panem acuminata, supra rava villosa, subtus  
nerviata nervosa, vindi canescentia, nervi subferugineis.

Petiolus villosus. Stipula 4. lineari lanceolata, unguicularis,  
extus canescentes, intus glabra. Corymbi folia petiolata, ovata,  
utrinque panem acuminata, basi pollicaria, nerva, utrinque  
villosa, 5que nervia, subserosa. Pedunculi uti calyces et corolla  
extus ferrugineo hirsuta.

macrophylla  
Cibifolia

Mussaenda

ramis foliisque ramorum <sup>ellipticis</sup> et panicula <sup>subrotundis</sup> glabra nervis

foliis ellipticis, corymbi terminalis decomposita, foliorum caly-  
coram subrotundam foliis panicula subrotundis

Habitat in Guinea Fr. et F.

Rami teretes, superne tetragoni, glabri. Folia breviter petiolata, sepe spitha-  
mon, pollicis tres lata, glaberrima, laxia, venis sive simpliciter  
venosa. Stipula membrana annulata. Petoli semiunguiculares. Pedun-  
culi, uti corolla extus villosa nescientes. Calyx minutus. Corolla  
pollicaris: foliolum pollicare, subrotundum, petiolatum, supra glabrum

in differentia M.

corollae lacina mucronata setacea terminata

adda foliis panicula ovatis

*Estriifolia* Mussanda foliis ternatis verticillatis oblongis glabris, corymbis terminalibus  
supra decompositis.

Mussanda Estriifolia foliis verticillatis ternis, ovatis, subsessilibus, laciniis  
nisi calycinis longis persistentibus La Mart. Diet. bot. 4. p. 393.

Habitat in Madagascar herb. La Martii 4

Tota glabra. Rami cinerascens, inferne teretes, superne triquetri.

Folia sessilia, bipollicaria, parum acuminata, supra leviter arena  
subnitida, subtus venosa flavescentia. Stipula ovata, acuta. Corym  
bi terminaliter, densi. Pedunculi compresso-subtriquetri. Calycis lobis  
cylindricis, lanceatis, obtusis, semiunguiculatis.



tuberculatus Convolvulus

Habitat in <sup>hæd. fus. glabris</sup> ~~hæd. fus. glabris~~ affinis C. carneo. <sup>rami</sup> ~~rami~~ glabri, cinerei, tuberculati. Folia <sup>simpliciter</sup> ~~simpliciter~~ serrata: laciniis lanceolatis, acutis, utraque <sup>glabra</sup> ~~glabra~~, simpliciter serrata, integerrima, intermedia semipollicaris: laterales breviores, extremi interdum bifidi. Petioli pollicares, teretes, laevés, glabri. Pedunculi axillares, longitudine folii, uniflori, petiolo crassiores, angulati. <sup>supra</sup> ~~supra~~ <sup>bas</sup> ~~bas~~ <sup>in</sup> ~~in Stipula foliacea, quinque partita, unguiculari-gemina, sessilis. Calycis foliola ovata, glabra. Capsula glabra laevi, unguiculari, major quam in consimilibus.~~

longifolia Mussaenda foliis ternato verticillata. Calo lanceolatis sessilibus glabris  
corymbis terminalibus compositis

Mussaenda longifolia; foliis verticillato-ternis, confertis, lanceolatis, oblongis  
capsulis cordato-striatis coronatis La Mark. Dict. bot. 4. p. 393.

~~Habitat~~ Habitat in Madagascari. herb. La Mark. 5

Tota glabra. Rami inferne teretes. Folia quinque pollicaria, basin  
versus sensim parum angustata, supra avena, minime nitida, subtus  
obscurè venosa, acuta. Hipula ovata, acuta. Corymbi densi.

Calycis laciniis linearibus, <sup>truncatis</sup> ciliis <sup>sub</sup> elevatis angulatis.

*Cenotheroidees Convolvoleis* *Scuticifolius* erectus foliis linearibus, canescentibus, pedunculis  
axillaribus solitariis erectis unifloris bracteatis, calycibus lanceolatis glabris

L. Suppl. pag. 137. \* S. V. p. 203

Habitat in *C. b. pei* *Her. Rozen*

Habitus *Cenotherois* molliorimo. Caulis lignosus, erectus, teres, rubicundi,  
glaucescente quiescente. Folia linearia, angusta, digiti longitudine  
cava, plana <sup>acuta</sup>. Pedunculi in summitate caulis, axillares, solitarii,  
erecti, breves, angulati. Bractea bina, teres, subulata. Calyx  
foliolis quinque lanceolatis, acutis, glaberrimis, patenti-  
canis, margine membranaceis. Corolla infundibuliformis, may  
na flava *L. Suppl. L. C.*

Rami juniores foliisque tenella incana  
Caulis superne canescens tomento tenuissimo. Folia lineari-lanceolata, sequipoli-  
cana. Pedunculi solitarii raris gemini, brevissimi. Bractea acterna. Corolla bipol-  
licana

Lanceolata Mussaenda foliis lanceolato subcuneiformibus glabris, floribus compo-  
sitis Terminalibus compositis

Mussaenda lanceolata, foliis lanceolato-cuneiformibus; floribus  
oppositis, racemosis. La Mart. Dict. bot. 4. p. 393.

Habitat in insula Trancis ha Mart. 5

Tota glabra. Rami superne subtetragonis compressi. Folia petiolata, <sup>2-3 pollicibus</sup>

acuta, basi attenuata, avenia vix venosa, subnervia, laxa.

Stipulae evanescentes. Pedunculi Terminalis trifidi: ramo singulo  
quinque floro; pedicelli oppositi, angustulani. Calyx margo  
s. dentatus.

rhomboidale  
*Troperifolium Solanum*

Habitat in Puerto Rico herb. fus.

Caulis herbaceus? Rami teretes, villis foveis cinereo tomentosi. Aculei parvi  
rari, glabri, teretes, basi latiores, recurvi. Folia <sup>remota</sup> geminata, subpetiolata, al-  
terum  $\frac{1}{2}$  pollicare, alterum duplo minore, rhombes subovata, utraque  
acuta, subtus spina una alterave in costa, utraque villosa, supra scabi-  
dula, subtus villosa canescentia, integra vel lobis utraque duo obtu-  
sissimi. Umbello laterales, a foliis remota, sessilia, cerniter glori. Peduncululi  
unquiculares, uti calyces hirti. Flores parvi. Calyces 5que fidi, subulati.  
Bacca magnitudine pepeni nigri, glabra. Stamina 4-5

nervosa Murpanda foliis lanceolatis nervosis ramisque pilosis corymbis terminatis.

Habitat in Surinamo.

Caulis fruticosus. Rami teretes, uti folia adpressi pilis varicatis. Folia opposita, bipollicaria, utraque attenuata, supra oblique nervosa sublineata, subtus pallidiora subvenosa. Stipula subulata. Flores copiosi, seminollicari, calice glabro calice, ~~fructu~~ bractea subulata, tubo filiformi. demum erecto horata.

*Spiciopus Convolvulus* foliis cordatis ovatis acutis hirsutis subtus argenteo sericeis, petiolo  
teretibus L. Suppl. p. 137. \* P.V. p. 201.

Habitat in Brasilia 4

Planta spiciopus grandis. Truncus exortoreus, arcuatim volubilis, teris in summa  
melleo thoma  
foliis <sup>nervosa</sup> ~~niarum~~. Folia cordata, ~~maxima~~ <sup>maxima</sup> acuta supra glabra, subtus

tomento sericeo vel argenteo in flar splendentia. ~~Sti~~ petiolo argenteo longi  
tudine folii argenteo nitentibus. Pedunculus in summo tomentoso niarus longitudi-

In val  
umbrella quadri radiata

nere petioli multi floris. Prolocum magnum ~~bractea~~ <sup>tetra</sup> phullum folioli  
ovatis acuminatis longo terminatis extus villosis intus glabris sequi  
polluantibus, <sup>foliola alia ad basin florum</sup> ~~foliola alia ad basin florum~~ <sup>fructura involucri</sup> ~~longitudine~~

calycis. Pedicelli tri vel quadri radiati involucri fructura involucri  
calycis tomentoso in canis foliis oblongis. radii Corolla argenteo villosi

Corolla purpurea.

Lapudra Trigiam Rheed. Mal. 11. p. 61.

~~Spiciopus Convolvulus foliis cordatis ovatis acutis obsolete repandis subtus villosis, pedunculis unilobis~~  
~~nervosus Convolvulus foliis cordatis nervosis, subtus tomentosis, pedunculis umbellatis multifloris~~

~~nervosus La Mart. Burm. fl. Ind. p. 48. tab. 20. fig. 1.~~

quantum ~~videtur~~ eadem est ac spiciopus, quantum enim recidior plerumq; sub nomine  
nervosus in herb. Celeb. visa non diversa est. propterea cum descriptione <sup>na</sup> et figura factis  
congruit nisi quod petiolo longior, pedicelli simpliciores. quod in volucrium

x  
nullum adeit vel impedit deciduum enim est in pleris que  
spiciopus P. foliis cordatis subtus tomentoso sericeis, pedunculis <sup>na</sup> petiolo longioribus umbellatis  
calycibus acutis caule volubili H. new. 1. p. 210.

angustifolia Mussaenda foliis lanceolatis enerviis subtus villosiusculis, corym-  
bis terminalibus

Habitat in India Orientali ♀

Rami superne pubescentes. Stipulae petiolatae, lato-lanceolatae, utraque  
attenuatae, supra glabrae, juniora canescentia. Stipulae utraque aeque  
petiolatae. Corolla per bractea et calycis dentes pubulata. Corolla  
pollicari, tubus tenuis, extus villosus.



bicolor Convolvulus

Habitat herb. Guoj.

Caulis volubilis hirsutus. Folia petiolata, pollicaria, basi cordata, triloba: lobi ovati, acuti, intermedio basi coarctato, apice attenuata, supra pilosa, subtus nives sub tomentosa, areola, subvenosa. Petioli hirti. Pedunculi axillares, longitudine folii, petiolo crassiores, bifidi. Flores racemosi, circiter 3. Distantes, hispidi, uti calyces. Bractea duo opposita, lanceolata. Palyis foliola unguiculata lanceolata-subulata.

Chinae Mussaenda foliis fasciculatis, floribus solitariis Laurifl. Cochinch  
1792.

Habitat in China caespitibus &

Arboreo la. ramis diffusis. Folia lanceolata, ciliata, ciliis glabris  
congesta. Flor. terminalis, lacinis calycis lanceolatis. Bacca ovata  
coronata, pallida & loculans polysperma. Semina reniformia

Lour. +