

Mutisia

clematis M.

Multifl

Habitat in Peru herb. 400 f.

Rami verdes, glabri, superne parum vellosi. Folia petiolata, alterna paripinnata, scaphia, biniter novem juga: foliola pinnata, opposita, ex stipulae pinnula, glabra, arenaria, obscurè nervosa, rigida, obtusa, in foro remota, duo infra caroli approximata, tri pediformes. Petiolis subtus crenatus, supra canaliculatus, apice trigonus, terminali: lacinia intermedia bifida. Pedunculus terminalis, subspum crassior, squamis brevibus vestitus, apicem, ovatis. Calyx imbricatus, glaber. Toldola ciliata, obtusa, anterior lanceolata, margine membranacea. Corolla calycæ longiora.

Clematis Malifolia Suppl. pag. 373. L. V. pag. 269

Habitat in nova Granata.

Planta scandens uti Clematis; iuvenis tota tomentosa. Ramulis frusticis, striatis longis; ramulis, volubilitate. Soleria alterna, remotis, punctata: rachis in circulum deflexa. Soleria oblongo-ovata, subfusilea, alterna: opposita, septemloba, oblate supra loca, subtus valde tomentosa. Stipulae breves, ovatae, multo etiam minores. Pedunculi caillares, solitarii, non floriferi, tomentosi: una alterare bractea, pubulata, parva. Flores magnitudine esti quia Genti Caryophylli Calyx tomentosus. Corolla purpurea, longi tadiue radice ipsius calycis. Haec Suppl. L. C.

Ramulis flexuosis, ramulis flexuosis, angulatis, tomento rufescente testi. Soleria petiolata, punctata cum pari, rugosa: soleria super alterna, recta pollicaria, obtusa, interdum mucronata, integerrima, aerea, anervia, subtilis. Tomento rufescens, ut petioli dies inferme loco stipularum, alterno latere pubescens. Pedunculus terminalis rugosus in alterno fratre. Calyx imbriatus squamis oblongis, obtusis. Corollulae calycis longioris herb. fuscis.

plus levigata
specie apud de Gussau Panpis videtur