

Myginda

1. uragoza + M. foliis subcordatis acuminatis subserratis pubescentibus
2. latifolia M. foliis ellipticis crenulatis cinnaceis, floribus terminalibus. 2. 4. fls
3. ~~Myginda~~ ^{Aphanisma} foliis lanceolato-ovatis obtusis crenatis, floribus mono-
gynis, stylo 4 fido

Mugginda

327 Montserrat

heterophylla Meggida foliis obovatis indivisis subpinnatis fidesque
Habitat in Insula Francia Comnes. herb. Lus.

Rami teretes, glabri, oppositi, superne compressi, villosi. Folii petiolato, oppositi,
semipollicaria, obovata, basi acuta, integerrima, integra vel emispinnati
fida fere ut in quibusdam *heterophylla*: lacinis utraque 1-2. oblonga, obtusa, ve
nosa, supra nitida. Petioli brevissimi, villosi. Pedunculi axillares; capillares,
biflori: pedicelli reflexi.

Dentata Myrica foliis ovatis dentatis pinnatis
Phillyrea hirsuta radice crassa lutea, foliis acuminatis Plum. gen
habitat in Domingo Herb. 4us / 5

Rami sparsi, elongati, glabri, inferne verdeti superne compressi. foliis pe-
ticolatis, oppositis, semipollicari ovato-subrotunda, forma obscure venosa, den-
tata: dentibus pungentibus. Paniculi axillares, capillares, triflori. Fru-
tus ut in Cat. folia, modo minor, magnitudine seminis Corandri

Muzenda

Habitat in America herb. La Mancha

deit La Mancha

obtusata Myrica foliis ovato subrotundis crenatis petiolatis pedunculis
axillaribus subsimplicibus paucifloris La Mart. T. en. pag 309
Habitat in Cambes 5

michi cognata

2 *Crotopetalum* *Rhacoma* Am. acad. 5. p. 393. * S. V. pag. 157
Crotopetalum fruticosum Tenue, foliis ovatis tenuissime denticulatis Brown jam. 145.
Tab. 17. fig. 1

Habitat in Jamaica

Suffrutex statura *Veronica*. Rami dichotomi pubescentes. Folia opposita, subrotunda, ovata, mucronata, tenuissime acute serrata, subpubescentia. Pedunculi axillares, filiformes, pilosi. Umbella composita 2-4 chotoma longitudine foliorum. Pedicelli capillares; involucri minima L. Am. b. c.

Rhacoma foliis lanceolato ovatis obtusis serratis subpubescentibus; floribus monogynis stylo 4 fido

Mygunda *Rhacoma* foliis lanceolato ovatis obtusis crenatis, floribus monogynis, stylo 4 fido Sw. prodr. pag

Uragoga M foliis subcordatis acuminatis subserratis pubescentibus Sw. prodr

pag. 34

Mygunda uragoga Jacq.

Len. L.V. p. 170

Habitat in America

Touitex erectus. Folia ovata vel lanceolata, acuta tenuissime serrata
opposita interdum alterna, sesqui pollicaria. Pedunculi folii
formes, axillares oppositi, bifidi: pedicellus triflorus. Flores conque
riti de atrouibente Jacq.

Mygunda ^{glabra}
2. Catifolia Mygunda foliis ellipticis ^{crenulatis} ^{conatis}, floribus ^{stigmatibus} 2. 4.
^{septibus} ^{lin.} ^{prodr.} ^{pag} ³⁹

Ex Infula fl. Crucis ⁱⁿ ^{superne} ^{floribus}

Rami ^{superne} ^{inferne} ^{cinerei}; juniores ^{virides}, oppositi, tetragonici.

Folia ^{alternaque} ^{sessilia}, opposita, ^{pollicana}, saepe ^{subrotunda}, ^{sem} ^{venis} ^{simplicibus}, utraque ^{glabra}.

Pedunculi axillares, folitarii, filiformes, ^{triflori}, ^{pedicelli} ^{libramenti} ^{intenduntur} ^{simul}

Omnia obovata, glabra, magnitudine fere Piperis, cernua

Mygunda stundifolia La Mart. ^{vide} ^{herb.} ^{L. Mart.}

glabra