

Myonima

propria F. stor. coll.

obovata M. foliis obovatis tan allepticiusque basi obtuse tetrago-
nis

Myonoma obovata foliis obovatis obtusis, basi obtusata
gonis Encycl. pag. 280. t. 68. fig. 1.

Habitat in Insula Bourbonia

Similis myrtifolia rami oppositi. Folia breviter petiolata
obovata vel alleptica polliciana venosa supra nitida
integerrima. Stipula subulata brevis

~~myrtifolia fr. foliis ellipticis lanceolato ellipticis utroque acuti
baccis sphaericis
myrica myrtifolia foliis lanceolato-ovatis acutis baccis
sphaericis Kn: p. 280. Tab. 68. fig. 2.
Habitat in insula Francia St. Thomas 5~~

^{obovato la subsessilibus subsessilatis}
D. color. flosa foliis lanceolatis ^{parvifloris} obtusis sessilibus, floribus racemosis sub panicarum panicula
Habitat in Insula Bobonoto

Trinax ramis obsolete angulatis, cortice cinereo rugoso, articulatis
Folia opposita, sessilia lanceolata, apice ^{subpetiolata} ^{nitida} robustata basi attenuata
superius glaberrimis supra venis elevatis reticulata nitida, subtus
pallida venis simpliciter varosa integerrima pollicaria. Petiolus
vix ullus

Stipula setacea munda utraque bino laterales decidua.

Pedunculus terminalis, Longitudine foliorum. flores racemosi
floribus ~~5~~ ^{panniculis 3} pedicellis oppositis ^{racemosis} quinquefloris pedicellis oppo-
sitis patentibus

Calyx margini membranaceo superius bilobis
Corolla monopetala infundibuliformis, tubus brevis. Limbus quadri-
fidus laciniis oblongis ^{tubolongis}
filamenta quatuor in faucibus ^{longitudine lacinarum}
Stylis longioribus Corolla ^{staminibus}, superne emarginatis em-
Hymno emarginata
Bacca tetrasperma, seminibus arillatis

myrtifolia Myonema.

Habitat in Insula Bourbonia ^{quae sub aequinoctiali} altera tunc compressa
abrupta. Ramis teretes glabra. Folia petiolata opposita, oblonga ^{plurimum utrinque} rarius uno alterove ob
^{venosa} emarginata, glaberrima, venosa, supra nitida, ^{integrima} ^{marginata} ^{venosa} ^{puberula} ^{pauciora} ^{minus}
pollicaria vel parum ultra. Nervi ^{folio longiores} decidui. Pedicelli ternis
num terni ⁱⁿ ^{duo} ^{super} ^{breuior} ^{et} ^{parvis} ^{crispior} ^{intermediis} ^{trifidis} ^{pedicellis} ^{ternis}
Calyx ^{marginatus} ^{dentatus}. Corolla hypocrateriformis, laciniis oblongis obtusis
sublongioribus. Anthera longitudo fere lembi. Stylus longitudo anthera
rum clavatus

aliam, ad uti videtur diversam a Rouenio habui, foliis subtus arenosis absque
mucrone. Floribus racemosis. Fructus 4. spermia an Pycnostria Luf:
antea descripta sub nomine Thonae discolor vid. M.S.
Quoniam quoad genus examinandum